

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA INCONTINENCIA Y EL PROLAPSO

Cuestionario a

A continuación, le presentamos una serie de preguntas sobre incontinencia urinaria (pérdida de orina o disfunción de la vejiga). Por favor, conteste en cada una de las afirmaciones si está usted de acuerdo, en desacuerdo o no lo sabe.

1. La incontinencia urinaria (pérdida de orina o disfunción de la vejiga) es más común en mujeres jóvenes que en mujeres mayores.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

2. Las disfunciones de vejiga son más frecuentes en mujeres que en hombres.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

3. No se puede hacer mucho para tratar las pérdidas de orina, a excepción del uso de compresas y pañales.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

4. Para el tratamiento de la pérdida de orina **no** es importante realizar un diagnóstico previo del tipo de pérdida.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

5. Las pérdidas de orina pueden deberse a múltiples causas.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

6. Efectivamente, los ejercicios pueden ayudarnos a controlar la pérdida de orina.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

7. Algunos medicamentos pueden causar la pérdida de orina.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

8. Una vez que la persona comienza a perder orina, nunca vuelve a ser capaz de controlarla.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

9. Para diagnosticar las pérdidas de orina los médicos pueden hacer test especiales según el tipo de disfunción de vejiga.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

10. La cirugía es el único tratamiento para las pérdidas de orina.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

11. Dar a luz muchas veces puede causar pérdidas de orina.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

12. La mayoría de la gente que tiene pérdidas de orina puede curarse o mejorar con algún tipo de tratamiento.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

Cuestionario b

A continuación, le presentamos una serie de preguntas sobre el prolapso de órganos pélvicos (que supone el descenso (prolapso) de la vagina, útero, vejiga o recto a través de la vagina). Por favor, conteste en cada una de las preguntas si está usted de acuerdo o en desacuerdo, o no lo sabe.

1. El prolapso de órganos pélvicos (descenso de vagina, útero, vejiga o recto) es más frecuente en mujeres jóvenes que en mujeres mayores.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

2. Dar a luz muchas veces puede provocar prolapso de órganos pélvicos.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

3. El prolapso de órganos pélvicos puede aparecer a cualquier edad.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

4. Ciertos ejercicios pueden ayudar a detener o evitar que el prolapso de órganos pélvicos empeore.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

5. Los síntomas del prolapso de órganos pélvicos pueden incluir pesadez y/o presión en la pelvis.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

6. Examinar a la paciente es una buena manera para que un médico diagnostique un prolapso de órganos.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

7. Una vez que la paciente tiene un prolapso de órganos pélvicos, **no** se puede hacer mucho para ayudarla.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

8. Levantar peso a diario puede provocar un prolapso de órganos pélvicos.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

9. La cirugía es un tipo de tratamiento para el prolapso de órganos pélvicos.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

10. Los médicos pueden realizar una prueba en sangre para diagnosticar un prolapso de órganos pélvicos.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

11. Los síntomas del prolapso de los órganos pélvicos pueden tratarse con un anillo de goma llamado pesario.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

12. Las personas obesas tienen **menos** probabilidad de tener un prolapso de órganos pélvicos.

☐

De acuerdo

☐

Desacuerdo

☐

No lo sé

RESPUESTAS A LA ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA INCONTINENCIA Y EL PROLAPSO

Preguntas escala de incontinencia urinaria	Respuesta Correcta	Tipo
1. La incontinencia urinaria (pérdida de orina o disfunción de la vejiga) es más común en mujeres jóvenes que en mujeres mayores.	Desacuerdo	E
2. Las disfunciones de vejiga son más frecuentes en mujeres que en hombres.	De acuerdo	E
3. No se puede hacer mucho para tratar las pérdidas de orina, a excepción del uso de compresas y pañales.	Desacuerdo	T
4. Para el tratamiento de la pérdida de orina no es importante realizar un diagnóstico previo del tipo de pérdida.	Desacuerdo	D
5. Las pérdidas de orina pueden deberse a múltiples causas.	De acuerdo	E
6. Efectivamente, los ejercicios pueden ayudarnos a controlar la pérdida de orina.	De acuerdo	T
7. Algunos medicamentos pueden causar la pérdida de orina.	De acuerdo	E
8. Una vez que la persona comienza a perder orina, nunca vuelve a ser capaz de controlarla.	Desacuerdo	T
9. Para diagnosticar las pérdidas de orina los médicos pueden hacer test especiales según el tipo de disfunción de vejiga.	De acuerdo	D
10. La cirugía es el único tratamiento para las pérdidas de orina.	Desacuerdo	T
11. Dar a luz muchas veces puede causar pérdidas de orina.	De acuerdo	E
12. La mayoría de la gente que tiene pérdidas de orina puede curarse o mejorar con algún tipo de tratamiento.	De acuerdo	T

Preguntas escala del prolapso de órganos pélvicos	Respuesta Correcta	Tipo
1. El prolapso de órganos pélvicos (descenso de vagina, útero, vejiga o recto) es más frecuente en mujeres jóvenes que en mujeres mayores.	Desacuerdo	E
2. Dar a luz muchas veces puede provocar prolapso de órganos pélvicos.	De acuerdo	E
3. El prolapso de órganos pélvicos puede aparecer a cualquier edad.	De acuerdo	E
4. Ciertos ejercicios pueden ayudar a detener o evitar que el prolapso de órganos pélvicos empeore.	De acuerdo	T
5. Los síntomas del prolapso de órganos pélvicos pueden incluir pesadez y/o presión en la pelvis.	De acuerdo	E
6. Examinar a la paciente es una buena manera para que un médico diagnostique un prolapso de órganos.	De acuerdo	D
7. Una vez que la paciente tiene un prolapso de órganos pélvicos, no se puede hacer mucho para ayudarla.	Desacuerdo	T
8. Levantar peso a diario puede provocar un prolapso de órganos pélvicos.	De acuerdo	E
9. La cirugía es un tipo de tratamiento para el prolapso de órganos pélvicos.	De acuerdo	T
10. Los médicos pueden realizar una prueba en sangre para diagnosticar un prolapso de órganos pélvicos.	Desacuerdo	D
11. Los síntomas del prolapso de los órganos pélvicos pueden tratarse con un anillo de goma llamado pesario.	De acuerdo	T
12. Las personas obesas tienen menos probabilidad de tener un prolapso de órganos pélvicos.	Desacuerdo	E

Etiología (E); Diagnóstico (D); Tratamiento (T)