Abbauprodukte von Amiloridhydrochlorid

**Klaus Görlitzer *¹, Silke Huth ¹,
Edith Gößnitzer ² und Winfried Wendelin ²**

¹ Institut für Pharmazeutische Chemie der Technischen Universität Braunschweig,
Beethovenstraße 55, D-38106 Braunschweig,

² Institut für Pharmazeutische Chemie und Pharmazeutische Technologie der Karl-
Franzens-Universität Graz, Schubertstraße 1, A-8010 Graz

Zusammenfassung

Erhitzen von Amiloridhydrochlorid (**1** • HCl) in Acetatpuffer pH 4.6 führte zu Amiloridacetat (**1** • AcOH), dem Pyrazindiamin **6** und dem Acylureid **7**. Das Pteridinon **3** wurde beim Erhitzen von **1** • HCl in DMF unter Rückfluß erhalten.

Schlagwörter

Amiloridhydrochlorid; Abbauprodukte; 6-Chlor-2,7-diamino-4(3H)-Pteridinone.

Einleitung

Nach Mazzo [1] entstehen aus dem kaliumsparenden Diureticum Amiloridhydrochlorid (**1** • HCl) [2] in wässriger Lösung bei erhöhten Temperaturen und verschiedenen pH-Werten drei Abbauprodukte. Durch saure Hydrolyse bei pH < 1 überwiegt die 6-Hydroxy-Verbindung **2** [3], bei pH ~ 5 sind das Pteridin-Derivat **3** und die Carbonsäure **4** [4] vorhanden,

während in alkalischer Lösung ($\text{pH} > 13$) das Anion von **4** vorherrscht (Schema 1).

Schema 1: Abbauprodukte von Amiloridhydrochlorid (**1** · HCl) in wässriger Lösung [1]

Spektroskopische und analytische Daten für das Pteridinon **3** liegen nicht vor. Unser Interesse an dem Pteridinon **3** wurde ursprünglich aus einem anderen Grunde geweckt. Wir vermuteten, daß es sich bei dem blau fluoreszierenden Produkt der Farbreaktion von Amiloridhydrochlorid Ph. Eur. [5] um diese Substanz handelt. Amilorid [2] wird jedoch durch Hypobromit

zum 3-(3-Amino-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-5-chlor-2,6-pyrazindiamin (**5**) [6] dehydriert (Schema 2).

Schema 2: Farbreaktion von Amilorid (**1**) nach Ph. Eur. [6]

Wir haben nun die Untersuchungen zur Stabilität von Amiloridhydrochlorid im schwach saurem Milieu wiederholt, um das Pteridinon **3** in die Hand zu bekommen.

Ergebnisse und Diskussion

Amiloridhydrochlorid (**1** • HCl) wurde in einem Acetatpuffer pH 4.6 unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen kristallisierte eine bräunliche Substanz aus, die bei der DC mit verschiedenen Eluenten das gleiche Fließverhalten wie das Edukt zeigte. Auch im EI-MS stimmte der Molpeak und das Fragmentierungsschema mit dem der Base Amilorid (**1**) überein. Wegen der Schwerlöslichkeit der Substanz ließ sich kein ^1H -NMR-Spektrum anfertigen. Im IR-Spektrum der Substanz konnten jedoch beim Vergleich mit dem von **1** • HCl Unterschiede festgestellt werden. Die Elementaranalyse bewies, daß die Verbindung als Amiloridacetat (**1** • AcOH) vorlag.

Das Filtrat zeigte das DC zwei Abbauprodukte, von denen sich die lipophilere Substanz mit Chloroform aus alkalischer Lösung abtrennen ließ. Es handelt

sich bei dieser Verbindung um das 3-Chlor-2,6-pyrazindiamin (**6**). Im ^1H -NMR-Spektrum werden drei Singulets für das 3-H und die jeweils 2 Protonen der beiden Aminogruppen registriert. Im ^{13}C -NMR-Spektrum treten vier Signale für C-2, C-3, C-5 und C-6 auf. Ihre chemischen Verschiebungen entsprechen annähernd den Werten, die durch Inkrementrechnungen ausgehend von Pyrazin ($\delta = 145.3$), unter Verwendung der Inkremente für substituierte Pyridine [7], berechnet wurden. Zudem sind die Werte für die quartären Kohlenstoffe C-2 und C-3 mit jenen von 3-Chlor-5-iod-2,6-pyrazindiamin [8] vergleichbar.

Schema 3: Abbauprodukte von Amiloridhydrochlorid (**1 · HCl**)
im Acetatpuffer pH 4.6

Im EI-MS ist neben dem Molpeak nach Abspaltung von Cyanwasserstoff ein weiterer intensitätsstarker Peak für $\text{M}^+ - 27$ zu erkennen. Um von **1 · HCl** zum Pyrazin **6** zu gelangen, muß Hydrolyse zur 3,5-Diamino-6-chlor-2-pyrazincarbonsäure (**4**) mit anschließender Decarboxylierung erfolgt sein (Schema 3).

Das hydrophilere Produkt wurde bei pH 6 mit *tert*-Butylmethylether ausgeschüttelt und als *N*-[(3,5-Diamino-6-chlor-2-pyrazinyl)carbonyl]harnstoff (**7**) identifiziert. Das Hydrolyse-produkt **7** ist literaturbekannt [9]. Das ^1H -NMR-Spektrum zeigt drei NH-Signale im Verhältnis von 1 : 1 : 5. Die ^{13}C -NMR-Daten stimmen mit berechneten Werten [10] bzw. mit denen von Amilorid (**1**) gut überein. Im EI-MS (M^+ bei 230/232) wird die Seitenkette unter Eliminierung von Ammoniak zum 3,5-Diamino-6-chlor-2-pyrazincarboxyl-isocyanat (m/z 213/215) abgebaut. Andererseits wird unter Abspaltung von Isocyansäure das Fragment m/z 187/189 für 3,5-Diamino-6-chlor-2-pyrazincarboxamid erhalten. Weitere Fragmentationen sind mit denen von Amilorid (**1**) identisch [6].

Schema 4: Versuche zur Synthese des Pteridinons **3**

Zur gezielten Darstellung des Pteridinons **3** wurden Versuche zur thermischen Cyclisierung der Amilorid-Base (**1**) [2] vorgenommen:

- a. trockenes Erhitzen in der Mikrowelle,
- b. Erhitzen in *n*-Butanol, auch in Gegenwart von Kalium-*tert*-butanolat und
- c. Erhitzen in Eisessig.

Stets wurde eine nicht trennbare Produktpalette erhalten.

Beim Erhitzen in Methanol wurde dagegen der Methylester **8** [2,11] rein isoliert. Um die Reaktivität des Esters zu prüfen, wurde sowohl mit Harnstoff /Natriumethanolat als auch mit Thioharnstoff/Natriumethanolat und Ethanol als Lösemittel erhitzt. Der gebildete gelbliche Niederschlag war wasserlöslich. Die nach Zugabe von Salzsäure ausgefällte Substanz erweist sich als 3,5-Diamino-6-chlor-2-pyrazincarbonsäure (**4**) [4,11]. Nach Umsetzung des Esters **8** mit Cyanamid in Dimethylformamid (DMF) und Kalium-*tert*-butanolat als Katalysator konnte anstelle des Pteridinons **3** ebenfalls nur die Säure **4** isoliert werden (Schema 4).

Daraufhin wurde Amiloridhydrochlorid (**1** • HCl) in DMF unter Rückfluß erhitzt. Aus der heißen Lösung fiel eine gelbe Substanz aus, die im EI-MS den für das Pteridinon **3** geforderten Molpeak m/z 212/214 zeigte. Unter Abspaltung eines Carbodiimid-Radikals wird mit m/z 171/173 ein Pyrazincabonylium-Fragment gebildet. Wegen der Schwerlöslichkeit der Verbindung **3** konnte das ^{13}C -NMR-Spektrum nur in deuterierter Trifluoressigsäure (D-TFA) aufgenommen werden. Die Auswertung des Spektrums erfolgte durch Vergleich mit den Spektren von 2-Amino-4(3*H*)-pteridinon (**9**) und 2-Amino-6,7-dimethyl-4(3*H*)-pteridinon (**10**) [12], die ebenfalls in D-TFA vermessen wurden. Bei Pterinen erfolgt in TFA Protonierung an N-1 [13]. Das ^{13}C -NMR-Spektrum des Pteridinons **3** zeigt 6 quartäre Kohlenstoffatome und die gefundenen chemischen Verschiebungen für C-2, C-4 und C-8a stimmen gut mit den Verbindungen **9** und **10** überein.

Schema 5: ^{13}C -Verschiebungen (*kursiv*) von **3** und den Referenzsubstanzen **9** und **10**

Berechnet man die ungefähren chemischen Verschiebungen für C-4a, C-6, C-7 und C-8a von **3**, ausgehend von den korrespondierenden Werten beim Vergleichskörper **9** unter Verwendung der Inkremente für Cl und NH₂ bei Pyridin [7], so zeigt sich, daß auch diese Werte (116.6; 130.4; 164.2; 145.5) gut mit den bei **3** gefundenen übereinstimmen (vgl. Schema 5).

Der endgültige Strukturbeweis für **3** durch Röntgenkristallanalyse schlug fehl, da der aus DMSO gewonnene Einkristall sich als nicht messbarer Zwilling herausstellte.

Wurde Amiloridhydrochlorid (**1** • HCl) in Salzsäure (1 mol/l) (pH 0) unter Rückfluß erhitzt, so fiel nach einigen Stunden aus der siedenden Lösung eine gelbliche kristalline Substanz aus, die als Hydrochlorid des 5-Hydroxypyrazin-Derivats **2** identifiziert wurde. **2** • HCl dürfte wie **1** • HCl in der Acylamino-Struktur vorliegen. Das ¹H-NMR-Spektrum in [D₁₈]HMPT zeigt fünf Singulets für die NH-Protonen, während das Resonanzsignal des sauren Protons der Hydroxyl-Gruppe (pK_a = 5.45 [13]) im Rauschpegel verschwindet. Die Signalzuordnung im ¹³C-NMR-Spektrum wurde durch Vergleich mit den ¹³C-NMR-Daten von Amiloridhydrochlorid (**1** • HCl) [6] vorgenommen. Die Signale für C-5 und C-9 zeigen die gleiche chemische Verschiebung (Schema 6).

Schema 6: ¹H- und ¹³C (*kursiv*)-Verschiebungen von **2** • HCl

Das EI-MS von **2** • HCl zeigt neben dem Molpeak von m/z 230/232 für die Base ein dem **1** • HCl entsprechendes Fragmentierungsschema [6], deren Peaks aufgrund des Austausches der 5-Amino- gegen die 5-Hydroxyl-Gruppe um jeweils eine Masseneinheit größer sind.

Mehrständiges Erhitzen von **1** • HCl in Natronlauge (pH 13.5) ergab nach Ansäuern die Carbonsäure **4**, wie die spektroskopischen Daten [2] zeigten.

Experimenteller Teil

Allgemeine Angaben und Geräte: [6]. * bedeutet: Zuordnung nicht gesichert.

N-/(3-Amino-6-chlor-5-hydroxy-2-pyrazinyl)carbonyl]guanidinhydrochlorid (2 • HCl)

0,3 g (1 mmol) **1** • HCl-Dihydrat werden in 50 ml 1 mol/l HCl 24 h unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Abkühlen wird der Niederschlag abfiltriert, mit EtOH und Et₂O gewaschen. Ausbeute: 230 mg (87%). Gelbes Pulver, Fp. > 350 °C, > 300 °C [3]. ¹H-NMR ([D₁₈]HMPT): δ (ppm) = 10.67 (s, NH), 9.49 (s, 2H), 9.40 (s, 2H), 8.46 (s, 1H), 8.30 (s, 1H). ¹³C-NMR ([D₁₈]HMPT): δ (ppm) = 103.48 (C-2), 129.71 (C-6), 153.26 (C-3), 157.48 (C-5, C-9), 166.3 (C-7). MS (EI): m/z (%) = 230 (25) [M]⁺, 213 (100). IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3438 cm⁻¹, 3398, 3307, 3041 (OH, NH), 1676 (C=O), 1621, (C=N, C=C). CHN für C₆H₇ClN₆O₂ • HCl (267.1). Ber: C 26.98 H 3.02 N 31.47; Gef: C 26.96 H 2.92 N 31.01.

2,7-Diamino-6-chlor-4(3H)-pteridinon (3)

0,3 g (1 mmol) **1** • HCl-Dihydrat werden in 20 ml DMF 8 h unter Rückfluß erhitzt. Der Niederschlag wird abfiltriert, mit DMF, H₂O und MeOH gewaschen. Ausbeute: 40 mg (19%). Gelbes Pulver, Fp. > 350 °C. ¹H-NMR ([D₆]DMSO): δ (ppm) = 6.64 (s, 2H, NH₂), 7.40 (s, 2H, NH₂), 10.89 (s, 1H,

NH). ^{13}C -NMR (D-TFA): δ (ppm) = 116.22 (C-4a), 137.20 (C-6), 149.67 (C-8a), 153.50 (C-2), 157.81 (C-4), 161.46 (C-7). MS (EI): m/z (%) = 212 (100) $[\text{M}]^{+*}$. IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3412 cm^{-1} (NH), 3359, 3150 (NH₂), 1690 (C=O), 1618 (C=N, C=C). HPLC (MeCN/H₂O 20:80): t_s = 0.03 min. CHN für C₆H₅ClN₆O (212.6). Ber: C 33.90 H 2.37 N 39.53; Gef: C 33.03 H 2.30 N 35.91.

N'-[(3,5-diamino-6-chlor-2-pyrazinyl)carbonyl]guanidin acetat (1 · HOAc)

0,91 g (3 mmol) **1 · HCl**-Dihydrat werden in 120 ml H₂O und 30 ml AcOH/AcONa-Puffer pH 4,6 unter Rückfluß 24 h erhitzt. Nach dem Abkühlen wird der Niederschlag abgesaugt. Ausbeute: 160 mg (18%). Braune Kristalle, Fp. ab 240 °C (Zers.). MS (EI): m/z (%) = 229 (100) $[\text{M}]^{+*}$, 212 (20). IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3400 cm^{-1} , 3337, 3060 (NH), 1708 (C=O), 1667, 1620 (C=N, C=C). CHN für C₆H₈ClN₇O · CH₃COOH (289.6). Ber: C 33.17 H 4.18 N 33.85; Gef: C 33.08 H 4.17 N 33.61.

3-Chlor-2,6-pyrazindiamin (6)

Das Filtrat von **1 · HOAc** wird mit Natronlauge alkalisiert und 3 x mit 70 ml CHCl₃ ausgeschüttelt. Die organische Phase wird über Na₂SO₄ getrocknet und i. Vak. abgezogen. Ausbeute: 30 mg (7%). Gelbe Nadeln, Fp. 170 °C (Toluol). ^1H -NMR ([D₆]DMSO): δ (ppm) = 6.86 (s, 5-H), 6.07 (s, NH₂), 5.98 (s, NH₂). ^{13}C -NMR ([D₆]DMSO): δ (ppm) = 116.74 (C-5), 117.29 (C-3), 150.21 (C-6), 154.23 (C-2). MS (EI): m/z (%) = 144 (100) $[\text{M}]^{+*}$, 117 (50). IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3467 cm^{-1} , 3308, 3154 (NH), 1644, 1614 (C=N, C=C). CHN für C₄H₅ClN₄ (144.5). Ber: C 33.23 H 3.48 N 38.76; Gef: C 33.77 H 3.38 N 37.57.

N'-[(3,5-Diamino-6-chlor-2-pyrazinyl)carbonyl]harnstoff (7)

Die verbleibende wässrige Phase von Substanz **6** wird auf pH 6 eingestellt und 3 x mit *tert*-BuOMe ausgeschüttelt. Nach Trocknen über

Na_2SO_4 wird das Lösungsmittel i. Vak. abdestilliert. Ausbeute: 14 mg (2%), Fp. 260 °C (MeOH) [9]. $^1\text{H-NMR}$ ($[\text{D}_6]\text{DMSO}$): δ (ppm) = 8.84 (s, 1H), 7.68 (s, 1H), 7.33 (s, 5H). $^{13}\text{C-NMR}$ ($[\text{D}_6]\text{DMSO}$): δ (ppm) = 109.67 (C-2), 118.68 (C-6), 152.95 * (C-3), 153.93 * (C-5), 155.37 * (C-9), 164.92 (C-7). MS (EI): m/z (%) = 230 (30) $[\text{M}]^{+}$, 213 (100). IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3466 cm^{-1} , 3328, 3153 (NH), 1727, 1671 (C=O), 1637, 1617 (C=N, C=C).

Methyl-3,5-diamino-6-chlor-2-pyrazincarboxylat (8)

0,23 g (1 mmol) **1** werden in einer Mischung aus 25 ml CHCl_3 und 25 ml MeOH 17 h unter Rückfluß erhitzt. Es wird mit 50 ml Wasser und anschließend 4 x mit 50 ml CHCl_3 ausgeschüttelt. Die vereinigten organischen Phasen werden über Na_2SO_4 getrocknet und i. Vak. abdestilliert. Ausbeute: 120 mg (60%). Gelbe Nadeln, Fp. 207 °C (MeOH), 212-213 °C (MeCN) [2]. $^1\text{H-NMR}$ ($[\text{D}_6]\text{DMSO}$): δ (ppm) = 3.73 (s, CH_3), 7.10 (s, 2H), 7.20 (s, 2H). $^{13}\text{C-NMR}$ ($[\text{D}_6]\text{DMSO}$): δ (ppm) = 51.1 (C-8), 109.4 (C-2), 119.2 (C-6), 153.2 * (C-5), 155.8 * (C-3), 165.8 (C-7). MS (EI): m/z (%) = 202 (100) $[\text{M}]^{+}$, 144 (75). IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3477 cm^{-1} , 3449, 3355, 3150 (N-H), 1669 (C=O), 1644, 1605 (C=N, C=C). UV (Dioxan): λ_{max} (lg ϵ) = 269 nm (4.19), 351 (4.16). Fluoreszenz (Dioxan/Anregungswellenlänge 270 nm): λ_{max} = 400 nm. CHN für $\text{C}_6\text{H}_7\text{ClN}_4\text{O}_2$ (202.6). Ber: C 35.57 H 3.48 N 27.65; Gef: C 35.60 H 3.45 N 27.47.

3,5- Diamino-6-chlor-2-pyrazincarbonsäure (4)

0,23 g (1 mmol) **1** wird in 50 ml H_2O suspendiert. Es wird mit 4 mol/l NaOH auf pH 13,5 eingestellt und 7h bei 90 °C erwärmt. Nach dem Abkühlen wird angesäuert, der Niederschlag abgesaugt und mit H_2O , wenig EtOH abs. und Et_2O gewaschen. Ausbeute: 110 mg (57%). Hellgelbes Pulver, Fp. 225

°C (DMSO/H₂O), 230-231 °C, 272 °C (DMSO/H₂O) [4]. ¹H-NMR ([D₆]DMSO): δ (ppm) = 12.13 (s, OH), 7.21 (s, 4H). ¹³C-NMR ([D₆]DMSO): δ (ppm) = 110.1(C-2), 118.7 (C-6), 153.2 * (C-5), 155.9 * (C-3), 167.3 (C-7). MS (EI): m/z (%) = 188 (100) [M]⁺, 144 (80). IR (KBr): $\tilde{\nu}$ = 3619 cm⁻¹, 3415, 3317, 3167 (OH, NH₂), 1664 (C=O), 1618, 1559 (C=N, C=C). UV (Dioxan): $\lambda_{\max}$ (lg ϵ) = 269 nm (4.11), 352 (4.08). CHN für C₅H₅ClN₄O₂ (188.6). Ber: C 31.85 H 2.67 N 29.71; Gef: C 31.93 H 2.80 N 29.46.

Literatur

- [1] Mazzo D J in Florey K, editor.
Analytical Profiles of Drug Substances,
Volume 15, Academic. Press, New York, 1986: 1-34.
- [2] Smith R L, Cochran D W, Gund P, Cragoe, Jr. E J.
Proton, Carbon-13, and Nitrogen-15 Nuclear Magnetic Resonance and
CNDO/2 Studies on the Tautomerism and Conformation of Amiloride, a
Novel Acylguanidine.
J. Am. Chem. Soc. 1979; 101: 191-201.
- [3] Cragoe, Jr. E J, Woltersdorf, Jr. O W, Bicking J B, Kwong S F, Jones J
H.
Pyrazine Diuretics. II., N-Amidino-3-amino-5-substituted 6-Halopyra-
zinecarboxamides.
J. Med. Chem. 1967; 10: 66-75.
- [4] Shepard K L, Mason J W, Woltersdorf, Jr. O W, Jones J H, Cragoe, Jr.
E J.
Pyrazine Diuretics. VI. (Pyrazinecarboxamido)Guanidines.
J. Med. Chem. 1969; 12: 280-285.
- [5] Europäisches Arzneibuch 2002. 4th ed.

- Deutscher Apotheker Verlag Stuttgart, Govi-Verlag – Pharmazeutischer Verlag GmbH Eschborn, 2002: 1169.
- [6] Görlitz K, Huth S, Jones P G, Gößnitzer E, Wendelin W.
Zur Farbreaktion von Amiloridhydrochlorid Ph. Eur.
Sci. Pharm. 2001; 69: 275-287.
- [7] Kalinowski H-O, Berger S, Braun S.
¹³C NMR Spektroskopie. Georg Thieme: Stuttgart, 1984.
- [8] Chapdelaine M J, Warwick P J, Shaw A.
An Efficient Method for Preparation of 3,5-Diamino-6-chloropyrazin-2-yl
Alkylketones Using a Novel Acetylene Hydration Method.
J. Org. Chem. 1989; 54: 1218-1221.
- [9] Hanifin J W, Capuzzi R, Cohen E.
The Preparation of Substituted N-Carbamoylpyrazinecarboxamides.
J. Med. Chem. 1969; 12: 1102-1103.
- [10] ACD/CNMR Predictor, Release 7.00, Product Version 7.07
- [11] Tobias S, Günther H, Pfeleiderer W.
Pteridin-Spektren IV.
Chem. Ber. 1985; 118: 354-362.
- [12] Ewers U, Günther H, Jaenicke L.
Pteridin-Spektren III.
Chem. Ber. 1974; 107: 3275-3286.
- [13] Bock M G, Schlegel H B, Smith G M.
Theoretical Estimation of pK_a Values of Pyrazinylguanidine Derivatives.
J. Org. Chem. 1981; 46: 1925-1927.