

**1. ANZAHL FRAGEBOGEN NACH ZENTREN, SPRACHE UND ERHEBUNGSART**  
**Alle Fälle (Datenerfassung Stand 12.03.2018)**

		Fragebogen Abgabe				Total	
		Papier		Online		N	col%
		N	row%	N	row%		
Total		186	87.3%	27	12.7%	213	100.0%
1. Sind Sie weiblich oder männlich?	Weiblich	140	90.3%	15	9.7%	155	72.8%
	Männlich	44	80.0%	11	20.0%	55	25.8%
	Keine Angabe	2	66.7%	1	33.3%	3	1.4%
Sprache:	Deutsch	143	88.3%	19	11.7%	162	76.1%
	Français	43	84.3%	8	15.7%	51	23.9%
Zentrum:	03 - KSSG	7	77.8%	2	22.2%	9	4.2%
	05 - LUKS	52	94.5%	3	5.5%	55	25.8%
	06 - Neurologie Löwenplatz (LU)	12	92.3%	1	7.7%	13	6.1%
	09 - Neurozentrum Bellevue (ZH)	9	69.2%	4	30.8%	13	6.1%
	10 - Hirslanden (ZH)	14	100.0%			14	6.6%
	11 - Kantonsspital Münsterlingen	1	50.0%	1	50.0%	2	0.9%
	12 - Neurozentrum Bern	22	84.6%	4	15.4%	26	12.2%
	14 - Spitalzentrum Biel	17	94.4%	1	5.6%	18	8.5%
	15 - Praxis Welter/Fritschi, Thun	14	82.4%	3	17.6%	17	8.0%
	16 - Dr. Bock, Zofingen	5	83.3%	1	16.7%	6	2.8%
	23 - Privatklinik Carouge	11	64.7%	6	35.3%	17	8.0%
	24 - Privatklinik Lausanne	15	93.8%	1	6.3%	16	7.5%
	25 - Privatklinik Genf	6	100.0%			6	2.8%
	27 - Spital Wallis	1	100.0%			1	0.5%
Fragebogen brauchbar?	ja	185	87.3%	27	12.7%	212	99.5%
	Fragebogen leer	1	100.0%			1	0.5%

## 2.1 FRAGE 1: GESCHLECHT NACH KEY VARIABLEN I

		1. Sind Sie weiblich oder männlich?						Total	
		Weiblich		Männlich		Keine Angabe		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%		
Total		155	100.0%	55	100.0%	2	100.0%	212	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	155	100.0%					155	73.1%
	Männlich			55	100.0%			55	25.9%
	Keine Angabe					2	100.0%	2	0.9%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	30	19.4%	3	5.5%			33	15.6%
	31 – 40 Jahre	40	25.8%	16	29.1%			56	26.4%
	41 – 45 Jahre	25	16.1%	12	21.8%			37	17.5%
	über 45 Jahre	60	38.7%	24	43.6%			84	39.6%
	Keine Angabe					2	100.0%	2	0.9%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	15	9.7%	2	3.6%			17	8.0%
	Berufslehre/ - schule	76	49.0%	22	40.0%			98	46.2%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	38	24.5%	22	40.0%			60	28.3%
	Universität / Fachhochschule	26	16.8%	8	14.5%			34	16.0%
	Keine Angabe			1	1.8%	2	100.0%	3	1.4%
Form der MS:	CIS	3	1.9%	2	3.6%			5	2.4%
	RRMS	144	92.9%	45	81.8%	1	50.0%	190	89.6%
	SPMS	7	4.5%	8	14.5%			15	7.1%
	Keine Angabe	1	0.6%			1	50.0%	2	0.9%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	12	7.7%	6	10.9%			18	8.5%
	1 – 3 Jahre	24	15.5%	5	9.1%			29	13.7%
	3 – 5 Jahre	19	12.3%	9	16.4%			28	13.2%
	5 – 10 Jahre	32	20.6%	12	21.8%	1	50.0%	45	21.2%
	10 – 15 Jahre	23	14.8%	12	21.8%			35	16.5%
	> 15 Jahre	45	29.0%	11	20.0%			56	26.4%
	Keine Angabe					1	50.0%	1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	83	53.5%	34	61.8%	1	50.0%	118	55.7%
	mittel	19	12.3%	7	12.7%			26	12.3%
	schlecht/sehr schlecht	48	31.0%	14	25.5%	1	50.0%	63	29.7%
	Keine Angabe	5	3.2%					5	2.4%

## 2.2 FRAGE 1: GESCHLECHT NACH KEY VARIABLEN II

		1. Sind Sie weiblich oder männlich?						Total	
		Weiblich		Männlich		Keine Angabe		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%		
Total		155	100.0%	55	100.0%	2	100.0%	212	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	30	19.4%	11	20.0%			41	19.3%
	nein	116	74.8%	40	72.7%	2	100.0%	158	74.5%
	Keine Angabe	9	5.8%	4	7.3%			13	6.1%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	3	1.9%	1	1.8%			4	1.9%
	Injizierbare	113	72.9%	37	67.3%	1	50.0%	151	71.2%
	Gilenya	15	9.7%	7	12.7%			22	10.4%
	Tecfidera	11	7.1%	3	5.5%			14	6.6%
	Tysabri	8	5.2%	1	1.8%	1	50.0%	10	4.7%
	Andere	2	1.3%	2	3.6%			4	1.9%
	Keine Angabe	3	1.9%	4	7.3%			7	3.3%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	105	67.7%	45	81.8%	2	100.0%	152	71.7%
	ja	50	32.3%	10	18.2%			60	28.3%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	5	3.2%	3	5.5%			8	3.8%
	Injizierbare	32	20.6%	7	12.7%			39	18.4%
	Gilenya	42	27.1%	22	40.0%			64	30.2%
	Tecfidera	15	9.7%	4	7.3%	1	50.0%	20	9.4%
	Tysabri	44	28.4%	12	21.8%	1	50.0%	57	26.9%
	Andere	2	1.3%	1	1.8%			3	1.4%
	keine Therapie	15	9.7%	4	7.3%			19	9.0%
	Keine Angabe			2	3.6%			2	0.9%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	144	92.9%	54	98.2%	2	100.0%	200	94.3%
	ja	11	7.1%	1	1.8%			12	5.7%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	41	26.5%	16	29.1%	1	50.0%	58	27.4%
	Zweite MS Therapie	59	38.1%	24	43.6%	1	50.0%	84	39.6%
	Dritte oder mehr	38	24.5%	10	18.2%			48	22.6%
	Keine Angabe	17	11.0%	5	9.1%			22	10.4%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	94	60.6%	32	58.2%	2	100.0%	128	60.4%
	nein	43	27.7%	13	23.6%			56	26.4%
	Keine Angabe	18	11.6%	10	18.2%			28	13.2%

### 2.3 FRAGE 2: ALTERSGRUPPEN NACH KEY VARIABLEN I

		Altersgruppe:										Total	
		bis 30 Jahre		31 – 40 Jahre		41 – 45 Jahre		über 45 Jahre		Keine Angabe		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total		33	100.0%	56	100.0%	37	100.0%	84	100.0%	2	100.0%	212	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	30	90.9%	40	71.4%	25	67.6%	60	71.4%			155	73.1%
	Männlich	3	9.1%	16	28.6%	12	32.4%	24	28.6%			55	25.9%
	Keine Angabe									2	100.0%	2	0.9%
2. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?	unter 20 Jahre alt	2	6.1%									2	0.9%
	20 - 30 Jahre alt	31	93.9%									31	14.6%
	31 – 40 Jahre alt			56	100.0%							56	26.4%
	41 – 45 Jahre alt					37	100.0%					37	17.5%
	über 45 Jahre alt							84	100.0%			84	39.6%
	Keine Angabe									2	100.0%	2	0.9%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	2	6.1%	1	1.8%	4	10.8%	10	11.9%			17	8.0%
	Berufslehre/ - schule	18	54.5%	29	51.8%	14	37.8%	37	44.0%			98	46.2%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	6	18.2%	13	23.2%	15	40.5%	26	31.0%			60	28.3%
	Universität / Fachhochschule	6	18.2%	13	23.2%	4	10.8%	11	13.1%			34	16.0%
	Keine Angabe	1	3.0%							2	100.0%	3	1.4%
Form der MS:	CIS	2	6.1%	1	1.8%			2	2.4%			5	2.4%
	RRMS	31	93.9%	54	96.4%	34	91.9%	70	83.3%	1	50.0%	190	89.6%
	SPMS			1	1.8%	2	5.4%	12	14.3%			15	7.1%
	Keine Angabe					1	2.7%			1	50.0%	2	0.9%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	7	21.2%	6	10.7%	2	5.4%	3	3.6%			18	8.5%
	1 – 3 Jahre	13	39.4%	11	19.6%	1	2.7%	4	4.8%			29	13.7%
	3 – 5 Jahre	7	21.2%	9	16.1%	4	10.8%	8	9.5%			28	13.2%
	5 – 10 Jahre	6	18.2%	13	23.2%	11	29.7%	14	16.7%	1	50.0%	45	21.2%
	10 – 15 Jahre			10	17.9%	10	27.0%	15	17.9%			35	16.5%
	> 15 Jahre			7	12.5%	9	24.3%	40	47.6%			56	26.4%
	Keine Angabe									1	50.0%	1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	20	60.6%	35	62.5%	18	48.6%	44	52.4%	1	50.0%	118	55.7%
	mittel	5	15.2%	4	7.1%	4	10.8%	13	15.5%			26	12.3%
	schlecht/sehr schlecht	8	24.2%	16	28.6%	12	32.4%	26	31.0%	1	50.0%	63	29.7%
	Keine Angabe			1	1.8%	3	8.1%	1	1.2%			5	2.4%

## 2.4 FRAGE 2: ALTERSGRUPPEN NACH KEY VARIABLEN II

		Altersgruppe:									Total		
		bis 30 Jahre		31 – 40 Jahre		41 – 45 Jahre		über 45 Jahre		Keine Angabe			
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%
Total		33	100.0%	56	100.0%	37	100.0%	84	100.0%	2	100.0%	212	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	9	27.3%	6	10.7%	4	10.8%	22	26.2%			41	19.3%
	nein	23	69.7%	44	78.6%	31	83.8%	58	69.0%	2	100.0%	158	74.5%
	Keine Angabe	1	3.0%	6	10.7%	2	5.4%	4	4.8%			13	6.1%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio					1	2.7%	3	3.6%			4	1.9%
	Injizierbare	18	54.5%	35	62.5%	26	70.3%	71	84.5%	1	50.0%	151	71.2%
	Gilenya	6	18.2%	10	17.9%	4	10.8%	2	2.4%			22	10.4%
	Tecfidera	7	21.2%	4	7.1%	3	8.1%					14	6.6%
	Tysabri	1	3.0%	3	5.4%	2	5.4%	3	3.6%	1	50.0%	10	4.7%
	Andere	1	3.0%	1	1.8%			2	2.4%			4	1.9%
	Keine Angabe			3	5.4%	1	2.7%	3	3.6%			7	3.3%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	25	75.8%	45	80.4%	25	67.6%	55	65.5%	2	100.0%	152	71.7%
	ja	8	24.2%	11	19.6%	12	32.4%	29	34.5%			60	28.3%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio			1	1.8%	3	8.1%	4	4.8%			8	3.8%
	Injizierbare	5	15.2%	7	12.5%	2	5.4%	25	29.8%			39	18.4%
	Gilenya	13	39.4%	14	25.0%	16	43.2%	21	25.0%			64	30.2%
	Tecfidera	5	15.2%	5	8.9%	2	5.4%	7	8.3%	1	50.0%	20	9.4%
	Tysabri	8	24.2%	22	39.3%	11	29.7%	15	17.9%	1	50.0%	57	26.9%
	Andere			1	1.8%	1	2.7%	1	1.2%			3	1.4%
	keine Therapie	2	6.1%	6	10.7%	2	5.4%	9	10.7%			19	9.0%
	Keine Angabe							2	2.4%			2	0.9%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	32	97.0%	55	98.2%	37	100.0%	74	88.1%	2	100.0%	200	94.3%
	ja	1	3.0%	1	1.8%			10	11.9%			12	5.7%
Anzahl MS Langzeit- Therapien:	Erste MS Therapie	14	42.4%	13	23.2%	6	16.2%	24	28.6%	1	50.0%	58	27.4%
	Zweite MS Therapie	12	36.4%	23	41.1%	17	45.9%	31	36.9%	1	50.0%	84	39.6%
	Dritte oder mehr	5	15.2%	14	25.0%	10	27.0%	19	22.6%			48	22.6%
	Keine Angabe	2	6.1%	6	10.7%	4	10.8%	10	11.9%			22	10.4%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	16	48.5%	33	58.9%	18	48.6%	59	70.2%	2	100.0%	128	60.4%
	nein	14	42.4%	14	25.0%	13	35.1%	15	17.9%			56	26.4%
	Keine Angabe	3	9.1%	9	16.1%	6	16.2%	10	11.9%			28	13.2%

## 2.5 FRAGE 3: HÖCHSTE BERUFSAUSBILDUNG NACH KEY VARIABLEN I

		höchste Berufsausbildung:										Total	
		Obligatorische Schule/Anlehre		Berufslehre/ - schule		Höhere Fach- und Berufsausbildung		Universität / Fachhochschule		Keine Angabe		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total		17	100.0%	98	100.0%	60	100.0%	34	100.0%	3	100.0%	212	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	15	88.2%	76	77.6%	38	63.3%	26	76.5%			155	73.1%
	Männlich	2	11.8%	22	22.4%	22	36.7%	8	23.5%	1	33.3%	55	25.9%
	Keine Angabe									2	66.7%	2	0.9%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	2	11.8%	18	18.4%	6	10.0%	6	17.6%	1	33.3%	33	15.6%
	31 – 40 Jahre	1	5.9%	29	29.6%	13	21.7%	13	38.2%			56	26.4%
	41 – 45 Jahre	4	23.5%	14	14.3%	15	25.0%	4	11.8%			37	17.5%
	über 45 Jahre	10	58.8%	37	37.8%	26	43.3%	11	32.4%			84	39.6%
	Keine Angabe									2	66.7%	2	0.9%
3. Welches ist Ihre höchste Berufsausbildung?	weniger als 7 Jahre Schule	1	5.9%									1	0.5%
	Obligatorische Schule	8	47.1%									8	3.8%
	Anlehre	8	47.1%									8	3.8%
	Berufslehre/ - schule			98	100.0%							98	46.2%
	Maturitätsschule / Berufsmaturität / Diplommittelschule					13	21.7%					13	6.1%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung					47	78.3%					47	22.2%
	Universität / Fachhochschule							34	100.0%			34	16.0%
	Keine Angabe									3	100.0%	3	1.4%
Form der MS:	CIS			2	2.0%	2	3.3%	1	2.9%			5	2.4%
	RRMS	16	94.1%	87	88.8%	53	88.3%	32	94.1%	2	66.7%	190	89.6%
	SPMS			9	9.2%	5	8.3%	1	2.9%			15	7.1%
	Keine Angabe	1	5.9%							1	33.3%	2	0.9%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate			5	5.1%	5	8.3%	8	23.5%			18	8.5%
	1 – 3 Jahre	2	11.8%	13	13.3%	8	13.3%	5	14.7%	1	33.3%	29	13.7%
	3 – 5 Jahre	1	5.9%	15	15.3%	5	8.3%	7	20.6%			28	13.2%
	5 – 10 Jahre	5	29.4%	18	18.4%	13	21.7%	8	23.5%	1	33.3%	45	21.2%
	10 – 15 Jahre	5	29.4%	16	16.3%	11	18.3%	3	8.8%			35	16.5%
	> 15 Jahre	4	23.5%	31	31.6%	18	30.0%	3	8.8%			56	26.4%
	Keine Angabe									1	33.3%	1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	11	64.7%	53	54.1%	31	51.7%	21	61.8%	2	66.7%	118	55.7%
	mittel	2	11.8%	10	10.2%	9	15.0%	5	14.7%			26	12.3%
	schlecht/sehr schlecht	2	11.8%	34	34.7%	19	31.7%	7	20.6%	1	33.3%	63	29.7%
	Keine Angabe	2	11.8%	1	1.0%	1	1.7%	1	2.9%			5	2.4%

## 2.6 FRAGE 3: HÖCHSTE BERUFSAUSBILDUNG NACH KEY VARIABLEN II

		höchste Berufsausbildung:										Total	
		Obligatorische Schule/Anlehre		Berufslehre/ - schule		Höhere Fach- und Berufsausbildung		Universität / Fachhochschule		Keine Angabe		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total		17	100.0%	98	100.0%	60	100.0%	34	100.0%	3	100.0%	212	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	3	17.6%	15	15.3%	13	21.7%	9	26.5%	1	33.3%	41	19.3%
	nein	14	82.4%	74	75.5%	44	73.3%	24	70.6%	2	66.7%	158	74.5%
	Keine Angabe			9	9.2%	3	5.0%	1	2.9%			13	6.1%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	2	11.8%	2	2.0%							4	1.9%
	Injizierbare	11	64.7%	74	75.5%	46	76.7%	18	52.9%	2	66.7%	151	71.2%
	Gilenya	2	11.8%	8	8.2%	6	10.0%	6	17.6%			22	10.4%
	Tecfidera			6	6.1%	3	5.0%	5	14.7%			14	6.6%
	Tysabri	2	11.8%	4	4.1%			3	8.8%	1	33.3%	10	4.7%
	Andere			1	1.0%	2	3.3%	1	2.9%			4	1.9%
	Keine Angabe			3	3.1%	3	5.0%	1	2.9%			7	3.3%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	12	70.6%	66	67.3%	47	78.3%	24	70.6%	3	100.0%	152	71.7%
	ja	5	29.4%	32	32.7%	13	21.7%	10	29.4%			60	28.3%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	2	11.8%	3	3.1%	2	3.3%	1	2.9%			8	3.8%
	Injizierbare	1	5.9%	16	16.3%	15	25.0%	7	20.6%			39	18.4%
	Gilenya	6	35.3%	30	30.6%	20	33.3%	8	23.5%			64	30.2%
	Tecfidera	3	17.6%	6	6.1%	5	8.3%	4	11.8%	2	66.7%	20	9.4%
	Tysabri	5	29.4%	28	28.6%	13	21.7%	10	29.4%	1	33.3%	57	26.9%
	Andere			2	2.0%	1	1.7%					3	1.4%
	keine Therapie			12	12.2%	3	5.0%	4	11.8%			19	9.0%
	Keine Angabe			1	1.0%	1	1.7%					2	0.9%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	16	94.1%	93	94.9%	56	93.3%	32	94.1%	3	100.0%	200	94.3%
	ja	1	5.9%	5	5.1%	4	6.7%	2	5.9%			12	5.7%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	4	23.5%	21	21.4%	21	35.0%	11	32.4%	1	33.3%	58	27.4%
	Zweite MS Therapie	4	23.5%	37	37.8%	27	45.0%	14	41.2%	2	66.7%	84	39.6%
	Dritte oder mehr	9	52.9%	26	26.5%	9	15.0%	4	11.8%			48	22.6%
	Keine Angabe			14	14.3%	3	5.0%	5	14.7%			22	10.4%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	12	70.6%	50	51.0%	39	65.0%	25	73.5%	2	66.7%	128	60.4%
	nein	4	23.5%	32	32.7%	12	20.0%	7	20.6%	1	33.3%	56	26.4%
	Keine Angabe	1	5.9%	16	16.3%	9	15.0%	2	5.9%			28	13.2%

## 2.7 FRAGE 4: SICHERHEITSBEDÜRFNIS NACH KEY VARIABLEN I

1 = sehr sicherheitsbedacht - 5 = sehr risikofreudig		4. Einschätzung des Sicherheitsbedürfnisses										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total		40	100%	69	100%	68	100%	23	100%	9	100%	209	100%
Geschlecht:	Weiblich	38	95.0%	48	69.6%	47	69.1%	14	60.9%	7	77.8%	154	73.7%
	Männlich	2	5.0%	21	30.4%	20	29.4%	9	39.1%	2	22.2%	54	25.8%
	Keine Angabe					1	1.5%					1	0.5%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	3	7.5%	13	18.8%	14	20.6%	2	8.7%	1	11.1%	33	15.8%
	31 – 40 Jahre	14	35.0%	19	27.5%	18	26.5%	3	13.0%	1	11.1%	55	26.3%
	41 – 45 Jahre	5	12.5%	13	18.8%	10	14.7%	6	26.1%	2	22.2%	36	17.2%
	über 45 Jahre	18	45.0%	24	34.8%	25	36.8%	12	52.2%	5	55.6%	84	40.2%
	Keine Angabe					1	1.5%					1	0.5%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	3	7.5%	4	5.8%	5	7.4%	3	13.0%	2	22.2%	17	8.1%
	Berufslehre/ - schule	21	52.5%	29	42.0%	36	52.9%	9	39.1%	2	22.2%	97	46.4%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	9	22.5%	23	33.3%	15	22.1%	8	34.8%	4	44.4%	59	28.2%
	Universität / Fachhochschule	7	17.5%	13	18.8%	10	14.7%	3	13.0%	1	11.1%	34	16.3%
	Keine Angabe					2	2.9%					2	1.0%
Form der MS:	CIS	1	2.5%	3	4.3%	1	1.5%					5	2.4%
	RRMS	37	92.5%	61	88.4%	61	89.7%	22	95.7%	8	88.9%	189	90.4%
	SPMS	1	2.5%	5	7.2%	6	8.8%	1	4.3%	1	11.1%	14	6.7%
	Keine Angabe	1	2.5%									1	0.5%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	5	12.5%	4	5.8%	8	11.8%			1	11.1%	18	8.6%
	1 – 3 Jahre	3	7.5%	9	13.0%	16	23.5%	1	4.3%			29	13.9%
	3 – 5 Jahre	5	12.5%	14	20.3%	6	8.8%	3	13.0%			28	13.4%
	5 – 10 Jahre	10	25.0%	16	23.2%	13	19.1%	3	13.0%	3	33.3%	45	21.5%
	10 – 15 Jahre	6	15.0%	10	14.5%	10	14.7%	5	21.7%	3	33.3%	34	16.3%
	> 15 Jahre	11	27.5%	16	23.2%	15	22.1%	11	47.8%	2	22.2%	55	26.3%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	21	52.5%	45	65.2%	38	55.9%	10	43.5%	4	44.4%	118	56.5%
	mittel	6	15.0%	7	10.1%	6	8.8%	5	21.7%			24	11.5%
	schlecht/sehr schlecht	12	30.0%	16	23.2%	23	33.8%	8	34.8%	3	33.3%	62	29.7%
	Keine Angabe	1	2.5%	1	1.4%	1	1.5%			2	22.2%	5	2.4%



## 2.8 FRAGE 4: SICHERHEITSBEDÜRFNIS NACH KEY VARIABLEN II

1 = sehr sicherheitsbedacht - 5 = sehr risikofreudig		4. Einschätzung des Sicherheitsbedürfnisses										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total		40	100%	69	100%	68	100%	23	100%	9	100%	209	100%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	7	17.5%	9	13.0%	15	22.1%	9	39.1%	1	11.1%	41	19.6%
	nein	32	80.0%	56	81.2%	48	70.6%	13	56.5%	6	66.7%	155	74.2%
	Keine Angabe	1	2.5%	4	5.8%	5	7.4%	1	4.3%	2	22.2%	13	6.2%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	2	5.0%			2	2.9%					4	1.9%
	Injizierbare	29	72.5%	49	71.0%	45	66.2%	18	78.3%	7	77.8%	148	70.8%
	Gilenya	3	7.5%	14	20.3%	3	4.4%	2	8.7%			22	10.5%
	Tecfidera	2	5.0%	2	2.9%	9	13.2%	1	4.3%			14	6.7%
	Tysabri	1	2.5%	2	2.9%	5	7.4%	1	4.3%	1	11.1%	10	4.8%
	Andere	1	2.5%	1	1.4%	1	1.5%			1	11.1%	4	1.9%
	Keine Angabe	2	5.0%	1	1.4%	3	4.4%	1	4.3%			7	3.3%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	28	70.0%	53	76.8%	51	75.0%	12	52.2%	6	66.7%	150	71.8%
	ja	12	30.0%	16	23.2%	17	25.0%	11	47.8%	3	33.3%	59	28.2%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	4	10.0%	1	1.4%	3	4.4%					8	3.8%
	Injizierbare	10	25.0%	12	17.4%	11	16.2%	2	8.7%	4	44.4%	39	18.7%
	Gilenya	10	25.0%	29	42.0%	16	23.5%	8	34.8%	1	11.1%	64	30.6%
	Tecfidera	4	10.0%	6	8.7%	8	11.8%	1	4.3%			19	9.1%
	Tysabri	6	15.0%	16	23.2%	22	32.4%	10	43.5%	3	33.3%	57	27.3%
	Andere			1	1.4%	2	2.9%					3	1.4%
	keine Therapie	6	15.0%	3	4.3%	6	8.8%	2	8.7%			17	8.1%
	Keine Angabe			1	1.4%					1	11.1%	2	1.0%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	37	92.5%	65	94.2%	66	97.1%	22	95.7%	7	77.8%	197	94.3%
	ja	3	7.5%	4	5.8%	2	2.9%	1	4.3%	2	22.2%	12	5.7%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	12	30.0%	19	27.5%	20	29.4%	2	8.7%	5	55.6%	58	27.8%
	Zweite MS Therapie	16	40.0%	26	37.7%	27	39.7%	12	52.2%	2	22.2%	83	39.7%
	Dritte oder mehr	6	15.0%	20	29.0%	15	22.1%	5	21.7%	2	22.2%	48	23.0%
	Keine Angabe	6	15.0%	4	5.8%	6	8.8%	4	17.4%			20	9.6%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	23	57.5%	44	63.8%	42	61.8%	10	43.5%	8	88.9%	127	60.8%
	nein	12	30.0%	15	21.7%	17	25.0%	9	39.1%	1	11.1%	54	25.8%
	Keine Angabe	5	12.5%	10	14.5%	9	13.2%	4	17.4%			28	13.4%

## 2.9 FRAGE 5: FORM DER MS NACH KEY VARIABLEN I

		Form der MS:								Total	
		CIS		RRMS		SPMS		Keine Angabe		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total		5	100.0%	190	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	212	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	3	60.0%	144	75.8%	7	46.7%	1	50.0%	155	73.1%
	Männlich	2	40.0%	45	23.7%	8	53.3%			55	25.9%
	Keine Angabe			1	0.5%			1	50.0%	2	0.9%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	2	40.0%	31	16.3%					33	15.6%
	31 – 40 Jahre	1	20.0%	54	28.4%	1	6.7%			56	26.4%
	41 – 45 Jahre			34	17.9%	2	13.3%	1	50.0%	37	17.5%
	über 45 Jahre	2	40.0%	70	36.8%	12	80.0%			84	39.6%
	Keine Angabe			1	0.5%			1	50.0%	2	0.9%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre			16	8.4%			1	50.0%	17	8.0%
	Berufslehre/ - schule	2	40.0%	87	45.8%	9	60.0%			98	46.2%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	2	40.0%	53	27.9%	5	33.3%			60	28.3%
	Universität / Fachhochschule	1	20.0%	32	16.8%	1	6.7%			34	16.0%
	Keine Angabe			2	1.1%			1	50.0%	3	1.4%
5. Welche Form der MS haben Sie?	CIS (klinisch isoliertes Syndrom)	5	100.0%							5	2.4%
	RRMS (schubförmig remittierende MS)			190	100.0%					190	89.6%
	SPMS (sekundäre progrediente MS)					15	100.0%			15	7.1%
	Keine Angabe							2	100.0%	2	0.9%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	4	80.0%	14	7.4%					18	8.5%
	1 – 3 Jahre			28	14.7%	1	6.7%			29	13.7%
	3 – 5 Jahre	1	20.0%	27	14.2%					28	13.2%
	5 – 10 Jahre			45	23.7%					45	21.2%
	10 – 15 Jahre			32	16.8%	2	13.3%	1	50.0%	35	16.5%
	> 15 Jahre			44	23.2%	12	80.0%			56	26.4%
	Keine Angabe							1	50.0%	1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	3	60.0%	108	56.8%	7	46.7%			118	55.7%
	mittel			21	11.1%	4	26.7%	1	50.0%	26	12.3%
	schlecht/sehr schlecht	2	40.0%	56	29.5%	4	26.7%	1	50.0%	63	29.7%
	Keine Angabe			5	2.6%					5	2.4%

## 2.10 FRAGE 5: FORM DER MS NACH KEY VARIABLEN II

		Form der MS:								Total	
		CIS		RRMS		SPMS		Keine Angabe		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total		5	100.0%	190	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	212	100.0%
Zweitmeinung bei	ja			37	19.5%	4	26.7%			41	19.3%
Diagnose:	nein	5	100.0%	142	74.7%	9	60.0%	2	100.0%	158	74.5%
	Keine Angabe			11	5.8%	2	13.3%			13	6.1%
Therapieentscheid bei	Aubagio			3	1.6%	1	6.7%			4	1.9%
Erstdiagnose:	Injizierbare	5	100.0%	134	70.5%	11	73.3%	1	50.0%	151	71.2%
	Gilenya			21	11.1%			1	50.0%	22	10.4%
	Tecfidera			14	7.4%					14	6.6%
	Tysabri			10	5.3%					10	4.7%
	Andere			3	1.6%	1	6.7%			4	1.9%
	Keine Angabe			5	2.6%	2	13.3%			7	3.3%
Rebif bei	nein	2	40.0%	137	72.1%	11	73.3%	2	100.0%	152	71.7%
Erstdiagnose:	ja	3	60.0%	53	27.9%	4	26.7%			60	28.3%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio			7	3.7%	1	6.7%			8	3.8%
	Injizierbare	4	80.0%	33	17.4%	2	13.3%			39	18.4%
	Gilenya			62	32.6%	1	6.7%	1	50.0%	64	30.2%
	Tecfidera			19	10.0%			1	50.0%	20	9.4%
	Tysabri			54	28.4%	3	20.0%			57	26.9%
	Andere			2	1.1%	1	6.7%			3	1.4%
	keine Therapie	1	20.0%	12	6.3%	6	40.0%			19	9.0%
	Keine Angabe			1	0.5%	1	6.7%			2	0.9%
Rebif ist aktuelle	nein	3	60.0%	181	95.3%	14	93.3%	2	100.0%	200	94.3%
Behandlung:	ja	2	40.0%	9	4.7%	1	6.7%			12	5.7%
Anzahl MS Langzeit-	Erste MS Therapie	4	80.0%	50	26.3%	4	26.7%			58	27.4%
Therapien:	Zweite MS Therapie			79	41.6%	4	26.7%	1	50.0%	84	39.6%
	Dritte oder mehr			46	24.2%	1	6.7%	1	50.0%	48	22.6%
	Keine Angabe	1	20.0%	15	7.9%	6	40.0%			22	10.4%
Rückblickend gleiche	ja	4	80.0%	113	59.5%	9	60.0%	2	100.0%	128	60.4%
Therapie:	nein			53	27.9%	3	20.0%			56	26.4%
	Keine Angabe	1	20.0%	24	12.6%	3	20.0%			28	13.2%

**2.11 FRAGE 6: DAUER SEIT DER DIAGNOSE NACH KEY VARIABLEN I**

		Dauer seit der Diagnose:												Total	
		< 12 Monate		1 – 3 Jahre		3 – 5 Jahre		5 – 10 Jahre		10 – 15 Jahre		> 15 Jahre		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total		18	100.0%	29	100.0%	28	100.0%	45	100.0%	35	100.0%	56	100.0%	211	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	12	66.7%	24	82.8%	19	67.9%	32	71.1%	23	65.7%	45	80.4%	155	73.5%
	Männlich	6	33.3%	5	17.2%	9	32.1%	12	26.7%	12	34.3%	11	19.6%	55	26.1%
	Keine Angabe							1	2.2%					1	0.5%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	7	38.9%	13	44.8%	7	25.0%	6	13.3%					33	15.6%
	31 – 40 Jahre	6	33.3%	11	37.9%	9	32.1%	13	28.9%	10	28.6%	7	12.5%	56	26.5%
	41 – 45 Jahre	2	11.1%	1	3.4%	4	14.3%	11	24.4%	10	28.6%	9	16.1%	37	17.5%
	über 45 Jahre	3	16.7%	4	13.8%	8	28.6%	14	31.1%	15	42.9%	40	71.4%	84	39.8%
	Keine Angabe							1	2.2%					1	0.5%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre			2	6.9%	1	3.6%	5	11.1%	5	14.3%	4	7.1%	17	8.1%
	Berufslehre/ - schule	5	27.8%	13	44.8%	15	53.6%	18	40.0%	16	45.7%	31	55.4%	98	46.4%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	5	27.8%	8	27.6%	5	17.9%	13	28.9%	11	31.4%	18	32.1%	60	28.4%
	Universität / Fachhochschule	8	44.4%	5	17.2%	7	25.0%	8	17.8%	3	8.6%	3	5.4%	34	16.1%
	Keine Angabe			1	3.4%			1	2.2%					2	0.9%
Form der MS:	CIS	4	22.2%			1	3.6%							5	2.4%
	RRMS	14	77.8%	28	96.6%	27	96.4%	45	100.0%	32	91.4%	44	78.6%	190	90.0%
	SPMS			1	3.4%					2	5.7%	12	21.4%	15	7.1%
	Keine Angabe									1	2.9%			1	0.5%
6. Wie lange liegt ihre Diagnose zurück?	<= 6 Monate	8	44.4%											8	3.8%
	> 6 – 12 Monate	10	55.6%											10	4.7%
	> 1 – 3 Jahre			29	100.0%									29	13.7%
	> 3 – 5 Jahre					28	100.0%							28	13.3%
	> 5 – 10 Jahre							45	100.0%					45	21.3%
	> 10 – 15 Jahre									35	100.0%			35	16.6%
	> 15 Jahre											56	100.0%	56	26.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	11	61.1%	24	82.8%	20	71.4%	26	57.8%	13	37.1%	24	42.9%	118	55.9%
	mittel	1	5.6%	3	10.3%	1	3.6%	3	6.7%	8	22.9%	10	17.9%	26	12.3%
	schlecht/sehr schlecht	6	33.3%	2	6.9%	7	25.0%	14	31.1%	12	34.3%	21	37.5%	62	29.4%
	Keine Angabe							2	4.4%	2	5.7%	1	1.8%	5	2.4%

**2.12 FRAGE 6: DAUER SEIT DER DIAGNOSE NACH KEY VARIABLEN II**

			Dauer seit der Diagnose:										Total	
			< 12 Monate		1 – 3 Jahre		3 – 5 Jahre		5 – 10 Jahre		10 – 15 Jahre		> 15 Jahre	
			N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%
Total			18	100.0%	29	100.0%	28	100.0%	45	100.0%	35	100.0%	56	100.0%
Zweitmeinung bei	ja		3	16.7%	5	17.2%	4	14.3%	9	20.0%	4	11.4%	16	28.6%
Diagnose:	nein		12	66.7%	23	79.3%	22	78.6%	36	80.0%	29	82.9%	35	62.5%
	Keine Angabe		3	16.7%	1	3.4%	2	7.1%			2	5.7%	5	8.9%
Therapieentscheid bei	Aubagio				3	10.3%	1	3.6%						4
Erstdiagnose:	Injizierbare		7	38.9%	8	27.6%	15	53.6%	40	88.9%	31	88.6%	49	87.5%
	Gilenya		1	5.6%	9	31.0%	8	28.6%	3	6.7%	1	2.9%		22
	Tecfidera		3	16.7%	8	27.6%	1	3.6%	1	2.2%	1	2.9%		14
	Tysabri		2	11.1%	1	3.4%	3	10.7%	1	2.2%	1	2.9%	2	3.6%
	Andere		3	16.7%									1	1.8%
	Keine Angabe		2	11.1%							1	2.9%	4	7.1%
Rebif bei	nein		16	88.9%	27	93.1%	22	78.6%	28	62.2%	22	62.9%	36	64.3%
Erstdiagnose:	ja		2	11.1%	2	6.9%	6	21.4%	17	37.8%	13	37.1%	20	35.7%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio				3	10.3%	1	3.6%	3	6.7%			1	1.8%
	Injizierbare		5	27.8%	6	20.7%	4	14.3%	6	13.3%	4	11.4%	14	25.0%
	Gilenya		2	11.1%	10	34.5%	14	50.0%	19	42.2%	10	28.6%	9	16.1%
	Tecfidera		2	11.1%	5	17.2%			1	2.2%	4	11.4%	7	12.5%
	Tysabri		3	16.7%	5	17.2%	8	28.6%	14	31.1%	13	37.1%	14	25.0%
	Andere										1	2.9%	2	3.6%
	keine Therapie		6	33.3%			1	3.6%	2	4.4%	2	5.7%	8	14.3%
	Keine Angabe										1	2.9%	1	1.8%
Rebif ist aktuelle	nein		17	94.4%	29	100.0%	25	89.3%	44	97.8%	35	100.0%	49	87.5%
Behandlung:	ja		1	5.6%			3	10.7%	1	2.2%			7	12.5%
Anzahl MS Langzeit-	Erste MS Therapie		10	55.6%	18	62.1%	10	35.7%	9	20.0%	3	8.6%	8	14.3%
Therapien:	Zweite MS Therapie		1	5.6%	9	31.0%	13	46.4%	20	44.4%	14	40.0%	26	46.4%
	Dritte oder mehr		1	5.6%	2	6.9%	4	14.3%	13	28.9%	16	45.7%	12	21.4%
	Keine Angabe		6	33.3%			1	3.6%	3	6.7%	2	5.7%	10	17.9%
Rückblickend gleiche	ja		12	66.7%	18	62.1%	17	60.7%	23	51.1%	23	65.7%	34	60.7%
Therapie:	nein		3	16.7%	8	27.6%	9	32.1%	14	31.1%	10	28.6%	12	21.4%
	Keine Angabe		3	16.7%	3	10.3%	2	7.1%	8	17.8%	2	5.7%	10	17.9%

## 2.13 FRAGE 7: ORT DER AKTUELLEN BEHANDLUNG NACH KEY VARIABLEN I

		7. Wo befinden Sie sich aktuell in neurologischer Behandlung?						Total	
		In einer privaten Praxis (auch Gruppenpraxis)		In einem Spital		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%		
Total		125	59.0%	85	40.1%	2	0.9%	212	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	91	58.7%	63	40.6%	1	0.6%	155	73.1%
	Männlich	32	58.2%	22	40.0%	1	1.8%	55	25.9%
	Keine Angabe	2	100.0%					2	0.9%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	10	30.3%	23	69.7%			33	15.6%
	31 – 40 Jahre	35	62.5%	21	37.5%			56	26.4%
	41 – 45 Jahre	26	70.3%	11	29.7%			37	17.5%
	über 45 Jahre	52	61.9%	30	35.7%	2	2.4%	84	39.6%
	Keine Angabe	2	100.0%					2	0.9%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	4	23.5%	13	76.5%			17	8.0%
	Berufslehre/ - schule	60	61.2%	36	36.7%	2	2.0%	98	46.2%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	35	58.3%	25	41.7%			60	28.3%
	Universität / Fachhochschule	24	70.6%	10	29.4%			34	16.0%
	Keine Angabe	2	66.7%	1	33.3%			3	1.4%
Form der MS:	CIS	3	60.0%	2	40.0%			5	2.4%
	RRMS	112	58.9%	77	40.5%	1	0.5%	190	89.6%
	SPMS	9	60.0%	5	33.3%	1	6.7%	15	7.1%
	Keine Angabe	1	50.0%	1	50.0%			2	0.9%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	8	44.4%	10	55.6%			18	8.5%
	1 – 3 Jahre	12	41.4%	17	58.6%			29	13.7%
	3 – 5 Jahre	15	53.6%	13	46.4%			28	13.2%
	5 – 10 Jahre	31	68.9%	14	31.1%			45	21.2%
	10 – 15 Jahre	17	48.6%	17	48.6%	1	2.9%	35	16.5%
	> 15 Jahre	41	73.2%	14	25.0%	1	1.8%	56	26.4%
	Keine Angabe	1	100.0%					1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	65	55.1%	53	44.9%			118	55.7%
	mittel	17	65.4%	8	30.8%	1	3.8%	26	12.3%
	schlecht/sehr schlecht	40	63.5%	22	34.9%	1	1.6%	63	29.7%
	Keine Angabe	3	60.0%	2	40.0%			5	2.4%

## 2.14 FRAGE 7: ORT DER AKTUELLEN BEHANDLUNG NACH KEY VARIABLEN II

		7. Wo befinden Sie sich aktuell in neurologischer Behandlung?						Total	
		In einer privaten Praxis (auch Gruppenpraxis)		In einem Spital		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%		
Total		125	59.0%	85	40.1%	2	0.9%	212	100.0%
Zweitmeinung bei	ja	29	70.7%	12	29.3%			41	19.3%
Diagnose:	nein	86	54.4%	70	44.3%	2	1.3%	158	74.5%
	Keine Angabe	10	76.9%	3	23.1%			13	6.1%
Therapieentscheid bei	Aubagio	1	25.0%	3	75.0%			4	1.9%
Erstdiagnose:	Injizierbare	93	61.6%	56	37.1%	2	1.3%	151	71.2%
	Gilenya	13	59.1%	9	40.9%			22	10.4%
	Tecfidera	4	28.6%	10	71.4%			14	6.6%
	Tysabri	8	80.0%	2	20.0%			10	4.7%
	Andere	2	50.0%	2	50.0%			4	1.9%
	Keine Angabe	4	57.1%	3	42.9%			7	3.3%
Rebif bei	nein	82	53.9%	68	44.7%	2	1.3%	152	71.7%
Erstdiagnose:	ja	43	71.7%	17	28.3%			60	28.3%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	3	37.5%	5	62.5%			8	3.8%
	Injizierbare	25	64.1%	14	35.9%			39	18.4%
	Gilenya	37	57.8%	27	42.2%			64	30.2%
	Tecfidera	10	50.0%	10	50.0%			20	9.4%
	Tysabri	37	64.9%	20	35.1%			57	26.9%
	Andere	1	33.3%	2	66.7%			3	1.4%
	keine Therapie	11	57.9%	7	36.8%	1	5.3%	19	9.0%
	Keine Angabe	1	50.0%			1	50.0%	2	0.9%
Rebif ist aktuelle	nein	117	58.5%	81	40.5%	2	1.0%	200	94.3%
Behandlung:	ja	8	66.7%	4	33.3%			12	5.7%
Anzahl MS Langzeit-	Erste MS Therapie	31	53.4%	27	46.6%			58	27.4%
Therapien:	Zweite MS Therapie	52	61.9%	32	38.1%			84	39.6%
	Dritte oder mehr	28	58.3%	19	39.6%	1	2.1%	48	22.6%
	Keine Angabe	14	63.6%	7	31.8%	1	4.5%	22	10.4%
Rückblickend gleiche	ja	75	58.6%	52	40.6%	1	0.8%	128	60.4%
Therapie:	nein	32	57.1%	23	41.1%	1	1.8%	56	26.4%
	Keine Angabe	18	64.3%	10	35.7%			28	13.2%

## 2.15 FRAGE 8: WELCHEN STELLENWERT HABEN FOLGENDE PUNKTE FÜR SIE IM RAHMEN DER KRANKHEIT?

1 = niedriger Stellenwert - 5 = sehr hoher Stellenwert

	Auswertbare Fragebogen							
	ja							
	Valid N	Mean	Standard Deviation	Median	Minimum	Percentile 25	Percentile 75	Maximum
Schubfreiheit	202	4.8	0.6	5.0	1.0	5.0	5.0	5.0
Verzögerung der Behinderungszunahme	199	4.8	0.6	5.0	1.0	5.0	5.0	5.0
Kinder/Familienplanung	180	3.0	1.8	3.0	1.0	1.0	5.0	5.0
Arbeit	191	4.1	1.1	4.0	1.0	3.0	5.0	5.0
Partnerschaft	194	4.4	1.0	5.0	1.0	4.0	5.0	5.0
Unabhängigkeit	201	4.8	0.6	5.0	1.0	5.0	5.0	5.0
Soziales Umfeld/Beziehungen	201	4.5	0.8	5.0	1.0	4.0	5.0	5.0



2.16 FRAGE 9: WELCHE MS-LANGZEITTHERAPEUTIKA KENNEN SIE?

		Aktuelle Behandlung:														Total	
		Aubagio		Injizierbare		Gilenya		Tecfidera		Tysabri		Andere		keine Therapie		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total		8	100%	39	100%	64	100%	20	100%	57	100%	3	100%	19	100%	210	100%
Welche MS- Langzeittherapeutika kennen Sie?	Aubagio	8	100%	7	17.9%	10	15.6%	3	15.0%	3	5.3%			6	31.6%	37	17.6%
	Avonex	1	12.5%	24	61.5%	22	34.4%	4	20.0%	18	31.6%	2	66.7%	8	42.1%	79	37.6%
	Betaferon	2	25.0%	17	43.6%	35	54.7%	7	35.0%	30	52.6%	3	100%	9	47.4%	103	49.0%
	Copaxone	1	12.5%	19	48.7%	27	42.2%	5	25.0%	19	33.3%	1	33.3%	8	42.1%	80	38.1%
	Gilenya	3	37.5%	15	38.5%	63	98.4%	6	30.0%	29	50.9%	2	66.7%	11	57.9%	129	61.4%
	Lemtrada			2	5.1%	5	7.8%			6	10.5%	1	33.3%	6	31.6%	20	9.5%
	Plegridy			6	15.4%	3	4.7%			1	1.8%			6	31.6%	16	7.6%
	Rebif	6	75.0%	23	59.0%	30	46.9%	9	45.0%	22	38.6%	2	66.7%	13	68.4%	105	50.0%
	Tecfidera	1	12.5%	10	25.6%	19	29.7%	18	90.0%	10	17.5%			10	52.6%	68	32.4%
	Tysabri			13	33.3%	31	48.4%	2	10.0%	57	100%	3	100%	12	63.2%	118	56.2%
	Andere			1	2.6%	1	1.6%			1	1.8%	1	33.3%	3	15.8%	7	3.3%

**2.17 FRAGE 10: AKTUELLE BEHANDLUNG NACH KEY VARIABLEN I**

		Aktuelle Behandlung:												Total	
		Aubagio		Injizierbare		Gilenya		Tecfidera		Tysabri		Andere		keine Therapie	
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%
Total		8	100%	39	100%	64	100%	20	100%	57	100%	3	100%	19	100%
Geschlecht:	Weiblich	5	62.5%	32	82.1%	42	65.6%	15	75.0%	44	77.2%	2	66.7%	15	78.9%
	Männlich	3	37.5%	7	17.9%	22	34.4%	4	20.0%	12	21.1%	1	33.3%	4	21.1%
	Keine Angabe							1	5.0%	1	1.8%			2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre			5	12.8%	13	20.3%	5	25.0%	8	14.0%			2	10.5%
	31 – 40 Jahre	1	12.5%	7	17.9%	14	21.9%	5	25.0%	22	38.6%	1	33.3%	6	31.6%
	41 – 45 Jahre	3	37.5%	2	5.1%	16	25.0%	2	10.0%	11	19.3%	1	33.3%	2	10.5%
	über 45 Jahre	4	50.0%	25	64.1%	21	32.8%	7	35.0%	15	26.3%	1	33.3%	9	47.4%
	Keine Angabe							1	5.0%	1	1.8%			2	1.0%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	2	25.0%	1	2.6%	6	9.4%	3	15.0%	5	8.8%				17
	Berufslehre/ - schule	3	37.5%	16	41.0%	30	46.9%	6	30.0%	28	49.1%	2	66.7%	12	63.2%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	2	25.0%	15	38.5%	20	31.3%	5	25.0%	13	22.8%	1	33.3%	3	15.8%
	Universität / Fachhochschule	1	12.5%	7	17.9%	8	12.5%	4	20.0%	10	17.5%			4	21.1%
	Keine Angabe							2	10.0%	1	1.8%			3	1.4%
Form der MS:	CIS			4	10.3%									1	5.3%
	RRMS	7	87.5%	33	84.6%	62	96.9%	19	95.0%	54	94.7%	2	66.7%	12	63.2%
	SPMS	1	12.5%	2	5.1%	1	1.6%			3	5.3%	1	33.3%	6	31.6%
	Keine Angabe					1	1.6%	1	5.0%					2	1.0%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate			5	12.8%	2	3.1%	2	10.0%	3	5.3%			6	31.6%
	1 – 3 Jahre	3	37.5%	6	15.4%	10	15.6%	5	25.0%	5	8.8%				29
	3 – 5 Jahre	1	12.5%	4	10.3%	14	21.9%			8	14.0%			1	5.3%
	5 – 10 Jahre	3	37.5%	6	15.4%	19	29.7%	1	5.0%	14	24.6%			2	10.5%
	10 – 15 Jahre			4	10.3%	10	15.6%	4	20.0%	13	22.8%	1	33.3%	2	10.5%
	> 15 Jahre	1	12.5%	14	35.9%	9	14.1%	7	35.0%	14	24.6%	2	66.7%	8	42.1%
	Keine Angabe							1	5.0%					1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	7	87.5%	21	53.8%	41	64.1%	13	65.0%	30	52.6%	1	33.3%	5	26.3%
	mittel	1	12.5%	5	12.8%	8	12.5%	2	10.0%	4	7.0%			6	31.6%
	schlecht/sehr schlecht			12	30.8%	14	21.9%	4	20.0%	21	36.8%	2	66.7%	8	42.1%
	Keine Angabe			1	2.6%	1	1.6%	1	5.0%	2	3.5%			5	2.4%

**2.18 FRAGE 10: AKTUELLE BEHANDLUNG NACH KEY VARIABLEN II**

		Aktuelle Behandlung:												Total	
		Aubagio		Injizierbare		Gilenya		Tecfidera		Tysabri		Andere		keine Therapie	
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%
Total		8	100%	39	100%	64	100%	20	100%	57	100%	3	100%	19	100%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja			10	25.6%	9	14.1%	6	30.0%	9	15.8%			6	31.6%
	nein	7	87.5%	27	69.2%	51	79.7%	14	70.0%	45	78.9%	2	66.7%	11	57.9%
	Keine Angabe	1	12.5%	2	5.1%	4	6.3%			3	5.3%	1	33.3%	2	10.5%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	4	50.0%												
	Injizierbare	3	37.5%	37	94.9%	41	64.1%	15	75.0%	39	68.4%	2	66.7%	13	68.4%
	Gilenya			1	2.6%	18	28.1%			2	3.5%			1	5.3%
	Tecfidera					4	6.3%	5	25.0%	4	7.0%			1	5.3%
	Tysabri									10	17.5%				
	Andere					1	1.6%							2	10.5%
Rebif bei Erstdiagnose:	Keine Angabe	1	12.5%	1	2.6%					2	3.5%	1	33.3%	2	10.5%
	nein	5	62.5%	27	69.2%	47	73.4%	14	70.0%	44	77.2%	2	66.7%	11	57.9%
	ja	3	37.5%	12	30.8%	17	26.6%	6	30.0%	13	22.8%	1	33.3%	8	42.1%
10. Mit welcher MS-Langzeittherapie werden Sie aktuell behandelt?		8	100%												
	Aubagio														
	Avonex			9	23.1%										
	Betaferon			3	7.7%										
	Copaxone			11	28.2%										
	Gilenya					64	100%								
	Plegridy			4	10.3%										
	Rebif			12	30.8%										
	Tecfidera							20	100%						
	Tysabri									57	100%				
	Andere											3	100%		
Rebif ist aktuelle Behandlung:	Ich wende gerade keine Therapie an													19	100%
	nein	8	100%	27	69.2%	64	100%	20	100%	57	100%	3	100%	19	100%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	ja			12	30.8%										
	Erste MS Therapie	4	50.0%	26	66.7%	15	23.4%	5	25.0%	6	10.5%	1	33.3%		
	Zweite MS Therapie	2	25.0%	9	23.1%	30	46.9%	11	55.0%	32	56.1%				
	Dritte oder mehr	2	25.0%	4	10.3%	18	28.1%	4	20.0%	17	29.8%	2	66.7%		
Rückblickend gleiche Therapie:	Keine Angabe			1	1.6%					2	3.5%			19	100%
	ja	5	62.5%	34	87.2%	35	54.7%	15	75.0%	30	52.6%	1	33.3%	6	31.6%
	nein			2	5.1%	21	32.8%	5	25.0%	18	31.6%	1	33.3%	9	47.4%
	Keine Angabe	3	37.5%	3	7.7%	8	12.5%			9	15.8%	1	33.3%	4	21.1%

**2.19 FRAGE 11: DAUER DER AKTUELLEN BEHANDLUNG NACH KEY VARIABLEN I**

		11. Wie lange werden Sie mit Ihrer aktuellen Therapie bereits behandelt?														Total	
		<= 6 Monate		> 6 - 12 Monate		> 1 - 3 Jahre		> 3 - 5 Jahre		> 5 - 10 Jahre		> 10 - 15 Jahre		> 15 Jahre		Keine Angabe	
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%
Total		19	100%	25	100%	51	100%	48	100%	31	100%	9	100%	7	100%	1	100%
Geschlecht:	Weiblich	15	78.9%	18	72.0%	35	68.6%	35	72.9%	21	67.7%	9	100%	6	85.7%	1	100%
	Männlich	4	21.1%	7	28.0%	15	29.4%	13	27.1%	9	29.0%			1	14.3%		
	Keine Angabe					1	2.0%			1	3.2%						
																2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	10	52.6%	3	12.0%	13	25.5%	3	6.3%	2	6.5%						
	31 - 40 Jahre	6	31.6%	6	24.0%	13	25.5%	12	25.0%	13	41.9%						
	41 - 45 Jahre	1	5.3%	7	28.0%	10	19.6%	10	20.8%	4	12.9%	2	22.2%			1	100%
	über 45 Jahre	2	10.5%	9	36.0%	14	27.5%	23	47.9%	11	35.5%	7	77.8%	7	100%		
	Keine Angabe					1	2.0%			1	3.2%						
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre			3	12.0%	5	9.8%	5	10.4%	3	9.7%	1	11.1%				
	Berufslehre/ - schule	10	52.6%	10	40.0%	23	45.1%	20	41.7%	14	45.2%	3	33.3%	5	71.4%		
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	1	5.3%	7	28.0%	15	29.4%	18	37.5%	10	32.3%	4	44.4%	1	14.3%		
	Universität / Fachhochschule	7	36.8%	5	20.0%	7	13.7%	5	10.4%	3	9.7%	1	11.1%	1	14.3%	1	100%
	Keine Angabe	1	5.3%			1	2.0%			1	3.2%						
Form der MS:	CIS	2	10.5%	1	4.0%			1	2.1%								
	RRMS	17	89.5%	24	96.0%	48	94.1%	45	93.8%	28	90.3%	8	88.9%	6	85.7%	1	100%
	SPMS					2	3.9%	2	4.2%	3	9.7%			1	14.3%		
	Keine Angabe					1	2.0%					1	11.1%				
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	6	31.6%	5	20.0%			1	2.1%								
	1 - 3 Jahre	6	31.6%	3	12.0%	20	39.2%										
	3 - 5 Jahre	1	5.3%	2	8.0%	11	21.6%	13	27.1%								
	5 - 10 Jahre	2	10.5%	6	24.0%	7	13.7%	10	20.8%	17	54.8%					1	100%
	10 - 15 Jahre	2	10.5%	5	20.0%	5	9.8%	11	22.9%	5	16.1%	4	44.4%				
	> 15 Jahre	2	10.5%	4	16.0%	7	13.7%	13	27.1%	9	29.0%	5	55.6%	7	100%		
	Keine Angabe					1	2.0%										
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	12	63.2%	15	60.0%	35	68.6%	29	60.4%	15	48.4%	2	22.2%	5	71.4%		
	mittel	3	15.8%	2	8.0%	7	13.7%	4	8.3%			2	22.2%	2	28.6%		
	schlecht/sehr schlecht	4	21.1%	8	32.0%	8	15.7%	14	29.2%	15	48.4%	4	44.4%				
	Keine Angabe					1	2.0%	1	2.1%	1	3.2%	1	11.1%			1	100%

## 2.20 FRAGE 11: DAUER DER AKTUELLEN BEHANDLUNG NACH KEY VARIABLEN II

		11. Wie lange werden Sie mit Ihrer aktuellen Therapie bereits behandelt?														Total			
		<= 6 Monate		> 6 – 12 Monate		> 1 – 3 Jahre		> 3 – 5 Jahre		> 5 – 10 Jahre		> 10 – 15 Jahre		> 15 Jahre		Keine Angabe		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total		19	100%	25	100%	51	100%	48	100%	31	100%	9	100%	7	100%	1	100%	191	100%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	4	21.1%	4	16.0%	7	13.7%	7	14.6%	6	19.4%	3	33.3%	3	42.9%			34	17.8%
	nein	13	68.4%	21	84.0%	42	82.4%	36	75.0%	25	80.6%	5	55.6%	3	42.9%	1	100%	146	76.4%
	Keine Angabe	2	10.5%			2	3.9%	5	10.4%			1	11.1%	1	14.3%			11	5.8%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio					3	5.9%	1	2.1%									4	2.1%
	Injizierbare	12	63.2%	18	72.0%	30	58.8%	35	72.9%	26	83.9%	8	88.9%	7	100%	1	100%	137	71.7%
	Gilenya	1	5.3%	2	8.0%	10	19.6%	5	10.4%	2	6.5%	1	11.1%					21	11.0%
	Tecfidera	3	15.8%	5	20.0%	5	9.8%											13	6.8%
	Tysabri	2	10.5%			1	2.0%	5	10.4%	2	6.5%							10	5.2%
	Andere	1	5.3%															1	0.5%
	Keine Angabe					2	3.9%	2	4.2%	1	3.2%							5	2.6%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	15	78.9%	16	64.0%	40	78.4%	37	77.1%	22	71.0%	8	88.9%	1	14.3%			139	72.8%
	ja	4	21.1%	9	36.0%	11	21.6%	11	22.9%	9	29.0%	1	11.1%	6	85.7%	1	100%	52	27.2%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	1	5.3%			6	11.8%	1	2.1%									8	4.2%
	Injizierbare	4	21.1%	2	8.0%	8	15.7%	5	10.4%	6	19.4%	8	88.9%	6	85.7%			39	20.4%
	Gilenya	4	21.1%	9	36.0%	21	41.2%	23	47.9%	5	16.1%	1	11.1%			1	100%	64	33.5%
	Tecfidera	4	21.1%	8	32.0%	7	13.7%	1	2.1%									20	10.5%
	Tysabri	6	31.6%	5	20.0%	9	17.6%	16	33.3%	20	64.5%			1	14.3%			57	29.8%
	Andere			1	4.0%			2	4.2%									3	1.6%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	18	94.7%	25	100%	50	98.0%	46	95.8%	30	96.8%	7	77.8%	2	28.6%	1	100%	179	93.7%
	ja	1	5.3%			1	2.0%	2	4.2%	1	3.2%	2	22.2%	5	71.4%			12	6.3%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	5	26.3%	5	20.0%	20	39.2%	11	22.9%	8	25.8%	2	22.2%	6	85.7%			57	29.8%
	Zweite MS Therapie	10	52.6%	9	36.0%	23	45.1%	21	43.8%	17	54.8%	4	44.4%					84	44.0%
	Dritte oder mehr	3	15.8%	11	44.0%	8	15.7%	16	33.3%	6	19.4%	3	33.3%					47	24.6%
	Keine Angabe	1	5.3%											1	14.3%	1	100%	3	1.6%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	7	36.8%	14	56.0%	35	68.6%	30	62.5%	20	64.5%	9	100%	5	71.4%			120	62.8%
	nein	11	57.9%	8	32.0%	10	19.6%	11	22.9%	6	19.4%			1	14.3%			47	24.6%
	Keine Angabe	1	5.3%	3	12.0%	6	11.8%	7	14.6%	5	16.1%			1	14.3%	1	100%	24	12.6%

## 2.21 FRAGE 12: ANZAHL BISHERIGE MS-LANGZEITTHERAPIE NACH KEY VARIABLEN I

		Anzahl MS Langzeit-Therapien:								Total	
		Erste MS Therapie		Zweite MS Therapie		Dritte oder mehr		Keine Angabe		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total		58	100.0%	84	100.0%	48	100.0%	22	100.0%	212	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	41	70.7%	59	70.2%	38	79.2%	17	77.3%	155	73.1%
	Männlich	16	27.6%	24	28.6%	10	20.8%	5	22.7%	55	25.9%
	Keine Angabe	1	1.7%	1	1.2%					2	0.9%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	14	24.1%	12	14.3%	5	10.4%	2	9.1%	33	15.6%
	31 – 40 Jahre	13	22.4%	23	27.4%	14	29.2%	6	27.3%	56	26.4%
	41 – 45 Jahre	6	10.3%	17	20.2%	10	20.8%	4	18.2%	37	17.5%
	über 45 Jahre	24	41.4%	31	36.9%	19	39.6%	10	45.5%	84	39.6%
	Keine Angabe	1	1.7%	1	1.2%					2	0.9%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	4	6.9%	4	4.8%	9	18.8%			17	8.0%
	Berufslehre/ - schule	21	36.2%	37	44.0%	26	54.2%	14	63.6%	98	46.2%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	21	36.2%	27	32.1%	9	18.8%	3	13.6%	60	28.3%
	Universität / Fachhochschule	11	19.0%	14	16.7%	4	8.3%	5	22.7%	34	16.0%
	Keine Angabe	1	1.7%	2	2.4%					3	1.4%
Form der MS:	CIS	4	6.9%					1	4.5%	5	2.4%
	RRMS	50	86.2%	79	94.0%	46	95.8%	15	68.2%	190	89.6%
	SPMS	4	6.9%	4	4.8%	1	2.1%	6	27.3%	15	7.1%
	Keine Angabe			1	1.2%	1	2.1%			2	0.9%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	10	17.2%	1	1.2%	1	2.1%	6	27.3%	18	8.5%
	1 – 3 Jahre	18	31.0%	9	10.7%	2	4.2%			29	13.7%
	3 – 5 Jahre	10	17.2%	13	15.5%	4	8.3%	1	4.5%	28	13.2%
	5 – 10 Jahre	9	15.5%	20	23.8%	13	27.1%	3	13.6%	45	21.2%
	10 – 15 Jahre	3	5.2%	14	16.7%	16	33.3%	2	9.1%	35	16.5%
	> 15 Jahre	8	13.8%	26	31.0%	12	25.0%	10	45.5%	56	26.4%
	Keine Angabe			1	1.2%					1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	40	69.0%	48	57.1%	23	47.9%	7	31.8%	118	55.7%
	mittel	5	8.6%	11	13.1%	4	8.3%	6	27.3%	26	12.3%
	schlecht/sehr schlecht	12	20.7%	23	27.4%	20	41.7%	8	36.4%	63	29.7%
	Keine Angabe	1	1.7%	2	2.4%	1	2.1%	1	4.5%	5	2.4%

## 2.22 FRAGE 12: ANZAHL BISHERIGE MS-LANGZEITTHERAPIE NACH KEY VARIABLEN II

		Anzahl MS Langzeit-Therapien:								Total	
		Erste MS Therapie		Zweite MS Therapie		Dritte oder mehr		Keine Angabe		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total		58	100%	84	100%	48	100%	22	100%	212	100%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	11	19.0%	16	19.0%	7	14.6%	7	31.8%	41	19.3%
	nein	42	72.4%	66	78.6%	37	77.1%	13	59.1%	158	74.5%
	Keine Angabe	5	8.6%	2	2.4%	4	8.3%	2	9.1%	13	6.1%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	4	6.9%							4	1.9%
	Injizierbare	26	44.8%	68	81.0%	42	87.5%	15	68.2%	151	71.2%
	Gilenya	14	24.1%	5	6.0%	2	4.2%	1	4.5%	22	10.4%
	Tecfidera	5	8.6%	8	9.5%			1	4.5%	14	6.6%
	Tysabri	5	8.6%	2	2.4%	2	4.2%	1	4.5%	10	4.7%
	Andere	2	3.4%					2	9.1%	4	1.9%
	Keine Angabe	2	3.4%	1	1.2%	2	4.2%	2	9.1%	7	3.3%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	49	84.5%	62	73.8%	29	60.4%	12	54.5%	152	71.7%
	ja	9	15.5%	22	26.2%	19	39.6%	10	45.5%	60	28.3%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	4	6.9%	2	2.4%	2	4.2%			8	3.8%
	Injizierbare	26	44.8%	9	10.7%	4	8.3%			39	18.4%
	Gilenya	15	25.9%	30	35.7%	18	37.5%	1	4.5%	64	30.2%
	Tecfidera	5	8.6%	11	13.1%	4	8.3%			20	9.4%
	Tysabri	6	10.3%	32	38.1%	17	35.4%	2	9.1%	57	26.9%
	Andere	1	1.7%			2	4.2%			3	1.4%
	keine Therapie							19	86.4%	19	9.0%
	Keine Angabe	1	1.7%			1	2.1%			2	0.9%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	49	84.5%	82	97.6%	47	97.9%	22	100%	200	94.3%
	ja	9	15.5%	2	2.4%	1	2.1%			12	5.7%
12. Um die wievielte MS Langzeit-Therapie handelt es sich bei Ihrer aktuellen Therapie?	Erste MS Therapie	58	100%							58	27.4%
	Zweite MS Therapie			84	100%					84	39.6%
	Dritte MS Therapie					35	72.9%			35	16.5%
	Mehr als dritte MS Therapie					13	27.1%			13	6.1%
	Keine Angabe							22	100%	22	10.4%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	49	84.5%	49	58.3%	24	50.0%	6	27.3%	128	60.4%
	nein	2	3.4%	26	31.0%	18	37.5%	10	45.5%	56	26.4%
	Keine Angabe	7	12.1%	9	10.7%	6	12.5%	6	27.3%	28	13.2%

### 3.1 FRAGE 13: WO WURDE DIE DIAGNOSE GESTELLT NACH KEY VARIABLEN I

		13. Wo wurde Ihre Erst-Diagnose gestellt?						Total	
		In einer privaten Praxis (auch Gruppenpraxis)		In einem Spital		Keine Angabe		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%		
Total		72	100.0%	138	100.0%	2	100.0%	212	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	51	70.8%	102	73.9%	2	100.0%	155	73.1%
	Männlich	20	27.8%	35	25.4%			55	25.9%
	Keine Angabe	1	1.4%	1	0.7%			2	0.9%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	6	8.3%	27	19.6%			33	15.6%
	31 – 40 Jahre	21	29.2%	35	25.4%			56	26.4%
	41 – 45 Jahre	17	23.6%	19	13.8%	1	50.0%	37	17.5%
	über 45 Jahre	27	37.5%	56	40.6%	1	50.0%	84	39.6%
	Keine Angabe	1	1.4%	1	0.7%			2	0.9%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	2	2.8%	14	10.1%	1	50.0%	17	8.0%
	Berufslehre/ - schule	34	47.2%	64	46.4%			98	46.2%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	22	30.6%	38	27.5%			60	28.3%
	Universität / Fachhochschule	13	18.1%	20	14.5%	1	50.0%	34	16.0%
	Keine Angabe	1	1.4%	2	1.4%			3	1.4%
Form der MS:	CIS	2	2.8%	3	2.2%			5	2.4%
	RRMS	67	93.1%	121	87.7%	2	100.0%	190	89.6%
	SPMS	3	4.2%	12	8.7%			15	7.1%
	Keine Angabe			2	1.4%			2	0.9%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	5	6.9%	13	9.4%			18	8.5%
	1 – 3 Jahre	8	11.1%	21	15.2%			29	13.7%
	3 – 5 Jahre	8	11.1%	20	14.5%			28	13.2%
	5 – 10 Jahre	20	27.8%	24	17.4%	1	50.0%	45	21.2%
	10 – 15 Jahre	11	15.3%	24	17.4%			35	16.5%
	> 15 Jahre	20	27.8%	35	25.4%	1	50.0%	56	26.4%
	Keine Angabe			1	0.7%			1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	40	55.6%	78	56.5%			118	55.7%
	mittel	10	13.9%	16	11.6%			26	12.3%
	schlecht/sehr schlecht	21	29.2%	42	30.4%			63	29.7%
	Keine Angabe	1	1.4%	2	1.4%	2	100.0%	5	2.4%



### 3.2 FRAGE 13: WO WURDE DIE DIAGNOSE GESTELLT NACH KEY VARIABLEN II

		13. Wo wurde Ihre Erst-Diagnose gestellt?						Total	
		In einer privaten Praxis (auch Gruppenpraxis)		In einem Spital		Keine Angabe		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%		
Total		72	100.0%	138	100.0%	2	100.0%	212	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	20	27.8%	21	15.2%			41	19.3%
	nein	46	63.9%	110	79.7%	2	100.0%	158	74.5%
	Keine Angabe	6	8.3%	7	5.1%			13	6.1%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	1	1.4%	3	2.2%			4	1.9%
	Injizierbare	50	69.4%	99	71.7%	2	100.0%	151	71.2%
	Gilenya	7	9.7%	15	10.9%			22	10.4%
	Tecfidera	4	5.6%	10	7.2%			14	6.6%
	Tysabri	6	8.3%	4	2.9%			10	4.7%
	Andere			4	2.9%			4	1.9%
	Keine Angabe	4	5.6%	3	2.2%			7	3.3%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	52	72.2%	100	72.5%			152	71.7%
	ja	20	27.8%	38	27.5%	2	100.0%	60	28.3%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	4	5.6%	4	2.9%			8	3.8%
	Injizierbare	11	15.3%	28	20.3%			39	18.4%
	Gilenya	20	27.8%	43	31.2%	1	50.0%	64	30.2%
	Tecfidera	5	6.9%	14	10.1%	1	50.0%	20	9.4%
	Tysabri	24	33.3%	33	23.9%			57	26.9%
	Andere	2	2.8%	1	0.7%			3	1.4%
	keine Therapie	6	8.3%	13	9.4%			19	9.0%
	Keine Angabe			2	1.4%			2	0.9%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	69	95.8%	129	93.5%	2	100.0%	200	94.3%
	ja	3	4.2%	9	6.5%			12	5.7%
Anzahl MS Langzeit- Therapien:	Erste MS Therapie	21	29.2%	37	26.8%			58	27.4%
	Zweite MS Therapie	31	43.1%	52	37.7%	1	50.0%	84	39.6%
	Dritte oder mehr	14	19.4%	34	24.6%			48	22.6%
	Keine Angabe	6	8.3%	15	10.9%	1	50.0%	22	10.4%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	38	52.8%	90	65.2%			128	60.4%
	nein	20	27.8%	35	25.4%	1	50.0%	56	26.4%
	Keine Angabe	14	19.4%	13	9.4%	1	50.0%	28	13.2%

### 3.3 FRAGE 14: DIAGNOSESTELLUNG UND THERAPIEENTSCHEID NACH KEY VARIABLEN I

		14. Wie fanden Diagnosestellung und Therapieentscheid statt?						Total	
		In einem Gespräch		In mehreren Gesprächen (mehrere zeitlich getrennte Termine)		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%		
Total		79	37.3%	126	59.4%	7	3.3%	212	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	61	39.4%	90	58.1%	4	2.6%	155	73.1%
	Männlich	16	29.1%	36	65.5%	3	5.5%	55	25.9%
	Keine Angabe	2	100.0%					2	0.9%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	11	33.3%	22	66.7%			33	15.6%
	31 – 40 Jahre	19	33.9%	35	62.5%	2	3.6%	56	26.4%
	41 – 45 Jahre	17	45.9%	18	48.6%	2	5.4%	37	17.5%
	über 45 Jahre	30	35.7%	51	60.7%	3	3.6%	84	39.6%
	Keine Angabe	2	100.0%					2	0.9%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	8	47.1%	8	47.1%	1	5.9%	17	8.0%
	Berufslehre/ - schule	40	40.8%	54	55.1%	4	4.1%	98	46.2%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	18	30.0%	41	68.3%	1	1.7%	60	28.3%
	Universität / Fachhochschule	11	32.4%	22	64.7%	1	2.9%	34	16.0%
	Keine Angabe	2	66.7%	1	33.3%			3	1.4%
Form der MS:	CIS	2	40.0%	3	60.0%			5	2.4%
	RRMS	73	38.4%	111	58.4%	6	3.2%	190	89.6%
	SPMS	3	20.0%	11	73.3%	1	6.7%	15	7.1%
	Keine Angabe	1	50.0%	1	50.0%			2	0.9%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	8	44.4%	10	55.6%			18	8.5%
	1 – 3 Jahre	4	13.8%	25	86.2%			29	13.7%
	3 – 5 Jahre	14	50.0%	12	42.9%	2	7.1%	28	13.2%
	5 – 10 Jahre	18	40.0%	26	57.8%	1	2.2%	45	21.2%
	10 – 15 Jahre	12	34.3%	21	60.0%	2	5.7%	35	16.5%
	> 15 Jahre	22	39.3%	32	57.1%	2	3.6%	56	26.4%
	Keine Angabe	1	100.0%					1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	39	33.1%	75	63.6%	4	3.4%	118	55.7%
	mittel	7	26.9%	18	69.2%	1	3.8%	26	12.3%
	schlecht/sehr schlecht	32	50.8%	30	47.6%	1	1.6%	63	29.7%
	Keine Angabe	1	20.0%	3	60.0%	1	20.0%	5	2.4%

### 3.4 FRAGE 14: DIAGNOSESTELLUNG UND THERAPIEENTSCHEID NACH KEY VARIABLEN II

		14. Wie fanden Diagnosestellung und Therapieentscheid statt?						Total	
		In einem Gespräch		In mehreren Gesprächen (mehrere zeitlich getrennte Termine)		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%		
Total		79	37.3%	126	59.4%	7	3.3%	212	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	9	22.0%	32	78.0%			41	19.3%
	nein	66	41.8%	89	56.3%	3	1.9%	158	74.5%
	Keine Angabe	4	30.8%	5	38.5%	4	30.8%	13	6.1%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	1	25.0%	3	75.0%			4	1.9%
	Injizierbare	61	40.4%	85	56.3%	5	3.3%	151	71.2%
	Gilenya	4	18.2%	16	72.7%	2	9.1%	22	10.4%
	Tecfidera	3	21.4%	11	78.6%			14	6.6%
	Tysabri	7	70.0%	3	30.0%			10	4.7%
	Andere	1	25.0%	3	75.0%			4	1.9%
	Keine Angabe	2	28.6%	5	71.4%			7	3.3%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	53	34.9%	95	62.5%	4	2.6%	152	71.7%
	ja	26	43.3%	31	51.7%	3	5.0%	60	28.3%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	3	37.5%	5	62.5%			8	3.8%
	Injizierbare	13	33.3%	25	64.1%	1	2.6%	39	18.4%
	Gilenya	20	31.3%	39	60.9%	5	7.8%	64	30.2%
	Tecfidera	8	40.0%	12	60.0%			20	9.4%
	Tysabri	29	50.9%	28	49.1%			57	26.9%
	Andere	1	33.3%	2	66.7%			3	1.4%
	keine Therapie	4	21.1%	14	73.7%	1	5.3%	19	9.0%
	Keine Angabe	1	50.0%	1	50.0%			2	0.9%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	72	36.0%	122	61.0%	6	3.0%	200	94.3%
	ja	7	58.3%	4	33.3%	1	8.3%	12	5.7%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	23	39.7%	34	58.6%	1	1.7%	58	27.4%
	Zweite MS Therapie	34	40.5%	48	57.1%	2	2.4%	84	39.6%
	Dritte oder mehr	16	33.3%	30	62.5%	2	4.2%	48	22.6%
	Keine Angabe	6	27.3%	14	63.6%	2	9.1%	22	10.4%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	51	39.8%	74	57.8%	3	2.3%	128	60.4%
	nein	19	33.9%	36	64.3%	1	1.8%	56	26.4%
	Keine Angabe	9	32.1%	16	57.1%	3	10.7%	28	13.2%

### 3.5 FRAGE 15: GESPRÄCH MIT NEUROLOGE BEI DIAGNOSE NACH KEY VARIABLEN I

1 = sehr gut - 5 = sehr schlecht		15. Wie beurteilen Sie rückblickend das Gespräch mit Ihrem Neurologen, der Ihnen die Diagnose erklärt hat?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		75	36.2%	43	20.8%	26	12.6%	32	15.5%	31	15.0%	207	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	50	33.3%	33	22.0%	19	12.7%	21	14.0%	27	18.0%	150	72.5%
	Männlich	24	43.6%	10	18.2%	7	12.7%	10	18.2%	4	7.3%	55	26.6%
	Keine Angabe	1	50.0%					1	50.0%			2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	10	30.3%	10	30.3%	5	15.2%	4	12.1%	4	12.1%	33	15.9%
	31 – 40 Jahre	25	45.5%	10	18.2%	4	7.3%	7	12.7%	9	16.4%	55	26.6%
	41 – 45 Jahre	12	35.3%	6	17.6%	4	11.8%	4	11.8%	8	23.5%	34	16.4%
	über 45 Jahre	27	32.5%	17	20.5%	13	15.7%	16	19.3%	10	12.0%	83	40.1%
	Keine Angabe	1	50.0%					1	50.0%			2	1.0%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	5	33.3%	6	40.0%	2	13.3%	1	6.7%	1	6.7%	15	7.2%
	Berufslehre/ - schule	35	36.1%	18	18.6%	10	10.3%	18	18.6%	16	16.5%	97	46.9%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	21	35.6%	10	16.9%	9	15.3%	8	13.6%	11	18.6%	59	28.5%
	Universität / Fachhochschule	12	36.4%	9	27.3%	5	15.2%	4	12.1%	3	9.1%	33	15.9%
	Keine Angabe	2	66.7%					1	33.3%			3	1.4%
Form der MS:	CIS	2	40.0%	1	20.0%			2	40.0%			5	2.4%
	RRMS	68	36.8%	40	21.6%	21	11.4%	27	14.6%	29	15.7%	185	89.4%
	SPMS	5	33.3%	2	13.3%	4	26.7%	2	13.3%	2	13.3%	15	7.2%
	Keine Angabe					1	50.0%	1	50.0%			2	1.0%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	7	38.9%	4	22.2%	1	5.6%	3	16.7%	3	16.7%	18	8.7%
	1 – 3 Jahre	14	48.3%	10	34.5%	3	10.3%	2	6.9%			29	14.0%
	3 – 5 Jahre	12	42.9%	8	28.6%	1	3.6%	3	10.7%	4	14.3%	28	13.5%
	5 – 10 Jahre	18	41.9%	8	18.6%	3	7.0%	6	14.0%	8	18.6%	43	20.8%
	10 – 15 Jahre	11	33.3%	2	6.1%	8	24.2%	8	24.2%	4	12.1%	33	15.9%
	> 15 Jahre	13	23.6%	11	20.0%	10	18.2%	9	16.4%	12	21.8%	55	26.6%
	Keine Angabe							1	100.0%			1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	75	63.6%	43	36.4%							118	57.0%
	mittel					26	100.0%					26	12.6%
	schlecht/sehr schlecht							32	50.8%	31	49.2%	63	30.4%

### 3.6 FRAGE 15: GESPRÄCH MIT NEUROLOGE BEI DIAGNOSE NACH KEY VARIABLEN II

1 = sehr gut - 5 = sehr schlecht		15. Wie beurteilen Sie rückblickend das Gespräch mit Ihrem Neurologen, der Ihnen die Diagnose erklärt hat?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		75	36.2%	43	20.8%	26	12.6%	32	15.5%	31	15.0%	207	100.0%
Zweitmeinung bei	ja	10	25.0%	8	20.0%	7	17.5%	6	15.0%	9	22.5%	40	19.3%
Diagnose:	nein	59	38.1%	35	22.6%	18	11.6%	25	16.1%	18	11.6%	155	74.9%
	Keine Angabe	6	50.0%			1	8.3%	1	8.3%	4	33.3%	12	5.8%
Therapieentscheid bei	Aubagio	3	75.0%	1	25.0%							4	1.9%
Erstdiagnose:	Injizierbare	47	32.0%	26	17.7%	22	15.0%	29	19.7%	23	15.6%	147	71.0%
	Gilenya	11	50.0%	7	31.8%	1	4.5%	1	4.5%	2	9.1%	22	10.6%
	Tecfidera	5	35.7%	4	28.6%	3	21.4%	1	7.1%	1	7.1%	14	6.8%
	Tysabri	6	66.7%	2	22.2%					1	11.1%	9	4.3%
	Andere			2	50.0%			1	25.0%	1	25.0%	4	1.9%
	Keine Angabe	3	42.9%	1	14.3%					3	42.9%	7	3.4%
Rebif bei	nein	55	36.9%	33	22.1%	15	10.1%	25	16.8%	21	14.1%	149	72.0%
Erstdiagnose:	ja	20	34.5%	10	17.2%	11	19.0%	7	12.1%	10	17.2%	58	28.0%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	5	62.5%	2	25.0%	1	12.5%					8	3.9%
	Injizierbare	12	31.6%	9	23.7%	5	13.2%	8	21.1%	4	10.5%	38	18.4%
	Gilenya	23	36.5%	18	28.6%	8	12.7%	7	11.1%	7	11.1%	63	30.4%
	Tecfidera	10	52.6%	3	15.8%	2	10.5%	2	10.5%	2	10.5%	19	9.2%
	Tysabri	21	38.2%	9	16.4%	4	7.3%	10	18.2%	11	20.0%	55	26.6%
	Andere	1	33.3%					1	33.3%	1	33.3%	3	1.4%
	keine Therapie	3	15.8%	2	10.5%	6	31.6%	3	15.8%	5	26.3%	19	9.2%
	Keine Angabe							1	50.0%	1	50.0%	2	1.0%
Rebif ist aktuelle	nein	71	36.4%	40	20.5%	24	12.3%	32	16.4%	28	14.4%	195	94.2%
Behandlung:	ja	4	33.3%	3	25.0%	2	16.7%			3	25.0%	12	5.8%
Anzahl MS Langzeit-	Erste MS Therapie	25	43.9%	15	26.3%	5	8.8%	7	12.3%	5	8.8%	57	27.5%
Therapien:	Zweite MS Therapie	33	40.2%	15	18.3%	11	13.4%	13	15.9%	10	12.2%	82	39.6%
	Dritte oder mehr	12	25.5%	11	23.4%	4	8.5%	9	19.1%	11	23.4%	47	22.7%
	Keine Angabe	5	23.8%	2	9.5%	6	28.6%	3	14.3%	5	23.8%	21	10.1%
Rückblickend gleiche	ja	52	41.3%	28	22.2%	15	11.9%	18	14.3%	13	10.3%	126	60.9%
Therapie:	nein	13	23.6%	11	20.0%	11	20.0%	8	14.5%	12	21.8%	55	26.6%
	Keine Angabe	10	38.5%	4	15.4%			6	23.1%	6	23.1%	26	12.6%

### 3.7 FRAGE 16: INFORMATION ÜBER DIE VERSCHIEDENEN THERAPIEOPTIONEN NACH KEY VARIABLES I

1 = sehr gut - 5 = sehr schlecht		16. Information über die verschiedenen Therapieoptionen										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		70	34.5%	50	24.6%	32	15.8%	34	16.7%	17	8.4%	203	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	50	34.0%	39	26.5%	22	15.0%	22	15.0%	14	9.5%	147	72.4%
	Männlich	19	35.2%	11	20.4%	10	18.5%	11	20.4%	3	5.6%	54	26.6%
	Keine Angabe	1	50.0%					1	50.0%			2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	5	15.2%	12	36.4%	8	24.2%	5	15.2%	3	9.1%	33	16.3%
	31 – 40 Jahre	22	40.0%	12	21.8%	6	10.9%	10	18.2%	5	9.1%	55	27.1%
	41 – 45 Jahre	11	35.5%	6	19.4%	8	25.8%	2	6.5%	4	12.9%	31	15.3%
	über 45 Jahre	31	37.8%	20	24.4%	10	12.2%	16	19.5%	5	6.1%	82	40.4%
	Keine Angabe	1	50.0%					1	50.0%			2	1.0%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	7	53.8%	2	15.4%	1	7.7%	3	23.1%			13	6.4%
	Berufslehre/ - schule	28	29.5%	24	25.3%	19	20.0%	15	15.8%	9	9.5%	95	46.8%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	24	40.7%	15	25.4%	6	10.2%	8	13.6%	6	10.2%	59	29.1%
	Universität / Fachhochschule	10	30.3%	9	27.3%	6	18.2%	6	18.2%	2	6.1%	33	16.3%
	Keine Angabe	1	33.3%					2	66.7%			3	1.5%
Form der MS:	CIS	1	20.0%	2	40.0%			2	40.0%			5	2.5%
	RRMS	64	35.0%	46	25.1%	26	14.2%	30	16.4%	17	9.3%	183	90.1%
	SPMS	5	35.7%	2	14.3%	6	42.9%	1	7.1%			14	6.9%
	Keine Angabe							1	100.0%			1	0.5%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	7	38.9%	4	22.2%	2	11.1%	2	11.1%	3	16.7%	18	8.9%
	1 – 3 Jahre	12	41.4%	10	34.5%	4	13.8%	3	10.3%			29	14.3%
	3 – 5 Jahre	8	29.6%	9	33.3%	5	18.5%	2	7.4%	3	11.1%	27	13.3%
	5 – 10 Jahre	14	33.3%	11	26.2%	5	11.9%	10	23.8%	2	4.8%	42	20.7%
	10 – 15 Jahre	9	28.1%	5	15.6%	8	25.0%	7	21.9%	3	9.4%	32	15.8%
	> 15 Jahre	20	37.0%	11	20.4%	8	14.8%	9	16.7%	6	11.1%	54	26.6%
	Keine Angabe							1	100.0%			1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	60	51.3%	40	34.2%	12	10.3%	4	3.4%	1	0.9%	117	57.6%
	mittel	4	16.7%	5	20.8%	9	37.5%	5	20.8%	1	4.2%	24	11.8%
	schlecht/sehr schlecht	6	9.7%	5	8.1%	11	17.7%	25	40.3%	15	24.2%	62	30.5%

### 3.8 FRAGE 16: INFORMATION ÜBER DIE VERSCHIEDENEN THERAPIEOPTIONEN NACH KEY VARIABLEN II

1 = sehr gut - 5 = sehr schlecht		16. Information über die verschiedenen Therapieoptionen										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		70	34.5%	50	24.6%	32	15.8%	34	16.7%	17	8.4%	203	100.0%
Zweitmeinung bei	ja	12	30.0%	7	17.5%	9	22.5%	8	20.0%	4	10.0%	40	19.7%
Diagnose:	nein	53	34.9%	42	27.6%	21	13.8%	26	17.1%	10	6.6%	152	74.9%
	Keine Angabe	5	45.5%	1	9.1%	2	18.2%			3	27.3%	11	5.4%
Therapieentscheid bei	Aubagio	3	100.0%									3	1.5%
Erstdiagnose:	Injizierbare	43	29.7%	38	26.2%	22	15.2%	30	20.7%	12	8.3%	145	71.4%
	Gilenya	11	52.4%	4	19.0%	4	19.0%			2	9.5%	21	10.3%
	Tecfidera	4	28.6%	4	28.6%	3	21.4%	2	14.3%	1	7.1%	14	6.9%
	Tysabri	4	44.4%	3	33.3%			1	11.1%	1	11.1%	9	4.4%
	Andere	1	25.0%	1	25.0%			1	25.0%	1	25.0%	4	2.0%
	Keine Angabe	4	57.1%			3	42.9%					7	3.4%
Rebif bei	nein	53	36.3%	33	22.6%	24	16.4%	22	15.1%	14	9.6%	146	71.9%
Erstdiagnose:	ja	17	29.8%	17	29.8%	8	14.0%	12	21.1%	3	5.3%	57	28.1%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	5	71.4%	1	14.3%			1	14.3%			7	3.4%
	Injizierbare	12	31.6%	11	28.9%	8	21.1%	6	15.8%	1	2.6%	38	18.7%
	Gilenya	20	32.3%	18	29.0%	11	17.7%	8	12.9%	5	8.1%	62	30.5%
	Tecfidera	8	42.1%	5	26.3%			6	31.6%			19	9.4%
	Tysabri	16	29.6%	13	24.1%	7	13.0%	7	13.0%	11	20.4%	54	26.6%
	Andere	2	66.7%			1	33.3%					3	1.5%
	keine Therapie	7	38.9%	1	5.6%	5	27.8%	5	27.8%			18	8.9%
	Keine Angabe			1	50.0%			1	50.0%			2	1.0%
Rebif ist aktuelle	nein	67	35.1%	45	23.6%	30	15.7%	33	17.3%	16	8.4%	191	94.1%
Behandlung:	ja	3	25.0%	5	41.7%	2	16.7%	1	8.3%	1	8.3%	12	5.9%
Anzahl MS Langzeit-	Erste MS Therapie	24	42.9%	15	26.8%	8	14.3%	7	12.5%	2	3.6%	56	27.6%
Therapien:	Zweite MS Therapie	24	29.3%	20	24.4%	13	15.9%	16	19.5%	9	11.0%	82	40.4%
	Dritte oder mehr	13	28.9%	14	31.1%	6	13.3%	6	13.3%	6	13.3%	45	22.2%
	Keine Angabe	9	45.0%	1	5.0%	5	25.0%	5	25.0%			20	9.9%
Rückblickend gleiche	ja	50	40.7%	30	24.4%	18	14.6%	19	15.4%	6	4.9%	123	60.6%
Therapie:	nein	9	16.4%	15	27.3%	11	20.0%	13	23.6%	7	12.7%	55	27.1%
	Keine Angabe	11	44.0%	5	20.0%	3	12.0%	2	8.0%	4	16.0%	25	12.3%

### 3.9 FRAGE 17: ALLE DAMALS MÖGLICHEN THERAPIEN VORGESTELLT NACH KEY VARIABLEN I

		17. Hat Ihnen Ihr Neurologe nach Ihrer Diagnose Ihrer Meinung nach alle (damals möglichen) Therapien vorgestellt?								Total	
		Ja		Nein		Weiss ich nicht mehr		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		128	60.4%	54	25.5%	27	12.7%	3	1.4%	212	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	95	61.3%	39	25.2%	18	11.6%	3	1.9%	155	73.1%
	Männlich	32	58.2%	15	27.3%	8	14.5%			55	25.9%
	Keine Angabe	1	50.0%			1	50.0%			2	0.9%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	20	60.6%	9	27.3%	4	12.1%			33	15.6%
	31 – 40 Jahre	37	66.1%	13	23.2%	6	10.7%			56	26.4%
	41 – 45 Jahre	17	45.9%	11	29.7%	8	21.6%	1	2.7%	37	17.5%
	über 45 Jahre	53	63.1%	21	25.0%	8	9.5%	2	2.4%	84	39.6%
	Keine Angabe	1	50.0%			1	50.0%			2	0.9%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	9	52.9%	4	23.5%	4	23.5%			17	8.0%
	Berufslehre/ - schule	60	61.2%	25	25.5%	12	12.2%	1	1.0%	98	46.2%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	38	63.3%	14	23.3%	7	11.7%	1	1.7%	60	28.3%
	Universität / Fachhochschule	20	58.8%	10	29.4%	3	8.8%	1	2.9%	34	16.0%
	Keine Angabe	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%			3	1.4%
Form der MS:	CIS	4	80.0%	1	20.0%					5	2.4%
	RRMS	118	62.1%	49	25.8%	21	11.1%	2	1.1%	190	89.6%
	SPMS	6	40.0%	4	26.7%	4	26.7%	1	6.7%	15	7.1%
	Keine Angabe					2	100.0%			2	0.9%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	11	61.1%	6	33.3%	1	5.6%			18	8.5%
	1 – 3 Jahre	23	79.3%	5	17.2%	1	3.4%			29	13.7%
	3 – 5 Jahre	17	60.7%	8	28.6%	3	10.7%			28	13.2%
	5 – 10 Jahre	26	57.8%	10	22.2%	7	15.6%	2	4.4%	45	21.2%
	10 – 15 Jahre	19	54.3%	12	34.3%	4	11.4%			35	16.5%
	> 15 Jahre	32	57.1%	13	23.2%	10	17.9%	1	1.8%	56	26.4%
	Keine Angabe					1	100.0%			1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	93	78.8%	13	11.0%	10	8.5%	2	1.7%	118	55.7%
	mittel	12	46.2%	8	30.8%	6	23.1%			26	12.3%
	schlecht/sehr schlecht	21	33.3%	33	52.4%	9	14.3%			63	29.7%
	Keine Angabe	2	40.0%			2	40.0%	1	20.0%	5	2.4%



### 3.10 FRAGE 17: ALLE DAMALS MÖGLICHEN THERAPIEN VORGESTELLT NACH KEY VARIABLEN II

		17. Hat Ihnen Ihr Neurologe nach Ihrer Diagnose Ihrer Meinung nach alle (damals möglichen) Therapien vorgestellt?								Total	
		Ja		Nein		Weiss ich nicht mehr		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		128	60.4%	54	25.5%	27	12.7%	3	1.4%	212	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	20	48.8%	16	39.0%	3	7.3%	2	4.9%	41	19.3%
	nein	102	64.6%	34	21.5%	21	13.3%	1	0.6%	158	74.5%
	Keine Angabe	6	46.2%	4	30.8%	3	23.1%			13	6.1%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	3	75.0%	1	25.0%					4	1.9%
	Injizierbare	90	59.6%	36	23.8%	22	14.6%	3	2.0%	151	71.2%
	Gilenya	14	63.6%	5	22.7%	3	13.6%			22	10.4%
	Tecfidera	9	64.3%	5	35.7%					14	6.6%
	Tysabri	8	80.0%	1	10.0%	1	10.0%			10	4.7%
	Andere	1	25.0%	3	75.0%					4	1.9%
	Keine Angabe	3	42.9%	3	42.9%	1	14.3%			7	3.3%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	92	60.5%	38	25.0%	20	13.2%	2	1.3%	152	71.7%
	ja	36	60.0%	16	26.7%	7	11.7%	1	1.7%	60	28.3%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	6	75.0%	1	12.5%	1	12.5%			8	3.8%
	Injizierbare	25	64.1%	9	23.1%	4	10.3%	1	2.6%	39	18.4%
	Gilenya	40	62.5%	14	21.9%	9	14.1%	1	1.6%	64	30.2%
	Tecfidera	13	65.0%	5	25.0%	2	10.0%			20	9.4%
	Tysabri	33	57.9%	17	29.8%	7	12.3%			57	26.9%
	Andere	3	100.0%							3	1.4%
	keine Therapie	8	42.1%	7	36.8%	3	15.8%	1	5.3%	19	9.0%
	Keine Angabe			1	50.0%	1	50.0%			2	0.9%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	120	60.0%	50	25.0%	27	13.5%	3	1.5%	200	94.3%
	ja	8	66.7%	4	33.3%					12	5.7%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	40	69.0%	13	22.4%	4	6.9%	1	1.7%	58	27.4%
	Zweite MS Therapie	52	61.9%	23	27.4%	9	10.7%			84	39.6%
	Dritte oder mehr	26	54.2%	11	22.9%	11	22.9%			48	22.6%
	Keine Angabe	10	45.5%	7	31.8%	3	13.6%	2	9.1%	22	10.4%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	85	66.4%	27	21.1%	15	11.7%	1	0.8%	128	60.4%
	nein	27	48.2%	22	39.3%	7	12.5%			56	26.4%
	Keine Angabe	16	57.1%	5	17.9%	5	17.9%	2	7.1%	28	13.2%

### 3.11 FRAGE 18: NEUROLOGE HAT ZU EINER BESTIMMTEN THERAPIE GERATEN NACH KEY VARIABLEN I

		18. Hat Ihnen Ihr Neurologe zu einer bestimmten Therapie geraten?								Total	
		Ja		Nein		Weiss ich nicht mehr		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		160	75.5%	31	14.6%	13	6.1%	8	3.8%	212	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	117	75.5%	22	14.2%	10	6.5%	6	3.9%	155	73.1%
	Männlich	41	74.5%	9	16.4%	3	5.5%	2	3.6%	55	25.9%
	Keine Angabe	2	100.0%							2	0.9%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	25	75.8%	5	15.2%	2	6.1%	1	3.0%	33	15.6%
	31 – 40 Jahre	39	69.6%	9	16.1%	3	5.4%	5	8.9%	56	26.4%
	41 – 45 Jahre	27	73.0%	5	13.5%	5	13.5%			37	17.5%
	über 45 Jahre	67	79.8%	12	14.3%	3	3.6%	2	2.4%	84	39.6%
	Keine Angabe	2	100.0%							2	0.9%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	14	82.4%			3	17.6%			17	8.0%
	Berufslehre/ - schule	72	73.5%	13	13.3%	7	7.1%	6	6.1%	98	46.2%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	44	73.3%	13	21.7%	2	3.3%	1	1.7%	60	28.3%
	Universität / Fachhochschule	27	79.4%	5	14.7%	1	2.9%	1	2.9%	34	16.0%
	Keine Angabe	3	100.0%							3	1.4%
Form der MS:	CIS	4	80.0%					1	20.0%	5	2.4%
	RRMS	144	75.8%	27	14.2%	12	6.3%	7	3.7%	190	89.6%
	SPMS	10	66.7%	4	26.7%	1	6.7%			15	7.1%
	Keine Angabe	2	100.0%							2	0.9%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	11	61.1%	4	22.2%			3	16.7%	18	8.5%
	1 – 3 Jahre	24	82.8%	5	17.2%					29	13.7%
	3 – 5 Jahre	21	75.0%	5	17.9%			2	7.1%	28	13.2%
	5 – 10 Jahre	36	80.0%	2	4.4%	6	13.3%	1	2.2%	45	21.2%
	10 – 15 Jahre	26	74.3%	4	11.4%	4	11.4%	1	2.9%	35	16.5%
	> 15 Jahre	41	73.2%	11	19.6%	3	5.4%	1	1.8%	56	26.4%
	Keine Angabe	1	100.0%							1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	91	77.1%	17	14.4%	7	5.9%	3	2.5%	118	55.7%
	mittel	18	69.2%	5	19.2%	2	7.7%	1	3.8%	26	12.3%
	schlecht/sehr schlecht	48	76.2%	9	14.3%	3	4.8%	3	4.8%	63	29.7%
	Keine Angabe	3	60.0%			1	20.0%	1	20.0%	5	2.4%

### 3.12 FRAGE 18: NEUROLOGE HAT ZU EINER BESTIMMTEN THERAPIE GERATEN NACH KEY VARIABLEN II

		18. Hat Ihnen Ihr Neurologe zu einer bestimmten Therapie geraten?								Total	
		Ja		Nein		Weiss ich nicht mehr		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		160	75.5%	31	14.6%	13	6.1%	8	3.8%	212	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	29	70.7%	7	17.1%	3	7.3%	2	4.9%	41	19.3%
	nein	127	80.4%	23	14.6%	6	3.8%	2	1.3%	158	74.5%
	Keine Angabe	4	30.8%	1	7.7%	4	30.8%	4	30.8%	13	6.1%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	4	100.0%							4	1.9%
	Injizierbare	113	74.8%	22	14.6%	12	7.9%	4	2.6%	151	71.2%
	Gilenya	18	81.8%	2	9.1%			2	9.1%	22	10.4%
	Tecfidera	11	78.6%	3	21.4%					14	6.6%
	Tysabri	9	90.0%					1	10.0%	10	4.7%
	Andere	2	50.0%	1	25.0%			1	25.0%	4	1.9%
	Keine Angabe	3	42.9%	3	42.9%	1	14.3%			7	3.3%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	112	73.7%	26	17.1%	8	5.3%	6	3.9%	152	71.7%
	ja	48	80.0%	5	8.3%	5	8.3%	2	3.3%	60	28.3%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	6	75.0%	1	12.5%	1	12.5%			8	3.8%
	Injizierbare	23	59.0%	13	33.3%	1	2.6%	2	5.1%	39	18.4%
	Gilenya	49	76.6%	8	12.5%	4	6.3%	3	4.7%	64	30.2%
	Tecfidera	17	85.0%	2	10.0%	1	5.0%			20	9.4%
	Tysabri	46	80.7%	4	7.0%	5	8.8%	2	3.5%	57	26.9%
	Andere	3	100.0%							3	1.4%
	keine Therapie	14	73.7%	3	15.8%	1	5.3%	1	5.3%	19	9.0%
	Keine Angabe	2	100.0%							2	0.9%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	152	76.0%	28	14.0%	13	6.5%	7	3.5%	200	94.3%
	ja	8	66.7%	3	25.0%			1	8.3%	12	5.7%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	44	75.9%	10	17.2%	2	3.4%	2	3.4%	58	27.4%
	Zweite MS Therapie	65	77.4%	13	15.5%	3	3.6%	3	3.6%	84	39.6%
	Dritte oder mehr	34	70.8%	5	10.4%	7	14.6%	2	4.2%	48	22.6%
	Keine Angabe	17	77.3%	3	13.6%	1	4.5%	1	4.5%	22	10.4%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	102	79.7%	18	14.1%	6	4.7%	2	1.6%	128	60.4%
	nein	41	73.2%	10	17.9%	4	7.1%	1	1.8%	56	26.4%
	Keine Angabe	17	60.7%	3	10.7%	3	10.7%	5	17.9%	28	13.2%

### 3.13 FRAGE 19: INFORMATIONEN ZU MS-LANGZEITTHERAPEUTIKA NACH AKTUELLER THERAPIE

Wo haben Sie Informationen zu den Therapiemöglichkeiten der verschiedenen MS-Langzeittherapien eingeholt?

(Mehrfachnennungen)	Aktuelle Behandlung:																Total	
	Aubagio		Injizierbare		Gilenya		Tecfidera		Tysabri		Andere		keine Therapie		Keine Angabe		N	col%
	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total	8	100%	39	100%	64	100%	20	100%	57	100%	3	100%	19	100%	2	100%	212	100%
Behandelnde Neurologin / behandelnder Neurologe	7	87.5%	33	84.6%	50	78.1%	20	100%	45	78.9%	3	100%	16	84.2%			174	82.1%
Hausarzt	1	12.5%	10	25.6%	10	15.6%	6	30.0%	10	17.5%	2	66.7%	3	15.8%	1	50.0%	43	20.3%
MS-Pflegefachperson	1	12.5%	14	35.9%	13	20.3%	4	20.0%	6	10.5%	1	33.3%	3	15.8%	1	50.0%	43	20.3%
Frauenarzt / Frauenärztin			1	2.6%													1	0.5%
Internet	1	12.5%	23	59.0%	37	57.8%	9	45.0%	30	52.6%			10	52.6%	1	50.0%	111	52.4%
Fortbildungsseminare			6	15.4%	5	7.8%	1	5.0%	2	3.5%			3	15.8%			17	8.0%
Austausch mit anderen MS-Betroffenen			9	23.1%	13	20.3%	5	25.0%	12	21.1%			12	63.2%			51	24.1%
Bekannte / Freunde			6	15.4%	7	10.9%	2	10.0%	7	12.3%			6	31.6%			28	13.2%
Ich habe mir zu diesem Thema keine Informationen eingeholt	1	12.5%	1	2.6%	2	3.1%			2	3.5%	1	33.3%	1	5.3%			8	3.8%
Keine Angabe									2	3.5%							2	0.9%

### 3.14 FRAGE 19: INFORMATIONEN ZU MS-LANGZEITTHERAPEUTIKA NACH THERAPIE BEI ERSTDIAGNOSE

Wo haben Sie Informationen zu den Therapiemöglichkeiten der verschiedenen MS-Langzeittherapien eingeholt?

(Mehrfachnennungen)	Therapieentscheid bei Erstdiagnose:														Total	
	Aubagio		Injizierbare		Gilenya		Tecfidera		Tysabri		Andere		Keine Angabe		N	col%
	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total	4	100%	151	100%	22	100%	14	100%	10	100%	4	100%	7	100%	212	100%
Behandelnde Neurologin / behandelnder Neurologe	3	75.0%	122	80.8%	18	81.8%	13	92.9%	9	90.0%	2	50.0%	7	100%	174	82.1%
Hausarzt	1	25.0%	31	20.5%	1	4.5%	5	35.7%	2	20.0%	1	25.0%	2	28.6%	43	20.3%
MS-Pflegefachperson			37	24.5%	5	22.7%					1	25.0%			43	20.3%
Frauenarzt / Frauenärztin			1	0.7%											1	0.5%
Internet	1	25.0%	82	54.3%	12	54.5%	9	64.3%	3	30.0%	2	50.0%	2	28.6%	111	52.4%
Fortbildungsseminare			14	9.3%	2	9.1%							1	14.3%	17	8.0%
Austausch mit anderen MS-Betroffenen			41	27.2%	2	9.1%	4	28.6%	1	10.0%	2	50.0%	1	14.3%	51	24.1%
Bekannte / Freunde			21	13.9%			4	28.6%	1	10.0%	2	50.0%			28	13.2%
Ich habe mir zu diesem Thema keine Informationen eingeholt	1	25.0%	4	2.6%	1	4.5%			1	10.0%			1	14.3%	8	3.8%
Keine Angabe			1	0.7%					1	10.0%					2	0.9%

### 3.15 FRAGE 20: ROLLE DER THERAPIEBEGLEITUNG BEIM THERAPIEENTSCHEID NACH KEY VARIABLEN I

1 = keine Rolle - 5 = sehr wichtige Rolle		20. Welche Rolle hatte Ihre Therapiebegleitung (z.B. MS Nurse/MS Pflegefachperson) beim Therapieentscheid?												Total	
		1		2		3		4		5		Keine Therapiebegleitung		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		53	27.6%	12	6.3%	21	10.9%	29	15.1%	25	13.0%	52	27.1%	192	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	41	29.7%	7	5.1%	17	12.3%	21	15.2%	19	13.8%	33	23.9%	138	71.9%
	Männlich	12	23.1%	5	9.6%	4	7.7%	8	15.4%	6	11.5%	17	32.7%	52	27.1%
	Keine Angabe											2	100.0%	2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	6	21.4%	1	3.6%	2	7.1%	7	25.0%	4	14.3%	8	28.6%	28	14.6%
	31 – 40 Jahre	17	34.0%	1	2.0%	5	10.0%	9	18.0%	4	8.0%	14	28.0%	50	26.0%
	41 – 45 Jahre	9	28.1%	4	12.5%	3	9.4%	5	15.6%	2	6.3%	9	28.1%	32	16.7%
	über 45 Jahre	21	26.3%	6	7.5%	11	13.8%	8	10.0%	15	18.8%	19	23.8%	80	41.7%
	Keine Angabe											2	100.0%	2	1.0%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	7	43.8%	1	6.3%			4	25.0%	3	18.8%	1	6.3%	16	8.3%
	Berufslehre/ - schule	21	24.7%	5	5.9%	9	10.6%	11	12.9%	15	17.6%	24	28.2%	85	44.3%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	12	21.4%	5	8.9%	10	17.9%	11	19.6%	5	8.9%	13	23.2%	56	29.2%
	Universität / Fachhochschule	13	40.6%	1	3.1%	2	6.3%	2	6.3%	2	6.3%	12	37.5%	32	16.7%
	Keine Angabe							1	33.3%			2	66.7%	3	1.6%
Form der MS:	CIS							1	25.0%	1	25.0%	2	50.0%	4	2.1%
	RRMS	50	28.9%	10	5.8%	21	12.1%	26	15.0%	23	13.3%	43	24.9%	173	90.1%
	SPMS	3	21.4%	2	14.3%			2	14.3%	1	7.1%	6	42.9%	14	7.3%
	Keine Angabe											1	100.0%	1	0.5%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	1	6.7%			1	6.7%	4	26.7%	1	6.7%	8	53.3%	15	7.8%
	1 – 3 Jahre	4	15.4%			4	15.4%	7	26.9%	3	11.5%	8	30.8%	26	13.5%
	3 – 5 Jahre	9	37.5%	2	8.3%	2	8.3%	3	12.5%	4	16.7%	4	16.7%	24	12.5%
	5 – 10 Jahre	16	36.4%	3	6.8%	5	11.4%	5	11.4%	4	9.1%	11	25.0%	44	22.9%
	10 – 15 Jahre	11	34.4%	4	12.5%			4	12.5%	5	15.6%	8	25.0%	32	16.7%
	> 15 Jahre	12	24.0%	3	6.0%	9	18.0%	6	12.0%	8	16.0%	12	24.0%	50	26.0%
	Keine Angabe											1	100.0%	1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	37	33.3%	3	2.7%	9	8.1%	20	18.0%	14	12.6%	28	25.2%	111	57.8%
	mittel	4	19.0%	4	19.0%	2	9.5%	3	14.3%	3	14.3%	5	23.8%	21	10.9%
	schlecht/sehr schlecht	11	19.6%	5	8.9%	10	17.9%	5	8.9%	6	10.7%	19	33.9%	56	29.2%
	Keine Angabe	1	25.0%					1	25.0%	2	50.0%			4	2.1%

### 3.16 FRAGE 20: ROLLE DER THERAPIEBEGLEITUNG BEIM THERAPIEENTSCHEID NACH KEY VARIABLEN II

		20. Welche Rolle hatte Ihre Therapiebegleitung (z.B. MS Nurse/MS Pflegefachperson) beim Therapieentscheid?												Total	
		1		2		3		4		5		Keine Therapiebegleitung		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
1 = keine Rolle - 5 = sehr wichtige Rolle		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	col%
Total		53	27.6%	12	6.3%	21	10.9%	29	15.1%	25	13.0%	52	27.1%	192	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	6	15.4%	3	7.7%	7	17.9%	7	17.9%	6	15.4%	10	25.6%	39	20.3%
	nein	45	30.6%	8	5.4%	14	9.5%	22	15.0%	18	12.2%	40	27.2%	147	76.6%
	Keine Angabe	2	33.3%	1	16.7%					1	16.7%	2	33.3%	6	3.1%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	1	25.0%					1	25.0%	1	25.0%	1	25.0%	4	2.1%
	Injizierbare	39	27.5%	10	7.0%	17	12.0%	21	14.8%	22	15.5%	33	23.2%	142	74.0%
	Gilenya	4	23.5%	1	5.9%	2	11.8%	3	17.6%	1	5.9%	6	35.3%	17	8.9%
	Tecfidera	4	33.3%	1	8.3%	2	16.7%					5	41.7%	12	6.3%
	Tysabri	2	25.0%					3	37.5%	1	12.5%	2	25.0%	8	4.2%
	Andere	1	33.3%					1	33.3%			1	33.3%	3	1.6%
	Keine Angabe	2	33.3%									4	66.7%	6	3.1%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	38	27.9%	8	5.9%	14	10.3%	25	18.4%	14	10.3%	37	27.2%	136	70.8%
	ja	15	26.8%	4	7.1%	7	12.5%	4	7.1%	11	19.6%	15	26.8%	56	29.2%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	3	37.5%					1	12.5%	1	12.5%	3	37.5%	8	4.2%
	Injizierbare	6	17.1%	3	8.6%	6	17.1%	5	14.3%	5	14.3%	10	28.6%	35	18.2%
	Gilenya	20	33.9%	5	8.5%	4	6.8%	9	15.3%	7	11.9%	14	23.7%	59	30.7%
	Tecfidera	6	31.6%			5	26.3%	4	21.1%	1	5.3%	3	15.8%	19	9.9%
	Tysabri	14	28.0%	2	4.0%	4	8.0%	7	14.0%	7	14.0%	16	32.0%	50	26.0%
	Andere	2	66.7%							1	33.3%			3	1.6%
	keine Therapie	1	6.3%	2	12.5%	2	12.5%	3	18.8%	2	12.5%	6	37.5%	16	8.3%
	Keine Angabe	1	50.0%							1	50.0%			2	1.0%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	50	27.6%	11	6.1%	20	11.0%	28	15.5%	22	12.2%	50	27.6%	181	94.3%
	ja	3	27.3%	1	9.1%	1	9.1%	1	9.1%	3	27.3%	2	18.2%	11	5.7%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	12	23.1%	4	7.7%	5	9.6%	10	19.2%	5	9.6%	16	30.8%	52	27.1%
	Zweite MS Therapie	26	33.3%	4	5.1%	8	10.3%	11	14.1%	8	10.3%	21	26.9%	78	40.6%
	Dritte oder mehr	13	29.5%	2	4.5%	6	13.6%	5	11.4%	9	20.5%	9	20.5%	44	22.9%
	Keine Angabe	2	11.1%	2	11.1%	2	11.1%	3	16.7%	3	16.7%	6	33.3%	18	9.4%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	37	30.6%	8	6.6%	13	10.7%	17	14.0%	14	11.6%	32	26.4%	121	63.0%
	nein	10	20.4%	4	8.2%	6	12.2%	9	18.4%	8	16.3%	12	24.5%	49	25.5%
	Keine Angabe	6	27.3%			2	9.1%	3	13.6%	3	13.6%	8	36.4%	22	11.5%

### 3.17 FRAGE 21: DAUER VON DER DIAGNOSESTELLUNG BIS ZUM THERAPIESTART NACH KEY VARIABLEN I

		21. Wie lange dauerte es von der Diagnosestellung bis zum Therapiestart?									Total		
		0 – 4 Wochen		> 1 – 3 Monate		> 3 – 12 Monate		> 12 Monate		Keine Therapie erwünscht		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		67	32.8%	78	38.2%	26	12.7%	30	14.7%	3	1.5%	204	100.0%
21. Wie lange dauerte es von der Diagnosestellung bis zum Therapiestart?	0 – 4 Wochen	67	32.8%									67	32.8%
	> 1 – 3 Monate			78	38.2%							78	38.2%
	> 3 – 6 Monate					15	7.4%					15	7.4%
	> 6 – 12 Monate					11	5.4%					11	5.4%
	> 12 Monate							30	14.7%			30	14.7%
	Keine Therapie erwünscht									3	1.5%	3	1.5%
Geschlecht:	Weiblich	49	32.9%	57	38.3%	18	12.1%	23	15.4%	2	1.3%	149	73.0%
	Männlich	18	34.0%	21	39.6%	8	15.1%	5	9.4%	1	1.9%	53	26.0%
	Keine Angabe							2	100.0%			2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	16	48.5%	16	48.5%	1	3.0%					33	16.2%
	31 – 40 Jahre	18	33.3%	22	40.7%	7	13.0%	5	9.3%	2	3.7%	54	26.5%
	41 – 45 Jahre	13	36.1%	12	33.3%	5	13.9%	6	16.7%			36	17.6%
	über 45 Jahre	20	25.3%	28	35.4%	13	16.5%	17	21.5%	1	1.3%	79	38.7%
	Keine Angabe							2	100.0%			2	1.0%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	7	46.7%	4	26.7%	1	6.7%	3	20.0%			15	7.4%
	Berufslehre/ - schule	31	32.6%	38	40.0%	11	11.6%	14	14.7%	1	1.1%	95	46.6%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	17	28.8%	23	39.0%	12	20.3%	6	10.2%	1	1.7%	59	28.9%
	Universität / Fachhochschule	11	34.4%	13	40.6%	2	6.3%	5	15.6%	1	3.1%	32	15.7%
	Keine Angabe	1	33.3%					2	66.7%			3	1.5%
Form der MS:	CIS	4	80.0%	1	20.0%							5	2.5%
	RRMS	59	32.2%	75	41.0%	23	12.6%	24	13.1%	2	1.1%	183	89.7%
	SPMS	3	21.4%	2	14.3%	3	21.4%	5	35.7%	1	7.1%	14	6.9%
	Keine Angabe	1	50.0%					1	50.0%			2	1.0%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	9	56.3%	5	31.3%	1	6.3%			1	6.3%	16	7.8%
	1 – 3 Jahre	11	37.9%	15	51.7%	2	6.9%	1	3.4%			29	14.2%
	3 – 5 Jahre	9	32.1%	18	64.3%			1	3.6%			28	13.7%
	5 – 10 Jahre	15	34.1%	16	36.4%	8	18.2%	5	11.4%			44	21.6%
	10 – 15 Jahre	11	32.4%	13	38.2%	4	11.8%	5	14.7%	1	2.9%	34	16.7%
	> 15 Jahre	12	23.1%	11	21.2%	11	21.2%	17	32.7%	1	1.9%	52	25.5%
	Keine Angabe							1	100.0%			1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	39	33.6%	48	41.4%	16	13.8%	12	10.3%	1	0.9%	116	56.9%
	mittel	9	37.5%	7	29.2%	2	8.3%	6	25.0%			24	11.8%
	schlecht/sehr schlecht	18	30.0%	21	35.0%	8	13.3%	11	18.3%	2	3.3%	60	29.4%
	Keine Angabe	1	25.0%	2	50.0%			1	25.0%			4	2.0%

### 3.18 FRAGE 21: DAUER VON DER DIAGNOSESTELLUNG BIS ZUM THERAPIESTART NACH KEY VARIABLEN II

		21. Wie lange dauerte es von der Diagnosestellung bis zum Therapiestart?										Total	
		0 – 4 Wochen		> 1 – 3 Monate		> 3 – 12 Monate		> 12 Monate		Keine Therapie erwünscht		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		67	32.8%	78	38.2%	26	12.7%	30	14.7%	3	1.5%	204	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	6	14.6%	17	41.5%	8	19.5%	10	24.4%			41	20.1%
	nein	56	36.8%	58	38.2%	18	11.8%	20	13.2%			152	74.5%
	Keine Angabe	5	45.5%	3	27.3%					3	27.3%	11	5.4%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	2	50.0%	1	25.0%			1	25.0%			4	2.0%
	Injizierbare	45	31.3%	55	38.2%	21	14.6%	23	16.0%			144	70.6%
	Gilenya	8	36.4%	10	45.5%	3	13.6%	1	4.5%			22	10.8%
	Tecfidera	5	35.7%	7	50.0%	1	7.1%	1	7.1%			14	6.9%
	Tysabri	4	44.4%	2	22.2%			3	33.3%			9	4.4%
	Andere	1	25.0%	2	50.0%	1	25.0%					4	2.0%
	Keine Angabe	2	28.6%	1	14.3%			1	14.3%	3	42.9%	7	3.4%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	43	29.3%	56	38.1%	21	14.3%	24	16.3%	3	2.0%	147	72.1%
	ja	24	42.1%	22	38.6%	5	8.8%	6	10.5%			57	27.9%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	5	71.4%	1	14.3%			1	14.3%			7	3.4%
	Injizierbare	11	28.9%	12	31.6%	6	15.8%	9	23.7%			38	18.6%
	Gilenya	19	30.2%	32	50.8%	6	9.5%	6	9.5%			63	30.9%
	Tecfidera	7	36.8%	5	26.3%	2	10.5%	5	26.3%			19	9.3%
	Tysabri	20	37.0%	18	33.3%	9	16.7%	6	11.1%	1	1.9%	54	26.5%
	Andere	1	33.3%	1	33.3%					1	33.3%	3	1.5%
	keine Therapie	4	22.2%	7	38.9%	3	16.7%	3	16.7%	1	5.6%	18	8.8%
	Keine Angabe			2	100.0%							2	1.0%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	62	32.3%	73	38.0%	26	13.5%	28	14.6%	3	1.6%	192	94.1%
	ja	5	41.7%	5	41.7%			2	16.7%			12	5.9%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	21	36.8%	22	38.6%	5	8.8%	7	12.3%	2	3.5%	57	27.9%
	Zweite MS Therapie	22	27.2%	35	43.2%	13	16.0%	11	13.6%			81	39.7%
	Dritte oder mehr	19	42.2%	14	31.1%	5	11.1%	7	15.6%			45	22.1%
	Keine Angabe	5	23.8%	7	33.3%	3	14.3%	5	23.8%	1	4.8%	21	10.3%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	36	29.5%	49	40.2%	18	14.8%	19	15.6%			122	59.8%
	nein	20	37.0%	21	38.9%	5	9.3%	8	14.8%			54	26.5%
	Keine Angabe	11	39.3%	8	28.6%	3	10.7%	3	10.7%	3	10.7%	28	13.7%



### 3.19 FRAGE 22: GRÜNDE FÜR KEINE MS-LANGZEITTHERAPIE

(Mehrfachnennungen)	Geschlecht:				Total	
	Weiblich		Männlich		N	col%
	N	col%	N	col%		
Total	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%
Warum haben Sie sich gegen eine MS Langzeittherapie entschieden?						
Nebenwirkungen			1	100.0%	1	33.3%
Anwendung			1	100.0%	1	33.3%
Mangelndes Vertrauen in die Wirksamkeit			1	100.0%	1	33.3%
Kinderwunsch	1	50.0%			1	33.3%
Andere Kriterien	1	50.0%			1	33.3%

**3.20 FRAGE 23: THERAPIEENTSCHEID BEI ERSTDIAGNOSE NACH KEY VARIABLEN I**

		Therapieentscheid bei Erstdiagnose:														Total	
		Aubagio		Injizierbare		Gilenya		Tecfidera		Tysabri		Andere		Keine Angabe		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total		4	100.0%	144	100.0%	22	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	201	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	3	75.0%	108	75.0%	15	68.2%	11	78.6%	7	77.8%	2	50.0%	1	25.0%	147	73.1%
	Männlich	1	25.0%	35	24.3%	7	31.8%	3	21.4%	1	11.1%	2	50.0%	3	75.0%	52	25.9%
	Keine Angabe			1	0.7%					1	11.1%					2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre			18	12.5%	6	27.3%	7	50.0%	1	11.1%	1	25.0%			33	16.4%
	31 – 40 Jahre			34	23.6%	10	45.5%	4	28.6%	2	22.2%	1	25.0%	1	25.0%	52	25.9%
	41 – 45 Jahre	1	25.0%	25	17.4%	4	18.2%	3	21.4%	2	22.2%			1	25.0%	36	17.9%
	über 45 Jahre	3	75.0%	66	45.8%	2	9.1%			3	33.3%	2	50.0%	2	50.0%	78	38.8%
	Keine Angabe			1	0.7%					1	11.1%					2	1.0%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	2	50.0%	9	6.3%	2	9.1%			2	22.2%					15	7.5%
	Berufslehre/ - schule	2	50.0%	72	50.0%	8	36.4%	6	42.9%	3	33.3%	1	25.0%	2	50.0%	94	46.8%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung			45	31.3%	6	27.3%	3	21.4%			2	50.0%	2	50.0%	58	28.9%
	Universität / Fachhochschule			16	11.1%	6	27.3%	5	35.7%	3	33.3%	1	25.0%			31	15.4%
	Keine Angabe			2	1.4%					1	11.1%					3	1.5%
Form der MS:	CIS			5	3.5%											5	2.5%
	RRMS	3	75.0%	128	88.9%	21	95.5%	14	100.0%	9	100.0%	3	75.0%	3	75.0%	181	90.0%
	SPMS	1	25.0%	10	6.9%							1	25.0%	1	25.0%	13	6.5%
	Keine Angabe			1	0.7%	1	4.5%									2	1.0%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate			6	4.2%	1	4.5%	3	21.4%	1	11.1%	3	75.0%	1	25.0%	15	7.5%
	1 – 3 Jahre	3	75.0%	8	5.6%	9	40.9%	8	57.1%	1	11.1%					29	14.4%
	3 – 5 Jahre	1	25.0%	15	10.4%	8	36.4%	1	7.1%	3	33.3%					28	13.9%
	5 – 10 Jahre			39	27.1%	3	13.6%	1	7.1%	1	11.1%					44	21.9%
	10 – 15 Jahre			30	20.8%	1	4.5%	1	7.1%	1	11.1%					33	16.4%
	> 15 Jahre			45	31.3%					2	22.2%	1	25.0%	3	75.0%	51	25.4%
	Keine Angabe			1	0.7%											1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	4	100.0%	71	49.3%	18	81.8%	9	64.3%	8	88.9%	2	50.0%	3	75.0%	115	57.2%
	mittel			20	13.9%	1	4.5%	3	21.4%							24	11.9%
	schlecht/sehr schlecht			50	34.7%	3	13.6%	2	14.3%			2	50.0%	1	25.0%	58	28.9%
	Keine Angabe			3	2.1%					1	11.1%					4	2.0%

### 3.21 FRAGE 23: THERAPIEENTSCHEID BEI ERSTDIAGNOSE NACH KEY VARIABLEN II

		Therapieentscheid bei Erstdiagnose:														Total	
		Aubagio		Injizierbare		Gilenya		Tecfidera		Tysabri		Andere		Keine Angabe		N	col%
		N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total		4	100.0%	144	100.0%	22	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	201	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja			32	22.2%	4	18.2%	3	21.4%	1	11.1%	1	25.0%			41	20.4%
	nein	4	100.0%	108	75.0%	16	72.7%	11	78.6%	8	88.9%	2	50.0%	3	75.0%	152	75.6%
	Keine Angabe			4	2.8%	2	9.1%					1	25.0%	1	25.0%	8	4.0%
23. Für welche MS-Langzeittherapie haben Sie sich nach Ihrer Erst-Diagnose entschieden?	Aubagio	4	100.0%													4	2.0%
	Avonex			19	13.2%											19	9.5%
	Betaferon			44	30.6%											44	21.9%
	Copaxone			21	14.6%											21	10.4%
	Gilenya					22	100.0%									22	10.9%
	Plegridy			3	2.1%											3	1.5%
	Rebif			57	39.6%											57	28.4%
	Tecfidera							14	100.0%							14	7.0%
	Tysabri									9	100.0%					9	4.5%
	Andere											4	100.0%			4	2.0%
	Keine Angabe													4	100.0%	4	2.0%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	4	100.0%	87	60.4%	22	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	144	71.6%
	ja			57	39.6%											57	28.4%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	4	100.0%	2	1.4%									1	25.0%	7	3.5%
	Injizierbare			36	25.0%	1	4.5%							1	25.0%	38	18.9%
	Gilenya			40	27.8%	18	81.8%	4	28.6%			1	25.0%			63	31.3%
	Tecfidera			14	9.7%			5	35.7%							19	9.5%
	Tysabri			37	25.7%	2	9.1%	4	28.6%	9	100.0%			1	25.0%	53	26.4%
	Andere			2	1.4%											2	1.0%
	keine Therapie			12	8.3%	1	4.5%	1	7.1%			2	50.0%	1	25.0%	17	8.5%
	Keine Angabe			1	0.7%							1	25.0%			2	1.0%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	4	100.0%	132	91.7%	22	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	189	94.0%
	ja			12	8.3%											12	6.0%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	4	100.0%	25	17.4%	14	63.6%	5	35.7%	5	55.6%	2	50.0%			55	27.4%
	Zweite MS Therapie			65	45.1%	5	22.7%	8	57.1%	2	22.2%			1	25.0%	81	40.3%
	Dritte oder mehr			40	27.8%	2	9.1%			1	11.1%			2	50.0%	45	22.4%
	Keine Angabe			14	9.7%	1	4.5%	1	7.1%	1	11.1%	2	50.0%	1	25.0%	20	10.0%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	4	100.0%	81	56.3%	18	81.8%	7	50.0%	8	88.9%	2	50.0%	2	50.0%	122	60.7%
	nein			43	29.9%	1	4.5%	7	50.0%	1	11.1%	1	25.0%	1	25.0%	54	26.9%
	Keine Angabe			20	13.9%	3	13.6%					1	25.0%	1	25.0%	25	12.4%

### 3.24 FRAGE 24: WELCHE FAKTOREN HABEN SIE BEWOGEN DIESE THERAPIE ANZUWENDEN?

1 = niedriger Stellenwert - 5 = sehr hoher Stellenwert

	Auswertbare Fragebogen							
	ja							
	Valid N	Mean	Standard Deviation	Median	Minimum	Percentile 25	Percentile 75	Maximum
Schubfreiheit	178	4.8	0.6	5.0	1.0	5.0	5.0	5.0
Verzögerung der Behinderungszunahme	182	4.7	0.7	5.0	1.0	5.0	5.0	5.0
Wirksamkeit	168	4.7	0.8	5.0	1.0	5.0	5.0	5.0
Kinder/Familienplanung	147	2.6	1.7	2.0	1.0	1.0	5.0	5.0
Arbeit	154	4.0	1.3	5.0	1.0	3.0	5.0	5.0
Partnerschaft	155	4.1	1.3	5.0	1.0	3.0	5.0	5.0
Unabhängigkeit	163	4.6	0.9	5.0	1.0	4.0	5.0	5.0
Das Langzeitsicherheitsprofil der Therapie	167	4.3	1.0	5.0	1.0	4.0	5.0	5.0
Die Art der Anwendung	163	3.4	1.5	4.0	1.0	2.0	5.0	5.0
Die Häufigkeit der Therapieanwendung	157	3.4	1.5	3.0	1.0	2.0	5.0	5.0
Dokumentierte Langzeitdaten	145	3.6	1.3	4.0	1.0	3.0	5.0	5.0
Verträglichkeit	165	4.1	1.2	5.0	1.0	3.0	5.0	5.0
Andere	23	3.7	1.7	5.0	1.0	2.0	5.0	5.0

### 3.25 FRAGE 25: ROLLE DER THERAPIEBEGLEITUNG BEIM THERAPIESTART NACH KEY VARIABLEN I

1 = keine Rolle - 5 = sehr wichtige Rolle		25. Welche Rolle hatte Ihre Therapiebegleitung (z.B. MS Nurse/MS Pflegefachperson) beim Therapiestart?												Total	
		1		2		3		4		5		Keine Therapiebegleitung		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		22	11.2%	17	8.7%	26	13.3%	34	17.3%	55	28.1%	42	21.4%	196	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	13	9.0%	14	9.7%	18	12.4%	27	18.6%	43	29.7%	30	20.7%	145	74.0%
	Männlich	9	18.4%	3	6.1%	7	14.3%	7	14.3%	12	24.5%	11	22.4%	49	25.0%
	Keine Angabe					1	50.0%					1	50.0%	2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	3	9.7%	1	3.2%	5	16.1%	8	25.8%	7	22.6%	7	22.6%	31	15.8%
	31 – 40 Jahre	7	14.3%	9	18.4%	6	12.2%	4	8.2%	14	28.6%	9	18.4%	49	25.0%
	41 – 45 Jahre	5	14.7%	2	5.9%	5	14.7%	9	26.5%	9	26.5%	4	11.8%	34	17.3%
	über 45 Jahre	7	8.8%	5	6.3%	9	11.3%	13	16.3%	25	31.3%	21	26.3%	80	40.8%
	Keine Angabe					1	50.0%					1	50.0%	2	1.0%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	2	11.8%	1	5.9%	3	17.6%	4	23.5%	7	41.2%			17	8.7%
	Berufslehre/ - schule	9	10.5%	6	7.0%	9	10.5%	13	15.1%	27	31.4%	22	25.6%	86	43.9%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	8	14.0%	5	8.8%	6	10.5%	12	21.1%	17	29.8%	9	15.8%	57	29.1%
	Universität / Fachhochschule	3	9.1%	5	15.2%	7	21.2%	5	15.2%	3	9.1%	10	30.3%	33	16.8%
	Keine Angabe					1	33.3%			1	33.3%	1	33.3%	3	1.5%
Form der MS:	CIS							1	20.0%	2	40.0%	2	40.0%	5	2.6%
	RRMS	19	10.8%	16	9.1%	23	13.1%	33	18.8%	49	27.8%	36	20.5%	176	89.8%
	SPMS	3	23.1%	1	7.7%	1	7.7%			4	30.8%	4	30.8%	13	6.6%
	Keine Angabe					2	100.0%							2	1.0%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	1	7.1%	1	7.1%	2	14.3%	4	28.6%	1	7.1%	5	35.7%	14	7.1%
	1 – 3 Jahre	3	10.7%	2	7.1%	5	17.9%	3	10.7%	7	25.0%	8	28.6%	28	14.3%
	3 – 5 Jahre	3	11.5%	2	7.7%	3	11.5%	5	19.2%	8	30.8%	5	19.2%	26	13.3%
	5 – 10 Jahre	8	18.2%	3	6.8%	8	18.2%	8	18.2%	10	22.7%	7	15.9%	44	22.4%
	10 – 15 Jahre	3	9.1%	4	12.1%	3	9.1%	6	18.2%	12	36.4%	5	15.2%	33	16.8%
	> 15 Jahre	4	8.0%	5	10.0%	4	8.0%	8	16.0%	17	34.0%	12	24.0%	50	25.5%
	Keine Angabe					1	100.0%							1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	16	14.5%	9	8.2%	15	13.6%	19	17.3%	29	26.4%	22	20.0%	110	56.1%
	mittel	1	4.2%	3	12.5%	4	16.7%	3	12.5%	8	33.3%	5	20.8%	24	12.2%
	schlecht/sehr schlecht	5	8.6%	5	8.6%	7	12.1%	11	19.0%	15	25.9%	15	25.9%	58	29.6%
	Keine Angabe							1	25.0%	3	75.0%			4	2.0%

### 3.26 FRAGE 25: ROLLE DER THERAPIEBEGLEITUNG BEIM THERAPIESTART NACH KEY VARIABLEN II

		25. Welche Rolle hatte Ihre Therapiebegleitung (z.B. MS Nurse/MS Pflegefachperson) beim Therapiestart?												Total	
		1		2		3		4		5		Keine Therapiebegleitung		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
1 = keine Rolle - 5 = sehr wichtige Rolle															
Total		22	11.2%	17	8.7%	26	13.3%	34	17.3%	55	28.1%	42	21.4%	196	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	4	9.8%	4	9.8%	5	12.2%	6	14.6%	12	29.3%	10	24.4%	41	20.9%
	nein	18	11.8%	13	8.5%	21	13.7%	28	18.3%	41	26.8%	32	20.9%	153	78.1%
	Keine Angabe									2	100.0%			2	1.0%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio							1	25.0%	2	50.0%	1	25.0%	4	2.0%
	Injizierbare	13	8.9%	12	8.2%	21	14.4%	27	18.5%	47	32.2%	26	17.8%	146	74.5%
	Gilenya	5	25.0%	2	10.0%	2	10.0%	3	15.0%	1	5.0%	7	35.0%	20	10.2%
	Tecfidera	3	23.1%	2	15.4%	2	15.4%	1	7.7%			5	38.5%	13	6.6%
	Tysabri	1	12.5%			1	12.5%	2	25.0%	3	37.5%	1	12.5%	8	4.1%
	Andere			1	33.3%					1	33.3%	1	33.3%	3	1.5%
	Keine Angabe									1	50.0%	1	50.0%	2	1.0%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	17	12.3%	12	8.7%	19	13.8%	21	15.2%	39	28.3%	30	21.7%	138	70.4%
	ja	5	8.6%	5	8.6%	7	12.1%	13	22.4%	16	27.6%	12	20.7%	58	29.6%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio			1	14.3%	1	14.3%	1	14.3%	2	28.6%	2	28.6%	7	3.6%
	Injizierbare	1	2.7%	4	10.8%	8	21.6%	7	18.9%	9	24.3%	8	21.6%	37	18.9%
	Gilenya	13	21.3%	9	14.8%	4	6.6%	13	21.3%	11	18.0%	11	18.0%	61	31.1%
	Tecfidera	1	5.3%	2	10.5%	4	21.1%	3	15.8%	7	36.8%	2	10.5%	19	9.7%
	Tysabri	5	9.6%			7	13.5%	9	17.3%	19	36.5%	12	23.1%	52	26.5%
	Andere					1	50.0%			1	50.0%			2	1.0%
	keine Therapie	2	12.5%	1	6.3%	1	6.3%	1	6.3%	4	25.0%	7	43.8%	16	8.2%
	Keine Angabe									2	100.0%			2	1.0%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	22	11.9%	16	8.6%	23	12.4%	32	17.3%	51	27.6%	41	22.2%	185	94.4%
	ja			1	9.1%	3	27.3%	2	18.2%	4	36.4%	1	9.1%	11	5.6%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	7	13.5%	4	7.7%	7	13.5%	10	19.2%	11	21.2%	13	25.0%	52	26.5%
	Zweite MS Therapie	8	9.9%	10	12.3%	13	16.0%	11	13.6%	24	29.6%	15	18.5%	81	41.3%
	Dritte oder mehr	5	11.1%	2	4.4%	5	11.1%	10	22.2%	16	35.6%	7	15.6%	45	23.0%
	Keine Angabe	2	11.1%	1	5.6%	1	5.6%	3	16.7%	4	22.2%	7	38.9%	18	9.2%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	15	12.2%	12	9.8%	17	13.8%	20	16.3%	34	27.6%	25	20.3%	123	62.8%
	nein	7	13.2%	4	7.5%	6	11.3%	11	20.8%	16	30.2%	9	17.0%	53	27.0%
	Keine Angabe			1	5.0%	3	15.0%	3	15.0%	5	25.0%	8	40.0%	20	10.2%

### 3.27 FRAGE 26: WIE STARK HABEN MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN BEI MS-THERAPEUTIKA IHRE WAHL FÜR EIN PRÄPARAT BEINFLUSST?

1 = gar nicht - 5 = sehr stark

	Auswertbare Fragebogen							
	ja							
	Valid N	Mean	Standard Deviation	Median	Minimum	Percentile 25	Percentile 75	Maximum
Herzrhythmusstörungen	152	2.3	1.6	1.0	1.0	1.0	3.5	5.0
Makulaödem (Schwellung der Netzhaut im Augenhintergrund)	147	2.3	1.6	1.0	1.0	1.0	4.0	5.0
Reaktion der Einstichstelle bei Injektionen	161	2.9	1.5	3.0	1.0	1.0	4.0	5.0
Dünnere werdende Haare	149	2.3	1.6	1.0	1.0	1.0	4.0	5.0
Infektionen	158	2.7	1.6	2.0	1.0	1.0	4.0	5.0
Progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML)	125	2.8	1.8	3.0	1.0	1.0	5.0	5.0
Übelkeit / Erbrechen	156	2.6	1.5	2.5	1.0	1.0	4.0	5.0
Hautauschlag/Hautrötungen	164	2.8	1.5	3.0	1.0	1.0	4.0	5.0
Lymphopenie	115	2.2	1.5	1.0	1.0	1.0	3.0	5.0
Müdigkeit	169	3.1	1.5	3.0	1.0	2.0	5.0	5.0
Grippe-ähnliche-Symptome	174	3.1	1.5	3.0	1.0	2.0	5.0	5.0
Krebsrisiko	142	2.7	1.7	3.0	1.0	1.0	4.0	5.0
Verdauungsprobleme	154	2.6	1.5	2.0	1.0	1.0	4.0	5.0
Datenlage bei Schwangerschaft	104	2.0	1.6	1.0	1.0	1.0	3.0	5.0

### 3.28 FRAGE 27: SICHERHEIT BEI DER ENTSCHEIDUNG FÜR DIE THERAPIE NACH KEY VARIABLEN I

1 = sehr sicher - 5 = sehr unsicher		27. Wie sicher haben Sie sich gefühlt bei der Entscheidung für Ihre Therapie?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		44	22.4%	40	20.4%	60	30.6%	35	17.9%	17	8.7%	196	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	34	23.3%	31	21.2%	40	27.4%	27	18.5%	14	9.6%	146	74.5%
	Männlich	9	18.8%	9	18.8%	20	41.7%	7	14.6%	3	6.3%	48	24.5%
	Keine Angabe	1	50.0%					1	50.0%			2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	7	21.2%	5	15.2%	10	30.3%	11	33.3%			33	16.8%
	31 – 40 Jahre	9	18.0%	12	24.0%	12	24.0%	10	20.0%	7	14.0%	50	25.5%
	41 – 45 Jahre	8	22.9%	5	14.3%	12	34.3%	6	17.1%	4	11.4%	35	17.9%
	über 45 Jahre	19	25.0%	18	23.7%	26	34.2%	7	9.2%	6	7.9%	76	38.8%
	Keine Angabe	1	50.0%					1	50.0%			2	1.0%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	2	13.3%	2	13.3%	5	33.3%	3	20.0%	3	20.0%	15	7.7%
	Berufslehre/ - schule	26	28.6%	15	16.5%	29	31.9%	15	16.5%	6	6.6%	91	46.4%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	12	21.8%	16	29.1%	15	27.3%	8	14.5%	4	7.3%	55	28.1%
	Universität / Fachhochschule	3	9.4%	7	21.9%	11	34.4%	7	21.9%	4	12.5%	32	16.3%
	Keine Angabe	1	33.3%					2	66.7%			3	1.5%
Form der MS:	CIS	1	20.0%	2	40.0%			2	40.0%			5	2.6%
	RRMS	41	23.0%	34	19.1%	54	30.3%	32	18.0%	17	9.6%	178	90.8%
	SPMS	2	18.2%	4	36.4%	5	45.5%					11	5.6%
	Keine Angabe					1	50.0%	1	50.0%			2	1.0%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	5	31.3%	4	25.0%	2	12.5%	5	31.3%			16	8.2%
	1 – 3 Jahre	4	14.3%	7	25.0%	9	32.1%	5	17.9%	3	10.7%	28	14.3%
	3 – 5 Jahre	5	19.2%	7	26.9%	9	34.6%	3	11.5%	2	7.7%	26	13.3%
	5 – 10 Jahre	11	25.0%	7	15.9%	13	29.5%	8	18.2%	5	11.4%	44	22.4%
	10 – 15 Jahre	5	16.1%	4	12.9%	11	35.5%	7	22.6%	4	12.9%	31	15.8%
	> 15 Jahre	14	28.0%	11	22.0%	16	32.0%	6	12.0%	3	6.0%	50	25.5%
	Keine Angabe							1	100.0%			1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	36	32.4%	27	24.3%	27	24.3%	16	14.4%	5	4.5%	111	56.6%
	mittel	4	16.7%	5	20.8%	12	50.0%	1	4.2%	2	8.3%	24	12.2%
	schlecht/sehr schlecht	3	5.3%	7	12.3%	21	36.8%	18	31.6%	8	14.0%	57	29.1%
	Keine Angabe	1	25.0%	1	25.0%					2	50.0%	4	2.0%



### 3.29 FRAGE 27: SICHERHEIT BEI DER ENTSCHEIDUNG FÜR DIE THERAPIE NACH KEY VARIABLEN II

1 = sehr sicher - 5 = sehr unsicher		27. Wie sicher haben Sie sich gefühlt bei der Entscheidung für Ihre Therapie?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		44	22.4%	40	20.4%	60	30.6%	35	17.9%	17	8.7%	196	100.0%
Zweitmeinung bei	ja	8	20.5%	6	15.4%	12	30.8%	11	28.2%	2	5.1%	39	19.9%
Diagnose:	nein	35	23.0%	34	22.4%	47	30.9%	23	15.1%	13	8.6%	152	77.6%
	Keine Angabe	1	20.0%			1	20.0%	1	20.0%	2	40.0%	5	2.6%
Therapieentscheid bei	Aubagio	2	50.0%	2	50.0%							4	2.0%
Erstdiagnose:	Injizierbare	30	21.1%	29	20.4%	43	30.3%	28	19.7%	12	8.5%	142	72.4%
	Gilenya	6	30.0%	4	20.0%	7	35.0%	2	10.0%	1	5.0%	20	10.2%
	Tecfidera	2	14.3%	3	21.4%	6	42.9%	2	14.3%	1	7.1%	14	7.1%
	Tysabri	2	22.2%	1	11.1%	3	33.3%			3	33.3%	9	4.6%
	Andere	1	25.0%	1	25.0%			2	50.0%			4	2.0%
	Keine Angabe	1	33.3%			1	33.3%	1	33.3%			3	1.5%
Rebif bei	nein	30	21.0%	29	20.3%	48	33.6%	26	18.2%	10	7.0%	143	73.0%
Erstdiagnose:	ja	14	26.4%	11	20.8%	12	22.6%	9	17.0%	7	13.2%	53	27.0%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	2	28.6%	2	28.6%	3	42.9%					7	3.6%
	Injizierbare	10	26.3%	8	21.1%	11	28.9%	5	13.2%	4	10.5%	38	19.4%
	Gilenya	15	24.6%	12	19.7%	15	24.6%	16	26.2%	3	4.9%	61	31.1%
	Tecfidera	4	22.2%	6	33.3%	4	22.2%	3	16.7%	1	5.6%	18	9.2%
	Tysabri	8	15.4%	10	19.2%	20	38.5%	7	13.5%	7	13.5%	52	26.5%
	Andere	1	50.0%			1	50.0%					2	1.0%
	keine Therapie	4	25.0%	1	6.3%	5	31.3%	4	25.0%	2	12.5%	16	8.2%
	Keine Angabe			1	50.0%	1	50.0%					2	1.0%
Rebif ist aktuelle	nein	40	21.7%	36	19.6%	58	31.5%	35	19.0%	15	8.2%	184	93.9%
Behandlung:	ja	4	33.3%	4	33.3%	2	16.7%			2	16.7%	12	6.1%
Anzahl MS Langzeit-	Erste MS Therapie	17	30.9%	14	25.5%	16	29.1%	4	7.3%	4	7.3%	55	28.1%
Therapien:	Zweite MS Therapie	15	19.2%	16	20.5%	22	28.2%	17	21.8%	8	10.3%	78	39.8%
	Dritte oder mehr	7	15.9%	8	18.2%	16	36.4%	10	22.7%	3	6.8%	44	22.4%
	Keine Angabe	5	26.3%	2	10.5%	6	31.6%	4	21.1%	2	10.5%	19	9.7%
Rückblickend gleiche	ja	33	26.4%	30	24.0%	36	28.8%	16	12.8%	10	8.0%	125	63.8%
Therapie:	nein	6	11.3%	8	15.1%	19	35.8%	14	26.4%	6	11.3%	53	27.0%
	Keine Angabe	5	27.8%	2	11.1%	5	27.8%	5	27.8%	1	5.6%	18	9.2%

### 3.30 FRAGE 28: ZUSÄTZLICHE HILFE BEI THERAPIEENTSCHEID NACH THERAPIE BEI ERSTDIAGNOSE

#### 28. Was hätte Ihnen beim Therapieentscheid zusätzlich geholfen?

Alle Patienten (Mehrfachnennungen)	Therapieentscheid bei Erstdiagnose:												Total	
	Aubagio		Injizierbare		Gilenya		Tecfidera		Tysabri		Andere		N	col%
	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total	4	100%	151	100%	22	100%	14	100%	10	100%	4	100%	205	100%
Mehr Zeit mit meinem behandelnden Neurologen	1	25.0%	45	29.8%	4	18.2%	2	14.3%	2	20.0%	2	50.0%	56	27.3%
Mehr Zeit mit meiner Therapiebegleitung (MS Schwester/MS Pflegefachperson)			20	13.2%	2	9.1%	2	14.3%	1	10.0%			25	12.2%
Mehr Informationen zu Nebenwirkungen und dem Sicherheitsprofil der einzelnen Therapien			54	35.8%	5	22.7%	6	42.9%	1	10.0%	2	50.0%	68	33.2%
Ein verstärkter Austausch mit anderen Betroffenen			27	17.9%	3	13.6%			2	20.0%			32	15.6%
Psychologische Beratung			25	16.6%	4	18.2%	2	14.3%					31	15.1%
Keine Angabe	3	75.0%	58	38.4%	12	54.5%	6	42.9%	6	60.0%	2	50.0%	87	42.4%

### 3.31 FRAGE 28: ZUSÄTZLICHE HILFE BEI THERAPIEENTSCHEID NACH THERAPIE BEI ERSTDIAGNOSE

#### 28. Was hätte Ihnen beim Therapieentscheid zusätzlich geholfen?

Patienten mit Angaben (Mehrfachnennungen)	Therapieentscheid bei Erstdiagnose:												Total	
	Aubagio		Injizierbare		Gilenya		Tecfidera		Tysabri		Andere		N	col%
	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%	N	col%		
Total	1	100%	93	100%	10	100%	8	100%	4	100%	2	100%	118	100%
Mehr Zeit mit meinem behandelnden Neurologen	1	100%	45	48.4%	4	40.0%	2	25.0%	2	50.0%	2	100%	56	47.5%
Mehr Zeit mit meiner Therapiebegleitung (MS Schwester/MS Pflegefachperson)			20	21.5%	2	20.0%	2	25.0%	1	25.0%			25	21.2%
Mehr Informationen zu Nebenwirkungen und dem Sicherheitsprofil der einzelnen Therapien			54	58.1%	5	50.0%	6	75.0%	1	25.0%	2	100%	68	57.6%
Ein verstärkter Austausch mit anderen Betroffenen			27	29.0%	3	30.0%			2	50.0%			32	27.1%
Psychologische Beratung			25	26.9%	4	40.0%	2	25.0%					31	26.3%

### 3.32 FRAGE 29A: BETREUUNG DURCH NEUROLOGE BEIM THERAPIESTART NACH KEY VARIABLEN I

1 = sehr schlecht - 5 = sehr gut		Wie fühlten Sie sich beim und nach dem Therapiestart betreut: durch Neurologe/in?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		12	6.2%	18	9.3%	20	10.4%	39	20.2%	104	53.9%	193	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	10	6.8%	16	11.0%	10	6.8%	31	21.2%	79	54.1%	146	75.6%
	Männlich	2	4.4%	2	4.4%	10	22.2%	7	15.6%	24	53.3%	45	23.3%
	Keine Angabe							1	50.0%	1	50.0%	2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	1	3.1%	5	15.6%	3	9.4%	11	34.4%	12	37.5%	32	16.6%
	31 – 40 Jahre	3	6.1%	6	12.2%	4	8.2%	5	10.2%	31	63.3%	49	25.4%
	41 – 45 Jahre	3	9.4%	1	3.1%	2	6.3%	6	18.8%	20	62.5%	32	16.6%
	über 45 Jahre	5	6.4%	6	7.7%	11	14.1%	16	20.5%	40	51.3%	78	40.4%
	Keine Angabe							1	50.0%	1	50.0%	2	1.0%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre					3	18.8%	3	18.8%	10	62.5%	16	8.3%
	Berufslehre/ - schule	3	3.4%	10	11.2%	6	6.7%	20	22.5%	50	56.2%	89	46.1%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	5	9.4%	3	5.7%	9	17.0%	8	15.1%	28	52.8%	53	27.5%
	Universität / Fachhochschule	4	12.5%	5	15.6%	2	6.3%	7	21.9%	14	43.8%	32	16.6%
	Keine Angabe							1	33.3%	2	66.7%	3	1.6%
Form der MS:	CIS					1	20.0%	2	40.0%	2	40.0%	5	2.6%
	RRMS	12	6.9%	16	9.1%	16	9.1%	36	20.6%	95	54.3%	175	90.7%
	SPMS			2	18.2%	3	27.3%			6	54.5%	11	5.7%
	Keine Angabe							1	50.0%	1	50.0%	2	1.0%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	1	6.3%	1	6.3%	1	6.3%	2	12.5%	11	68.8%	16	8.3%
	1 – 3 Jahre			3	11.1%	1	3.7%	8	29.6%	15	55.6%	27	14.0%
	3 – 5 Jahre	3	11.5%	3	11.5%	3	11.5%	6	23.1%	11	42.3%	26	13.5%
	5 – 10 Jahre	4	9.3%	5	11.6%	3	7.0%	11	25.6%	20	46.5%	43	22.3%
	10 – 15 Jahre			2	6.7%	5	16.7%	4	13.3%	19	63.3%	30	15.5%
	> 15 Jahre	4	8.0%	4	8.0%	7	14.0%	7	14.0%	28	56.0%	50	25.9%
	Keine Angabe							1	100.0%			1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	2	1.8%	5	4.5%	7	6.4%	20	18.2%	76	69.1%	110	57.0%
	mittel	2	8.7%	4	17.4%	6	26.1%	5	21.7%	6	26.1%	23	11.9%
	schlecht/sehr schlecht	8	14.5%	9	16.4%	7	12.7%	13	23.6%	18	32.7%	55	28.5%
	Keine Angabe							1	20.0%	4	80.0%	5	2.6%

### 3.33 FRAGE 29A: BETREUUNG DURCH NEUROLOGE BEIM THERAPIESTART NACH KEY VARIABLEN II

1 = sehr schlecht - 5 = sehr gut		Wie fühlten Sie sich beim und nach dem Therapiestart betreut: durch Neurologe/in?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		12	6.2%	18	9.3%	20	10.4%	39	20.2%	104	53.9%	193	100.0%
Zweitmeinung bei	ja	6	16.2%	5	13.5%	3	8.1%	6	16.2%	17	45.9%	37	19.2%
Diagnose:	nein	5	3.3%	12	7.9%	17	11.3%	33	21.9%	84	55.6%	151	78.2%
	Keine Angabe	1	20.0%	1	20.0%					3	60.0%	5	2.6%
Therapieentscheid bei	Aubagio			1	25.0%					3	75.0%	4	2.1%
Erstdiagnose:	Injizierbare	10	7.1%	13	9.2%	15	10.6%	31	22.0%	72	51.1%	141	73.1%
	Gilenya	2	10.5%	2	10.5%	2	10.5%	2	10.5%	11	57.9%	19	9.8%
	Tecfidera			1	7.1%	2	14.3%	5	35.7%	6	42.9%	14	7.3%
	Tysabri					1	11.1%	1	11.1%	7	77.8%	9	4.7%
	Andere			1	33.3%					2	66.7%	3	1.6%
	Keine Angabe									3	100.0%	3	1.6%
Rebif bei	nein	8	5.8%	11	8.0%	17	12.3%	29	21.0%	73	52.9%	138	71.5%
Erstdiagnose:	ja	4	7.3%	7	12.7%	3	5.5%	10	18.2%	31	56.4%	55	28.5%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	1	16.7%	1	16.7%					4	66.7%	6	3.1%
	Injizierbare	1	2.6%	5	13.2%	5	13.2%	11	28.9%	16	42.1%	38	19.7%
	Gilenya	3	5.1%	5	8.5%	10	16.9%	15	25.4%	26	44.1%	59	30.6%
	Tecfidera	1	5.3%	1	5.3%	1	5.3%	5	26.3%	11	57.9%	19	9.8%
	Tysabri	5	9.6%	3	5.8%	1	1.9%	7	13.5%	36	69.2%	52	26.9%
	Andere			1	50.0%					1	50.0%	2	1.0%
	keine Therapie	1	6.3%	2	12.5%	3	18.8%	1	6.3%	9	56.3%	16	8.3%
	Keine Angabe									1	100.0%	1	0.5%
Rebif ist aktuelle	nein	12	6.6%	16	8.8%	19	10.5%	36	19.9%	98	54.1%	181	93.8%
Behandlung:	ja			2	16.7%	1	8.3%	3	25.0%	6	50.0%	12	6.2%
Anzahl MS Langzeit-	Erste MS Therapie	2	3.8%	6	11.3%	6	11.3%	11	20.8%	28	52.8%	53	27.5%
Therapien:	Zweite MS Therapie	7	8.9%	5	6.3%	8	10.1%	19	24.1%	40	50.6%	79	40.9%
	Dritte oder mehr	2	4.8%	5	11.9%	3	7.1%	7	16.7%	25	59.5%	42	21.8%
	Keine Angabe	1	5.3%	2	10.5%	3	15.8%	2	10.5%	11	57.9%	19	9.8%
Rückblickend gleiche	ja	6	4.9%	9	7.4%	13	10.7%	22	18.0%	72	59.0%	122	63.2%
Therapie:	nein	5	9.4%	7	13.2%	6	11.3%	13	24.5%	22	41.5%	53	27.5%
	Keine Angabe	1	5.6%	2	11.1%	1	5.6%	4	22.2%	10	55.6%	18	9.3%

### 3.34 FRAGE 29B: BETREUUNG DURCH THERAPIEBEGLEITUNG BEIM THERAPIESTART NACH KEY VARIABLEN I

1 = sehr schlecht - 5 = sehr gut		Wie fühlten Sie sich beim und nach dem Therapiestart betreut: durch Therapiebegleitung?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		3	2.4%	10	8.1%	12	9.7%	22	17.7%	77	62.1%	124	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	3	3.2%	10	10.5%	8	8.4%	16	16.8%	58	61.1%	95	76.6%
	Männlich					4	13.8%	6	20.7%	19	65.5%	29	23.4%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre			2	10.0%	2	10.0%	3	15.0%	13	65.0%	20	16.1%
	31 – 40 Jahre			3	8.3%	4	11.1%	7	19.4%	22	61.1%	36	29.0%
	41 – 45 Jahre			1	4.2%	2	8.3%	4	16.7%	17	70.8%	24	19.4%
	über 45 Jahre	3	6.8%	4	9.1%	4	9.1%	8	18.2%	25	56.8%	44	35.5%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre					1	12.5%	2	25.0%	5	62.5%	8	6.5%
	Berufslehre/ - schule	2	3.4%	6	10.2%	7	11.9%	10	16.9%	34	57.6%	59	47.6%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	1	2.6%	2	5.1%	2	5.1%	8	20.5%	26	66.7%	39	31.5%
	Universität / Fachhochschule			2	11.8%	2	11.8%	2	11.8%	11	64.7%	17	13.7%
	Keine Angabe									1	100.0%	1	0.8%
Form der MS:	CIS									3	100.0%	3	2.4%
	RRMS	3	2.6%	9	7.9%	11	9.6%	22	19.3%	69	60.5%	114	91.9%
	SPMS			1	14.3%	1	14.3%			5	71.4%	7	5.6%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate					1	14.3%	1	14.3%	5	71.4%	7	5.6%
	1 – 3 Jahre			4	23.5%			5	29.4%	8	47.1%	17	13.7%
	3 – 5 Jahre					3	15.0%	3	15.0%	14	70.0%	20	16.1%
	5 – 10 Jahre			3	10.3%	3	10.3%	6	20.7%	17	58.6%	29	23.4%
	10 – 15 Jahre					1	6.3%	3	18.8%	12	75.0%	16	12.9%
	> 15 Jahre	3	8.6%	3	8.6%	4	11.4%	4	11.4%	21	60.0%	35	28.2%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	1	1.4%	4	5.6%	3	4.2%	10	14.1%	53	74.6%	71	57.3%
	mittel			2	14.3%	3	21.4%	2	14.3%	7	50.0%	14	11.3%
	schlecht/sehr schlecht	2	5.7%	4	11.4%	6	17.1%	9	25.7%	14	40.0%	35	28.2%
	Keine Angabe							1	25.0%	3	75.0%	4	3.2%

### 3.35 FRAGE 29B: BETREUUNG DURCH THERAPIEBEGLEITUNG BEIM THERAPIESTART NACH KEY VARIABLEN II

1 = sehr schlecht - 5 = sehr gut		Wie fühlten Sie sich beim und nach dem Therapiestart betreut: durch Therapiebegleitung?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		3	2.4%	10	8.1%	12	9.7%	22	17.7%	77	62.1%	124	100.0%
Zweitmeinung bei	ja	2	8.0%	3	12.0%	2	8.0%	4	16.0%	14	56.0%	25	20.2%
Diagnose:	nein	1	1.1%	6	6.3%	10	10.5%	17	17.9%	61	64.2%	95	76.6%
	Keine Angabe			1	25.0%			1	25.0%	2	50.0%	4	3.2%
Therapieentscheid bei	Aubagio									1	100.0%	1	0.8%
Erstdiagnose:	Injizierbare	3	3.0%	7	7.0%	11	11.0%	18	18.0%	61	61.0%	100	80.6%
	Gilenya			1	12.5%			2	25.0%	5	62.5%	8	6.5%
	Tecfidera			2	50.0%	1	25.0%	1	25.0%			4	3.2%
	Tysabri									7	100.0%	7	5.6%
	Andere							1	33.3%	2	66.7%	3	2.4%
	Keine Angabe									1	100.0%	1	0.8%
Rebif bei	nein	2	2.4%	6	7.2%	7	8.4%	18	21.7%	50	60.2%	83	66.9%
Erstdiagnose:	ja	1	2.4%	4	9.8%	5	12.2%	4	9.8%	27	65.9%	41	33.1%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio			1	33.3%					2	66.7%	3	2.4%
	Injizierbare	1	3.8%	3	11.5%	2	7.7%	6	23.1%	14	53.8%	26	21.0%
	Gilenya	1	2.8%	3	8.3%	4	11.1%	11	30.6%	17	47.2%	36	29.0%
	Tecfidera			1	11.1%	1	11.1%	1	11.1%	6	66.7%	9	7.3%
	Tysabri			2	5.4%	3	8.1%	3	8.1%	29	78.4%	37	29.8%
	Andere							1	50.0%	1	50.0%	2	1.6%
	keine Therapie	1	11.1%			2	22.2%			6	66.7%	9	7.3%
	Keine Angabe									2	100.0%	2	1.6%
Rebif ist aktuelle	nein	3	2.6%	9	7.8%	12	10.3%	21	18.1%	71	61.2%	116	93.5%
Behandlung:	ja			1	12.5%			1	12.5%	6	75.0%	8	6.5%
Anzahl MS Langzeit-	Erste MS Therapie			3	9.4%	1	3.1%	7	21.9%	21	65.6%	32	25.8%
Therapien:	Zweite MS Therapie	2	3.6%	5	8.9%	6	10.7%	10	17.9%	33	58.9%	56	45.2%
	Dritte oder mehr			2	8.0%	3	12.0%	4	16.0%	16	64.0%	25	20.2%
	Keine Angabe	1	9.1%			2	18.2%	1	9.1%	7	63.6%	11	8.9%
Rückblickend gleiche	ja	2	2.9%	5	7.2%	4	5.8%	12	17.4%	46	66.7%	69	55.6%
Therapie:	nein	1	2.4%	4	9.5%	7	16.7%	6	14.3%	24	57.1%	42	33.9%
	Keine Angabe			1	7.7%	1	7.7%	4	30.8%	7	53.8%	13	10.5%

### 3.36 FRAGE 30: ZWEITMEINUNG NACH KEY VARIABLEN I

		30. Haben Sie sich nach/bei Ihrer Erst-Diagnose eine Zweitmeinung eingeholt?						Total	
		Ja		Nein		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%		
Total		41	19.3%	158	74.5%	13	6.1%	212	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	30	19.4%	116	74.8%	9	5.8%	155	73.1%
	Männlich	11	20.0%	40	72.7%	4	7.3%	55	25.9%
	Keine Angabe			2	100.0%			2	0.9%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	9	27.3%	23	69.7%	1	3.0%	33	15.6%
	31 – 40 Jahre	6	10.7%	44	78.6%	6	10.7%	56	26.4%
	41 – 45 Jahre	4	10.8%	31	83.8%	2	5.4%	37	17.5%
	über 45 Jahre	22	26.2%	58	69.0%	4	4.8%	84	39.6%
	Keine Angabe			2	100.0%			2	0.9%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	3	17.6%	14	82.4%			17	8.0%
	Berufslehre/ - schule	15	15.3%	74	75.5%	9	9.2%	98	46.2%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	13	21.7%	44	73.3%	3	5.0%	60	28.3%
	Universität / Fachhochschule	9	26.5%	24	70.6%	1	2.9%	34	16.0%
	Keine Angabe	1	33.3%	2	66.7%			3	1.4%
Form der MS:	CIS			5	100.0%			5	2.4%
	RRMS	37	19.5%	142	74.7%	11	5.8%	190	89.6%
	SPMS	4	26.7%	9	60.0%	2	13.3%	15	7.1%
	Keine Angabe			2	100.0%			2	0.9%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	3	16.7%	12	66.7%	3	16.7%	18	8.5%
	1 – 3 Jahre	5	17.2%	23	79.3%	1	3.4%	29	13.7%
	3 – 5 Jahre	4	14.3%	22	78.6%	2	7.1%	28	13.2%
	5 – 10 Jahre	9	20.0%	36	80.0%			45	21.2%
	10 – 15 Jahre	4	11.4%	29	82.9%	2	5.7%	35	16.5%
	> 15 Jahre	16	28.6%	35	62.5%	5	8.9%	56	26.4%
	Keine Angabe			1	100.0%			1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	18	15.3%	94	79.7%	6	5.1%	118	55.7%
	mittel	7	26.9%	18	69.2%	1	3.8%	26	12.3%
	schlecht/sehr schlecht	15	23.8%	43	68.3%	5	7.9%	63	29.7%
	Keine Angabe	1	20.0%	3	60.0%	1	20.0%	5	2.4%

### 3.37 FRAGE 30: ZWEITMEINUNG NACH KEY VARIABLEN II

		30. Haben Sie sich nach/bei Ihrer Erst-Diagnose eine Zweitmeinung eingeholt?						Total	
		Ja		Nein		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%		
Total		41	19.3%	158	74.5%	13	6.1%	212	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	41	100.0%					41	19.3%
	nein			158	100.0%			158	74.5%
	Keine Angabe					13	100.0%	13	6.1%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio			4	100.0%			4	1.9%
	Injizierbare	32	21.2%	114	75.5%	5	3.3%	151	71.2%
	Gilenya	4	18.2%	16	72.7%	2	9.1%	22	10.4%
	Tecfidera	3	21.4%	11	78.6%			14	6.6%
	Tysabri	1	10.0%	8	80.0%	1	10.0%	10	4.7%
	Andere	1	25.0%	2	50.0%	1	25.0%	4	1.9%
	Keine Angabe			3	42.9%	4	57.1%	7	3.3%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	27	17.8%	115	75.7%	10	6.6%	152	71.7%
	ja	14	23.3%	43	71.7%	3	5.0%	60	28.3%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio			7	87.5%	1	12.5%	8	3.8%
	Injizierbare	10	25.6%	27	69.2%	2	5.1%	39	18.4%
	Gilenya	9	14.1%	51	79.7%	4	6.3%	64	30.2%
	Tecfidera	6	30.0%	14	70.0%			20	9.4%
	Tysabri	9	15.8%	45	78.9%	3	5.3%	57	26.9%
	Andere			2	66.7%	1	33.3%	3	1.4%
	keine Therapie	6	31.6%	11	57.9%	2	10.5%	19	9.0%
	Keine Angabe	1	50.0%	1	50.0%			2	0.9%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	37	18.5%	151	75.5%	12	6.0%	200	94.3%
	ja	4	33.3%	7	58.3%	1	8.3%	12	5.7%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	11	19.0%	42	72.4%	5	8.6%	58	27.4%
	Zweite MS Therapie	16	19.0%	66	78.6%	2	2.4%	84	39.6%
	Dritte oder mehr	7	14.6%	37	77.1%	4	8.3%	48	22.6%
	Keine Angabe	7	31.8%	13	59.1%	2	9.1%	22	10.4%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	22	17.2%	103	80.5%	3	2.3%	128	60.4%
	nein	12	21.4%	41	73.2%	3	5.4%	56	26.4%
	Keine Angabe	7	25.0%	14	50.0%	7	25.0%	28	13.2%



### 3.38 FRAGE 31: WIE HILFREICH WAR DIE ZWEITMEINUNG NACH KEY VARIABLEN I

1 = sehr hilfreich - 5 = überhaupt nicht hilfreich		31. Wie hilfreich war die Zweitmeinung rückblickend?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		20	50.0%	6	15.0%	4	10.0%	6	15.0%	4	10.0%	40	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	15	51.7%	6	20.7%	1	3.4%	4	13.8%	3	10.3%	29	72.5%
	Männlich	5	45.5%			3	27.3%	2	18.2%	1	9.1%	11	27.5%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	5	55.6%	1	11.1%	2	22.2%			1	11.1%	9	22.5%
	31 – 40 Jahre	3	50.0%					2	33.3%	1	16.7%	6	15.0%
	41 – 45 Jahre	1	25.0%	1	25.0%			1	25.0%	1	25.0%	4	10.0%
	über 45 Jahre	11	52.4%	4	19.0%	2	9.5%	3	14.3%	1	4.8%	21	52.5%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	1	33.3%	1	33.3%			1	33.3%			3	7.5%
	Berufslehre/ - schule	8	57.1%	3	21.4%	2	14.3%	1	7.1%			14	35.0%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	6	46.2%	1	7.7%	1	7.7%	3	23.1%	2	15.4%	13	32.5%
	Universität / Fachhochschule	5	55.6%	1	11.1%			1	11.1%	2	22.2%	9	22.5%
	Keine Angabe					1	100.0%					1	2.5%
Form der MS:	RRMS	18	50.0%	5	13.9%	3	8.3%	6	16.7%	4	11.1%	36	90.0%
	SPMS	2	50.0%	1	25.0%	1	25.0%					4	10.0%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	2	66.7%			1	33.3%					3	7.5%
	1 – 3 Jahre	3	60.0%			1	20.0%			1	20.0%	5	12.5%
	3 – 5 Jahre	2	50.0%	1	25.0%			1	25.0%			4	10.0%
	5 – 10 Jahre	4	44.4%	1	11.1%			3	33.3%	1	11.1%	9	22.5%
	10 – 15 Jahre	1	25.0%	2	50.0%					1	25.0%	4	10.0%
	> 15 Jahre	8	53.3%	2	13.3%	2	13.3%	2	13.3%	1	6.7%	15	37.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	9	52.9%	2	11.8%	2	11.8%	2	11.8%	2	11.8%	17	42.5%
	mittel	2	28.6%	2	28.6%	2	28.6%			1	14.3%	7	17.5%
	schlecht/sehr schlecht	8	53.3%	2	13.3%			4	26.7%	1	6.7%	15	37.5%
	Keine Angabe	1	100.0%									1	2.5%

### 3.39 FRAGE 31: WIE HILFREICH WAR DIE ZWEITMEINUNG NACH KEY VARIABLEN II

1 = sehr hilfreich - 5 = überhaupt nicht hilfreich		31. Wie hilfreich war die Zweitmeinung rückblickend?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		20	50.0%	6	15.0%	4	10.0%	6	15.0%	4	10.0%	40	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	20	50.0%	6	15.0%	4	10.0%	6	15.0%	4	10.0%	40	100.0%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Injizierbare	13	41.9%	5	16.1%	4	12.9%	6	19.4%	3	9.7%	31	77.5%
	Gilenya	3	75.0%	1	25.0%							4	10.0%
	Tecfidera	2	66.7%							1	33.3%	3	7.5%
	Tysabri	1	100.0%									1	2.5%
	Andere	1	100.0%									1	2.5%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	11	40.7%	5	18.5%	4	14.8%	5	18.5%	2	7.4%	27	67.5%
	ja	9	69.2%	1	7.7%			1	7.7%	2	15.4%	13	32.5%
Aktuelle Behandlung:	Injizierbare	3	33.3%	3	33.3%	1	11.1%	2	22.2%			9	22.5%
	Gilenya	5	55.6%			1	11.1%	3	33.3%			9	22.5%
	Tecfidera	2	33.3%	2	33.3%	1	16.7%			1	16.7%	6	15.0%
	Tysabri	7	77.8%							2	22.2%	9	22.5%
	keine Therapie	2	33.3%	1	16.7%	1	16.7%	1	16.7%	1	16.7%	6	15.0%
	Keine Angabe	1	100.0%									1	2.5%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	18	48.6%	5	13.5%	4	10.8%	6	16.2%	4	10.8%	37	92.5%
	ja	2	66.7%	1	33.3%							3	7.5%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	4	40.0%	2	20.0%	1	10.0%	2	20.0%	1	10.0%	10	25.0%
	Zweite MS Therapie	11	68.8%	2	12.5%	2	12.5%	1	6.3%			16	40.0%
	Dritte oder mehr	2	28.6%	1	14.3%			2	28.6%	2	28.6%	7	17.5%
	Keine Angabe	3	42.9%	1	14.3%	1	14.3%	1	14.3%	1	14.3%	7	17.5%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	11	52.4%	5	23.8%			2	9.5%	3	14.3%	21	52.5%
	nein	5	41.7%	1	8.3%	3	25.0%	2	16.7%	1	8.3%	12	30.0%
	Keine Angabe	4	57.1%			1	14.3%	2	28.6%			7	17.5%

**3.40 FRAGE 32: DAUER DER ERSTTHERAPIE BIS ZUM WECHSEL AUF EIN ANDERES PRÄPARAT NACH KEY VARIABLEN I**

		32. Wie lange war die Dauer der Ersttherapie nach Diagnosestellung bis zu einem Wechsel auf ein anderes Präparat?										Total	
		Immer noch auf Erst-Therapie		1 – 12 Monate		> 1 – 3 Jahre		> 3 – 5 Jahre		> 5 Jahre		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		49	25.5%	38	19.8%	46	24.0%	18	9.4%	41	21.4%	192	100.0%
32. Wie lange war die Dauer der Ersttherapie nach Diagnosestellung bis zu einem Wechsel auf ein anderes Präparat?	Immer noch auf Erst-Therapie	49	100.0%									49	25.5%
	1 – 6 Monate			15	100.0%							15	7.8%
	> 6 – 12 Monate			23	100.0%							23	12.0%
	> 1 – 3 Jahre					46	100.0%					46	24.0%
	> 3 – 5 Jahre							18	100.0%			18	9.4%
	> 5 Jahre									41	100.0%	41	21.4%
Geschlecht:	Weiblich	36	25.0%	26	18.1%	36	25.0%	12	8.3%	34	23.6%	144	75.0%
	Männlich	12	26.1%	12	26.1%	10	21.7%	6	13.0%	6	13.0%	46	24.0%
	Keine Angabe	1	50.0%							1	50.0%	2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	13	41.9%	10	32.3%	6	19.4%	2	6.5%			31	16.1%
	31 – 40 Jahre	11	22.9%	16	33.3%	15	31.3%	1	2.1%	5	10.4%	48	25.0%
	41 – 45 Jahre	6	17.1%	5	14.3%	9	25.7%	6	17.1%	9	25.7%	35	18.2%
	über 45 Jahre	18	23.7%	7	9.2%	16	21.1%	9	11.8%	26	34.2%	76	39.6%
	Keine Angabe	1	50.0%							1	50.0%	2	1.0%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	4	25.0%	4	25.0%	2	12.5%	1	6.3%	5	31.3%	16	8.3%
	Berufslehre/ - schule	17	20.0%	16	18.8%	27	31.8%	5	5.9%	20	23.5%	85	44.3%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	15	26.8%	10	17.9%	9	16.1%	10	17.9%	12	21.4%	56	29.2%
	Universität / Fachhochschule	12	37.5%	7	21.9%	8	25.0%	2	6.3%	3	9.4%	32	16.7%
	Keine Angabe	1	33.3%	1	33.3%					1	33.3%	3	1.6%
Form der MS:	CIS	5	100.0%									5	2.6%
	RRMS	43	24.6%	35	20.0%	44	25.1%	16	9.1%	37	21.1%	175	91.1%
	SPMS	1	9.1%	3	27.3%	2	18.2%	2	18.2%	3	27.3%	11	5.7%
	Keine Angabe									1	100.0%	1	0.5%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	12	92.3%	1	7.7%							13	6.8%
	1 – 3 Jahre	18	62.1%	7	24.1%	4	13.8%					29	15.1%
	3 – 5 Jahre	6	25.0%	8	33.3%	7	29.2%	3	12.5%			24	12.5%
	5 – 10 Jahre	6	13.6%	10	22.7%	17	38.6%	7	15.9%	4	9.1%	44	22.9%
	10 – 15 Jahre	2	6.1%	6	18.2%	10	30.3%	5	15.2%	10	30.3%	33	17.2%
	> 15 Jahre	5	10.4%	6	12.5%	8	16.7%	3	6.3%	26	54.2%	48	25.0%
	Keine Angabe									1	100.0%	1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	36	33.6%	19	17.8%	25	23.4%	9	8.4%	18	16.8%	107	55.7%
	mittel	4	17.4%	4	17.4%	5	21.7%	3	13.0%	7	30.4%	23	12.0%
	schlecht/sehr schlecht	8	14.0%	15	26.3%	14	24.6%	5	8.8%	15	26.3%	57	29.7%
	Keine Angabe	1	20.0%			2	40.0%	1	20.0%	1	20.0%	5	2.6%

### 3.41 FRAGE 32: DAUER DER ERSTTHERAPIE BIS ZUM WECHSEL AUF EIN ANDERES PRÄPARAT NACH KEY VARIABLEN II

		32. Wie lange war die Dauer der Ersttherapie nach Diagnosestellung bis zu einem Wechsel auf ein anderes Präparat?										Total	
		Immer noch auf Erst-Therapie		1 - 12 Monate		> 1 - 3 Jahre		> 3 - 5 Jahre		> 5 Jahre		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		49	25.5%	38	19.8%	46	24.0%	18	9.4%	41	21.4%	192	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	8	20.5%	10	25.6%	10	25.6%	2	5.1%	9	23.1%	39	20.3%
	nein	40	26.8%	27	18.1%	36	24.2%	16	10.7%	30	20.1%	149	77.6%
	Keine Angabe	1	25.0%	1	25.0%					2	50.0%	4	2.1%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	4	100.0%									4	2.1%
	Injizierbare	22	15.2%	28	19.3%	39	26.9%	17	11.7%	39	26.9%	145	75.5%
	Gilenya	12	66.7%	4	22.2%	2	11.1%					18	9.4%
	Tecfidera	6	42.9%	4	28.6%	4	28.6%					14	7.3%
	Tysabri	4	50.0%	1	12.5%	1	12.5%	1	12.5%	1	12.5%	8	4.2%
	Andere	1	50.0%	1	50.0%							2	1.0%
	Keine Angabe									1	100.0%	1	0.5%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	42	31.1%	29	21.5%	29	21.5%	13	9.6%	22	16.3%	135	70.3%
	ja	7	12.3%	9	15.8%	17	29.8%	5	8.8%	19	33.3%	57	29.7%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	4	57.1%			1	14.3%			2	28.6%	7	3.6%
	Injizierbare	21	61.8%	1	2.9%	4	11.8%	1	2.9%	7	20.6%	34	17.7%
	Gilenya	12	20.3%	13	22.0%	19	32.2%	9	15.3%	6	10.2%	59	30.7%
	Tecfidera	5	25.0%	2	10.0%	3	15.0%			10	50.0%	20	10.4%
	Tysabri	4	7.5%	17	32.1%	15	28.3%	5	9.4%	12	22.6%	53	27.6%
	Andere			1	50.0%					1	50.0%	2	1.0%
	keine Therapie	3	20.0%	3	20.0%	4	26.7%	2	13.3%	3	20.0%	15	7.8%
	Keine Angabe			1	50.0%			1	50.0%			2	1.0%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	42	23.1%	37	20.3%	45	24.7%	18	9.9%	40	22.0%	182	94.8%
	ja	7	70.0%	1	10.0%	1	10.0%			1	10.0%	10	5.2%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	45	90.0%	2	4.0%	1	2.0%	1	2.0%	1	2.0%	50	26.0%
	Zweite MS Therapie	1	1.2%	17	21.0%	24	29.6%	12	14.8%	27	33.3%	81	42.2%
	Dritte oder mehr			16	36.4%	15	34.1%	3	6.8%	10	22.7%	44	22.9%
	Keine Angabe	3	17.6%	3	17.6%	6	35.3%	2	11.8%	3	17.6%	17	8.9%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	43	36.4%	19	16.1%	15	12.7%	10	8.5%	31	26.3%	118	61.5%
	nein	2	3.7%	17	31.5%	21	38.9%	8	14.8%	6	11.1%	54	28.1%
	Keine Angabe	4	20.0%	2	10.0%	10	50.0%			4	20.0%	20	10.4%

**3.42 FRAGE 33: GRÜNDE FÜR EINEN WECHSEL DER ERSTHTERAPIE NACH KEY VARIABLEN I**

		Wirksamkeit		Verträglichkeit / Nebenwirkungen		Art der Anwendung		Kinder/Familienplanung		Anderes		Total	
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	col%
Total		79	54.5%	67	46.2%	59	40.7%	4	2.8%	12	8.3%	145	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	62	56.9%	45	41.3%	43	39.4%	3	2.8%	11	10.1%	109	75.2%
	Männlich	17	48.6%	21	60.0%	15	42.9%	1	2.9%	1	2.9%	35	24.1%
	Keine Angabe			1	100.0%	1	100.0%					1	0.7%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	12	66.7%	10	55.6%	5	27.8%	1	5.6%	2	11.1%	18	12.4%
	31 – 40 Jahre	20	54.1%	17	45.9%	18	48.6%	3	8.1%			37	25.5%
	41 – 45 Jahre	17	58.6%	13	44.8%	11	37.9%			4	13.8%	29	20.0%
	über 45 Jahre	30	50.0%	26	43.3%	24	40.0%			6	10.0%	60	41.4%
	Keine Angabe			1	100.0%	1	100.0%					1	0.7%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	6	50.0%	5	41.7%	3	25.0%			1	8.3%	12	8.3%
	Berufslehre/ - schule	36	51.4%	32	45.7%	32	45.7%	1	1.4%	7	10.0%	70	48.3%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	23	56.1%	20	48.8%	17	41.5%			4	9.8%	41	28.3%
	Universität / Fachhochschule	13	65.0%	8	40.0%	5	25.0%	2	10.0%			20	13.8%
	Keine Angabe	1	50.0%	2	100.0%	2	100.0%	1	50.0%			2	1.4%
Form der MS:	RRMS	74	55.2%	62	46.3%	53	39.6%	3	2.2%	11	8.2%	134	92.4%
	SPMS	5	50.0%	4	40.0%	5	50.0%	1	10.0%	1	10.0%	10	6.9%
	Keine Angabe			1	100.0%	1	100.0%					1	0.7%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%					1	0.7%
	1 – 3 Jahre	8	72.7%	5	45.5%	3	27.3%	2	18.2%	2	18.2%	11	7.6%
	3 – 5 Jahre	10	55.6%	9	50.0%	8	44.4%			1	5.6%	18	12.4%
	5 – 10 Jahre	24	63.2%	16	42.1%	14	36.8%	1	2.6%	2	5.3%	38	26.2%
	10 – 15 Jahre	16	51.6%	12	38.7%	11	35.5%			3	9.7%	31	21.4%
	> 15 Jahre	20	44.4%	23	51.1%	21	46.7%	1	2.2%	4	8.9%	45	31.0%
	Keine Angabe			1	100.0%	1	100.0%					1	0.7%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	36	50.0%	30	41.7%	30	41.7%	4	5.6%	6	8.3%	72	49.7%
	mittel	8	42.1%	10	52.6%	6	31.6%			5	26.3%	19	13.1%
	schlecht/sehr schlecht	32	64.0%	26	52.0%	20	40.0%			1	2.0%	50	34.5%
	Keine Angabe	3	75.0%	1	25.0%	3	75.0%					4	2.8%

### 3.43 FRAGE 33: GRÜNDE FÜR EINEN WECHSEL DER ERSTHTHERAPIE NACH KEY VARIABLEN II

1 = sehr gut - 5 = sehr schlecht		Wirksamkeit		Verträglichkeit / Nebenwirkungen		Art der Anwendung		Kinder/Familienplanun g		Anderes		Total	
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	col%
Total		79	54.5%	67	46.2%	59	40.7%	4	2.8%	12	8.3%	145	100.0%
Zweitmeinung bei	ja	18	56.3%	18	56.3%	16	50.0%	1	3.1%	4	12.5%	32	22.1%
Diagnose:	nein	60	54.5%	48	43.6%	41	37.3%	3	2.7%	7	6.4%	110	75.9%
	Keine Angabe	1	33.3%	1	33.3%	2	66.7%			1	33.3%	3	2.1%
Therapieentscheid bei	Injizierbare	64	51.2%	60	48.0%	56	44.8%	3	2.4%	10	8.0%	125	86.2%
Erstdiagnose:	Gilenya	3	50.0%	1	16.7%	1	16.7%	1	16.7%	1	16.7%	6	4.1%
	Tecfidera	7	87.5%	4	50.0%					1	12.5%	8	5.5%
	Tysabri	3	75.0%	1	25.0%	1	25.0%					4	2.8%
	Andere	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%					1	0.7%
	Keine Angabe	1	100.0%									1	0.7%
Rebif bei	nein	54	57.4%	41	43.6%	36	38.3%	3	3.2%	6	6.4%	94	64.8%
Erstdiagnose:	ja	25	49.0%	26	51.0%	23	45.1%	1	2.0%	6	11.8%	51	35.2%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio			2	66.7%	3	100.0%			1	33.3%	3	2.1%
	Injizierbare	3	21.4%	7	50.0%	7	50.0%	1	7.1%	2	14.3%	14	9.7%
	Gilenya	26	55.3%	19	40.4%	21	44.7%			4	8.5%	47	32.4%
	Tecfidera	5	33.3%	11	73.3%	9	60.0%	2	13.3%	1	6.7%	15	10.3%
	Tysabri	39	78.0%	18	36.0%	12	24.0%	1	2.0%	2	4.0%	50	34.5%
	Andere	1	50.0%			1	50.0%					2	1.4%
	keine Therapie	4	33.3%	9	75.0%	4	33.3%			2	16.7%	12	8.3%
	Keine Angabe	1	50.0%	1	50.0%	2	100.0%					2	1.4%
Rebif ist aktuelle	nein	79	55.6%	65	45.8%	58	40.8%	4	2.8%	12	8.5%	142	97.9%
Behandlung:	ja			2	66.7%	1	33.3%					3	2.1%
Anzahl MS Langzeit-	Erste MS Therapie	4	80.0%	1	20.0%	4	80.0%					5	3.4%
Therapien:	Zweite MS Therapie	42	51.9%	38	46.9%	34	42.0%	3	3.7%	7	8.6%	81	55.9%
	Dritte oder mehr	26	59.1%	19	43.2%	16	36.4%	1	2.3%	3	6.8%	44	30.3%
	Keine Angabe	7	46.7%	9	60.0%	5	33.3%			2	13.3%	15	10.3%
Rückblickend gleiche	ja	39	51.3%	25	32.9%	31	40.8%	2	2.6%	6	7.9%	76	52.4%
Therapie:	nein	29	55.8%	32	61.5%	21	40.4%	2	3.8%	4	7.7%	52	35.9%
	Keine Angabe	11	64.7%	10	58.8%	7	41.2%			2	11.8%	17	11.7%

### 3.44 FRAGE 33: LISTING DER GRÜNDE FÜR EINEN WECHSEL DER ERSTHTERAPIE FÜR REBIF

	Case ID	Rebif bei Erstdiagnose:	Wirksamkeit	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	Art der Anwendung	Kinder/Familienplanung	Anderes	Keine Angabe
1	03-026	ja	.	.	Art der Anwendung	.	.	.
2	03-034	ja	Wirksamkeit	.	Art der Anwendung	.	.	.
3	03-036	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	Art der Anwendung	.	.	.
4	05-021	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	Art der Anwendung	.	Anderes	.
5	05-024	ja	.	.	.	.	.	.
6	05-034	ja	.	.	Art der Anwendung	.	.	.
7	05-038	ja	.	.	.	.	.	.
8	05-062	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	Art der Anwendung	.	.	.
9	05-077	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	.	.	.
10	05-100	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	.	.	.
11	06-012	ja	Wirksamkeit	.	Art der Anwendung	.	.	.
12	06-016	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	.	.	.
13	06-026	ja	Wirksamkeit	.	.	.	.	.
14	09-076	ja	Wirksamkeit	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	Art der Anwendung	.	.	.
15	09-093	ja	Wirksamkeit	.	.	.	.	.
16	10-006	ja	.	.	Art der Anwendung	.	.	.
17	10-007	ja	Wirksamkeit	.	.	.	.	.
18	10-008	ja	Wirksamkeit	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	.	.	.
19	10-009	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	.	.	.
20	10-012	ja	Wirksamkeit	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	.	Anderes	.
21	10-020	ja	Wirksamkeit	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	Art der Anwendung	.	.	.
22	10-021	ja	.	.	.	.	.	Keine Angabe
23	12-004	ja	Wirksamkeit	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	.	.	.
24	12-006	ja	.	.	Art der Anwendung	.	.	.
25	12-007	ja	.	.	.	.	.	.
26	12-015	ja	Wirksamkeit	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	Art der Anwendung	.	.	.
27	12-027	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	.	.	.
28	12-028	ja	.	.	.	.	.	.
29	12-036	ja	Wirksamkeit	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	.	.	.
30	12-038	ja	.	.	Art der Anwendung	.	.	.
31	14-076	ja	.	.	.	.	.	.
32	14-080	ja	Wirksamkeit	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	.	.	.
33	14-083	ja	Wirksamkeit	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	.	.	.
34	15-005	ja	.	.	.	.	.	.
35	15-006	ja	Wirksamkeit	.	.	.	.	.

### 3.44 FRAGE 33: LISTING DER GRÜNDE FÜR EINEN WECHSEL DER ERSTHTERAPIE FÜR REBIF

	Case ID	Rebif bei Erstdiagnose:	Wirksamkeit	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	Art der Anwendung	Kinder/Familienplanung	Anderes	Keine Angabe
36	15-008	ja	.	.	.	.	.	Keine Angabe
37	15-009	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	.	.	
38	16-004	ja	Wirksamkeit	.	Art der Anwendung	.	.	
39	16-005	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	Kinder/Familienplanung	.	.
40	16-006	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	Art der Anwendung		.	.
41	23-005	ja	Wirksamkeit	.	.		.	.
42	23-008	ja	Wirksamkeit	.	.	.	.	.
43	23-009	ja	Wirksamkeit	.	.	.	.	.
44	23-011	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	.	Anderes	.
45	23-013	ja	.	.	.	.	Anderes	.
46	23-017	ja	Wirksamkeit	.	.	.	.	.
47	23-019	ja	.	.	Art der Anwendung	.	.	.
48	23-024	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	.	.	.	.
49	24-003	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	Art der Anwendung	.	Anderes	.
50	24-005	ja	.	.	Art der Anwendung	.	.	.
51	24-009	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	Art der Anwendung	.	.	.
52	24-010	ja	Wirksamkeit	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	Art der Anwendung	.	.	.
53	24-012	ja	Wirksamkeit	.	Art der Anwendung	.	.	.
54	24-014	ja	.	.	.	.	.	.
55	24-016	ja	Wirksamkeit	.	.	.	.	.
56	24-021	ja	.	.	Art der Anwendung	.	.	.
57	24-024	ja	.	Verträglichkeit / Nebenwirkungen	Art der Anwendung	.	.	.
58	25-001	ja	Wirksamkeit	.	.	.	.	.
59	25-032	ja	.	.	.	.	Anderes	.
60	27-026	ja	Wirksamkeit	.	.	.	.	.
Total	N	60	60	25	26	23	1	6
								2



**3.45 FRAGE 34: WIE OFT SEHEN SIE IHREN BEHANDELNDEN NEUROLOGEN NACH KEY VARIABLEN I**

		34. Wie oft sehen sie Ihren behandelnden Neurologen?										Total	
		Weniger als 1 mal pro Jahr		1 mal pro Jahr		2 mal pro Jahr		Mehr als 2 mal pro Jahr		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		3	1.4%	62	29.8%	51	24.5%	80	38.5%	12	5.8%	208	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	3	2.0%	46	30.3%	34	22.4%	62	40.8%	7	4.6%	152	73.1%
	Männlich			15	27.8%	17	31.5%	17	31.5%	5	9.3%	54	26.0%
	Keine Angabe			1	50.0%			1	50.0%			2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	1	3.1%	10	31.3%	5	15.6%	13	40.6%	3	9.4%	32	15.4%
	31 – 40 Jahre			14	25.9%	10	18.5%	26	48.1%	4	7.4%	54	26.0%
	41 – 45 Jahre	1	2.7%	11	29.7%	9	24.3%	15	40.5%	1	2.7%	37	17.8%
	über 45 Jahre	1	1.2%	26	31.3%	27	32.5%	25	30.1%	4	4.8%	83	39.9%
	Keine Angabe			1	50.0%			1	50.0%			2	1.0%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre			6	35.3%	5	29.4%	6	35.3%			17	8.2%
	Berufslehre/ - schule	1	1.0%	27	27.8%	21	21.6%	41	42.3%	7	7.2%	97	46.6%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung			20	34.5%	15	25.9%	18	31.0%	5	8.6%	58	27.9%
	Universität / Fachhochschule	2	6.1%	8	24.2%	9	27.3%	14	42.4%			33	15.9%
	Keine Angabe			1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%			3	1.4%
Form der MS:	CIS					1	20.0%	2	40.0%	2	40.0%	5	2.4%
	RRMS	3	1.6%	57	30.5%	45	24.1%	73	39.0%	9	4.8%	187	89.9%
	SPMS			4	28.6%	4	28.6%	5	35.7%	1	7.1%	14	6.7%
	Keine Angabe			1	50.0%	1	50.0%					2	1.0%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	1	5.9%	1	5.9%	1	5.9%	8	47.1%	6	35.3%	17	8.2%
	1 – 3 Jahre			10	35.7%	6	21.4%	11	39.3%	1	3.6%	28	13.5%
	3 – 5 Jahre			11	39.3%	7	25.0%	8	28.6%	2	7.1%	28	13.5%
	5 – 10 Jahre	1	2.2%	14	31.1%	15	33.3%	15	33.3%			45	21.6%
	10 – 15 Jahre			10	29.4%	5	14.7%	18	52.9%	1	2.9%	34	16.3%
	> 15 Jahre	1	1.8%	15	27.3%	17	30.9%	20	36.4%	2	3.6%	55	26.4%
	Keine Angabe			1	100.0%							1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	2	1.7%	38	32.8%	27	23.3%	42	36.2%	7	6.0%	116	55.8%
	mittel			5	19.2%	11	42.3%	9	34.6%	1	3.8%	26	12.5%
	schlecht/sehr schlecht			19	31.1%	12	19.7%	27	44.3%	3	4.9%	61	29.3%
	Keine Angabe	1	20.0%			1	20.0%	2	40.0%	1	20.0%	5	2.4%

**3.46 FRAGE 34: WIE OFT SEHEN SIE IHREN BEHANDELNDEN NEUROLOGEN NACH KEY VARIABLEN II**

		34. Wie oft sehen sie Ihren behandelnden Neurologen?										Total	
		Weniger als 1 mal pro Jahr		1 mal pro Jahr		2 mal pro Jahr		Mehr als 2 mal pro Jahr		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		3	1.4%	62	29.8%	51	24.5%	80	38.5%	12	5.8%	208	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	1	2.4%	15	36.6%	11	26.8%	14	34.1%			41	19.7%
	nein	2	1.3%	47	29.9%	39	24.8%	63	40.1%	6	3.8%	157	75.5%
	Keine Angabe					1	10.0%	3	30.0%	6	60.0%	10	4.8%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio			3	75.0%	1	25.0%					4	1.9%
	Injizierbare	2	1.3%	47	31.3%	39	26.0%	57	38.0%	5	3.3%	150	72.1%
	Gilenya			7	31.8%	7	31.8%	6	27.3%	2	9.1%	22	10.6%
	Tecfidera	1	7.1%	3	21.4%	3	21.4%	7	50.0%			14	6.7%
	Tysabri			1	10.0%	1	10.0%	7	70.0%	1	10.0%	10	4.8%
	Andere			1	25.0%			1	25.0%	2	50.0%	4	1.9%
	Keine Angabe							2	50.0%	2	50.0%	4	1.9%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	2	1.4%	48	32.4%	33	22.3%	55	37.2%	10	6.8%	148	71.2%
	ja	1	1.7%	14	23.3%	18	30.0%	25	41.7%	2	3.3%	60	28.8%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio			4	50.0%	3	37.5%			1	12.5%	8	3.8%
	Injizierbare			19	50.0%	9	23.7%	7	18.4%	3	7.9%	38	18.3%
	Gilenya	1	1.6%	21	32.8%	22	34.4%	17	26.6%	3	4.7%	64	30.8%
	Tecfidera	2	10.0%	11	55.0%	3	15.0%	4	20.0%			20	9.6%
	Tysabri			2	3.6%	7	12.5%	46	82.1%	1	1.8%	56	26.9%
	Andere					1	50.0%	1	50.0%			2	1.0%
	keine Therapie			4	22.2%	5	27.8%	5	27.8%	4	22.2%	18	8.7%
	Keine Angabe			1	50.0%	1	50.0%					2	1.0%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	3	1.5%	58	29.6%	45	23.0%	79	40.3%	11	5.6%	196	94.2%
	ja			4	33.3%	6	50.0%	1	8.3%	1	8.3%	12	5.8%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	1	1.8%	24	43.6%	15	27.3%	11	20.0%	4	7.3%	55	26.4%
	Zweite MS Therapie	1	1.2%	23	27.4%	20	23.8%	38	45.2%	2	2.4%	84	40.4%
	Dritte oder mehr			11	22.9%	11	22.9%	24	50.0%	2	4.2%	48	23.1%
	Keine Angabe	1	4.8%	4	19.0%	5	23.8%	7	33.3%	4	19.0%	21	10.1%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	2	1.6%	45	35.4%	35	27.6%	39	30.7%	6	4.7%	127	61.1%
	nein			13	23.2%	12	21.4%	30	53.6%	1	1.8%	56	26.9%
	Keine Angabe	1	4.0%	4	16.0%	4	16.0%	11	44.0%	5	20.0%	25	12.0%

### 3.47 FRAGE 35: EINFLUSS DER FOLGENDEN FAKTOREN AUF DIE THERAPIETREUE

1 = kein Beitrag - 5 = starker Beitrag

	Auswertbare Fragebogen							
	ja							
	Valid N	Mean	Standard Deviation	Median	Minimum	Percentile 25	Percentile 75	Maximum
Behandelnder Neurologe/ Behandelnde Neurologin	192	4.4	1.1	5.0	1.0	4.0	5.0	5.0
Therapiebegleitung (MS Nurse/MS Pflegefachperson)	141	3.0	1.6	3.0	1.0	1.0	5.0	5.0
Familie / Freunde	174	3.6	1.5	4.0	1.0	3.0	5.0	5.0
Wirksamkeit der Medikation (keine MS Symptome)	180	4.7	0.7	5.0	1.0	5.0	5.0	5.0
Eigenmotivation	176	4.4	1.0	5.0	1.0	4.0	5.0	5.0
Fortbildungsseminare	141	2.3	1.3	2.0	1.0	1.0	3.0	5.0
Internet-Foren	144	2.2	1.3	2.0	1.0	1.0	3.0	5.0

**3.48 FRAGE 36: HÄUFIGKEIT DER BEHANDLUNG SEIT DER DIAGNOSESTELLUNG NACH KEY VARIABLEN I**

		36. Wie lange waren Sie seit der Diagnosestellung ungefähr mit MS-Langzeittherapie behandelt?								Total	
		Ich war immer unter Behandlung (>75-100%)		Ich war nicht immer unter Behandlung (<75%)		Ich war nie in Behandlung		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		149	71.3%	44	21.1%	2	1.0%	14	6.7%	209	100.0%
36. Wie lange waren Sie seit der Diagnosestellung ungefähr mit MS-Langzeittherapie behandelt?	Ich war immer unter Behandlung (>75-100%)	149	100.0%							149	71.3%
	Ich war meistens unter Behandlung (>50-75%)			29	100.0%					29	13.9%
	Ich war öfters unter Behandlung (>25-50%)			6	100.0%					6	2.9%
	Ich war selten unter Behandlung (1-25%)			9	100.0%					9	4.3%
	Ich war nie in Behandlung					2	100.0%			2	1.0%
	Keine Angabe							14	100.0%	14	6.7%
Geschlecht:	Weiblich	109	71.2%	37	24.2%	2	1.3%	5	3.3%	153	73.2%
	Männlich	39	72.2%	7	13.0%			8	14.8%	54	25.8%
	Keine Angabe	1	50.0%					1	50.0%	2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	28	84.8%	2	6.1%			3	9.1%	33	15.8%
	31 – 40 Jahre	33	61.1%	14	25.9%	2	3.7%	5	9.3%	54	25.8%
	41 – 45 Jahre	25	67.6%	11	29.7%			1	2.7%	37	17.7%
	über 45 Jahre	62	74.7%	17	20.5%			4	4.8%	83	39.7%
	Keine Angabe	1	50.0%					1	50.0%	2	1.0%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	14	82.4%	2	11.8%			1	5.9%	17	8.1%
	Berufslehre/ - schule	66	68.0%	23	23.7%			8	8.2%	97	46.4%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	44	74.6%	11	18.6%	1	1.7%	3	5.1%	59	28.2%
	Universität / Fachhochschule	23	69.7%	8	24.2%	1	3.0%	1	3.0%	33	15.8%
	Keine Angabe	2	66.7%					1	33.3%	3	1.4%
Form der MS:	CIS	4	80.0%					1	20.0%	5	2.4%
	RRMS	139	73.9%	36	19.1%	2	1.1%	11	5.9%	188	90.0%
	SPMS	6	42.9%	7	50.0%			1	7.1%	14	6.7%
	Keine Angabe			1	50.0%			1	50.0%	2	1.0%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	10	58.8%	2	11.8%	1	5.9%	4	23.5%	17	8.1%
	1 – 3 Jahre	22	75.9%	4	13.8%	1	3.4%	2	6.9%	29	13.9%
	3 – 5 Jahre	23	82.1%	3	10.7%			2	7.1%	28	13.4%
	5 – 10 Jahre	36	80.0%	7	15.6%			2	4.4%	45	21.5%
	10 – 15 Jahre	24	70.6%	10	29.4%					34	16.3%
	> 15 Jahre	34	61.8%	18	32.7%			3	5.5%	55	26.3%
	Keine Angabe							1	100.0%	1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	89	76.1%	18	15.4%	2	1.7%	8	6.8%	117	56.0%
	mittel	12	46.2%	12	46.2%			2	7.7%	26	12.4%
	schlecht/sehr schlecht	43	70.5%	14	23.0%			4	6.6%	61	29.2%
	Keine Angabe	5	100.0%							5	2.4%

### 3.49 FRAGE 36: HÄUFIGKEIT DER BEHANDLUNG SEIT DER DIAGNOSESTELLUNG NACH KEY VARIABLEN II

		36. Wie lange waren Sie seit der Diagnosestellung ungefähr mit MS-Langzeittherapie behandelt?								Total	
		Ich war immer unter Behandlung (>75-100%)		Ich war nicht immer unter Behandlung (< 75%)		Ich war nie in Behandlung		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		149	71.3%	44	21.1%	2	1.0%	14	6.7%	209	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	28	68.3%	10	24.4%			3	7.3%	41	19.6%
	nein	118	74.7%	31	19.6%	2	1.3%	7	4.4%	158	75.6%
	Keine Angabe	3	30.0%	3	30.0%			4	40.0%	10	4.8%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	3	75.0%	1	25.0%					4	1.9%
	Injizierbare	112	74.2%	32	21.2%			7	4.6%	151	72.2%
	Gilenya	16	72.7%	3	13.6%	1	4.5%	2	9.1%	22	10.5%
	Tecfidera	9	64.3%	3	21.4%	1	7.1%	1	7.1%	14	6.7%
	Tysabri	7	70.0%	3	30.0%					10	4.8%
	Andere	1	25.0%	1	25.0%			2	50.0%	4	1.9%
	Keine Angabe	1	25.0%	1	25.0%			2	50.0%	4	1.9%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	108	72.5%	29	19.5%	2	1.3%	10	6.7%	149	71.3%
	ja	41	68.3%	15	25.0%			4	6.7%	60	28.7%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	6	75.0%	1	12.5%			1	12.5%	8	3.8%
	Injizierbare	33	84.6%	4	10.3%			2	5.1%	39	18.7%
	Gilenya	47	73.4%	12	18.8%	1	1.6%	4	6.3%	64	30.6%
	Tecfidera	13	65.0%	5	25.0%			2	10.0%	20	9.6%
	Tysabri	43	76.8%	11	19.6%			2	3.6%	56	26.8%
	Andere	2	100.0%							2	1.0%
	keine Therapie	3	16.7%	11	61.1%	1	5.6%	3	16.7%	18	8.6%
	Keine Angabe	2	100.0%							2	1.0%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	138	70.1%	44	22.3%	2	1.0%	13	6.6%	197	94.3%
	ja	11	91.7%					1	8.3%	12	5.7%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	45	80.4%	6	10.7%	1	1.8%	4	7.1%	56	26.8%
	Zweite MS Therapie	65	77.4%	15	17.9%			4	4.8%	84	40.2%
	Dritte oder mehr	35	72.9%	11	22.9%			2	4.2%	48	23.0%
	Keine Angabe	4	19.0%	12	57.1%	1	4.8%	4	19.0%	21	10.0%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	98	76.6%	21	16.4%	2	1.6%	7	5.5%	128	61.2%
	nein	37	66.1%	19	33.9%					56	26.8%
	Keine Angabe	14	56.0%	4	16.0%			7	28.0%	25	12.0%

### 3.50 FRAGE 37: GLEICHER THERAPIEENTSCHEID IM RÜCKBLICK NACH KEY VARIABLEN I

		37. Würden Sie sich rückblickend für die gleiche MS-Langzeittherapie nach Ihrer Erst-Diagnose entscheiden?						Total	
		Ja		Nein		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%		
Total		128	60.4%	56	26.4%	28	13.2%	212	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	94	60.6%	43	27.7%	18	11.6%	155	73.1%
	Männlich	32	58.2%	13	23.6%	10	18.2%	55	25.9%
	Keine Angabe	2	100.0%					2	0.9%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	16	48.5%	14	42.4%	3	9.1%	33	15.6%
	31 – 40 Jahre	33	58.9%	14	25.0%	9	16.1%	56	26.4%
	41 – 45 Jahre	18	48.6%	13	35.1%	6	16.2%	37	17.5%
	über 45 Jahre	59	70.2%	15	17.9%	10	11.9%	84	39.6%
	Keine Angabe	2	100.0%					2	0.9%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	12	70.6%	4	23.5%	1	5.9%	17	8.0%
	Berufslehre/ - schule	50	51.0%	32	32.7%	16	16.3%	98	46.2%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	39	65.0%	12	20.0%	9	15.0%	60	28.3%
	Universität / Fachhochschule	25	73.5%	7	20.6%	2	5.9%	34	16.0%
	Keine Angabe	2	66.7%	1	33.3%			3	1.4%
Form der MS:	CIS	4	80.0%			1	20.0%	5	2.4%
	RRMS	113	59.5%	53	27.9%	24	12.6%	190	89.6%
	SPMS	9	60.0%	3	20.0%	3	20.0%	15	7.1%
	Keine Angabe	2	100.0%					2	0.9%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	12	66.7%	3	16.7%	3	16.7%	18	8.5%
	1 – 3 Jahre	18	62.1%	8	27.6%	3	10.3%	29	13.7%
	3 – 5 Jahre	17	60.7%	9	32.1%	2	7.1%	28	13.2%
	5 – 10 Jahre	23	51.1%	14	31.1%	8	17.8%	45	21.2%
	10 – 15 Jahre	23	65.7%	10	28.6%	2	5.7%	35	16.5%
	> 15 Jahre	34	60.7%	12	21.4%	10	17.9%	56	26.4%
	Keine Angabe	1	100.0%					1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	80	67.8%	24	20.3%	14	11.9%	118	55.7%
	mittel	15	57.7%	11	42.3%			26	12.3%
	schlecht/sehr schlecht	31	49.2%	20	31.7%	12	19.0%	63	29.7%
	Keine Angabe	2	40.0%	1	20.0%	2	40.0%	5	2.4%

### 3.51 FRAGE 37: GLEICHER THERAPIEENTSCHEID IM RÜCKBLICK NACH KEY VARIABLEN II

		37. Würden Sie sich rückblickend für die gleiche MS-Langzeittherapie nach Ihrer Erst-Diagnose entscheiden?						Total	
		Ja		Nein		Keine Angabe		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%		
Total		128	60.4%	56	26.4%	28	13.2%	212	100.0%
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	22	53.7%	12	29.3%	7	17.1%	41	19.3%
	nein	103	65.2%	41	25.9%	14	8.9%	158	74.5%
	Keine Angabe	3	23.1%	3	23.1%	7	53.8%	13	6.1%
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	4	100.0%					4	1.9%
	Injizierbare	86	57.0%	45	29.8%	20	13.2%	151	71.2%
	Gilenya	18	81.8%	1	4.5%	3	13.6%	22	10.4%
	Tecfidera	7	50.0%	7	50.0%			14	6.6%
	Tysabri	9	90.0%	1	10.0%			10	4.7%
	Andere	2	50.0%	1	25.0%	1	25.0%	4	1.9%
	Keine Angabe	2	28.6%	1	14.3%	4	57.1%	7	3.3%
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	99	65.1%	35	23.0%	18	11.8%	152	71.7%
	ja	29	48.3%	21	35.0%	10	16.7%	60	28.3%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	5	62.5%			3	37.5%	8	3.8%
	Injizierbare	34	87.2%	2	5.1%	3	7.7%	39	18.4%
	Gilenya	35	54.7%	21	32.8%	8	12.5%	64	30.2%
	Tecfidera	15	75.0%	5	25.0%			20	9.4%
	Tysabri	30	52.6%	18	31.6%	9	15.8%	57	26.9%
	Andere	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	3	1.4%
	keine Therapie	6	31.6%	9	47.4%	4	21.1%	19	9.0%
	Keine Angabe	2	100.0%					2	0.9%
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	117	58.5%	55	27.5%	28	14.0%	200	94.3%
	ja	11	91.7%	1	8.3%			12	5.7%
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	49	84.5%	2	3.4%	7	12.1%	58	27.4%
	Zweite MS Therapie	49	58.3%	26	31.0%	9	10.7%	84	39.6%
	Dritte oder mehr	24	50.0%	18	37.5%	6	12.5%	48	22.6%
	Keine Angabe	6	27.3%	10	45.5%	6	27.3%	22	10.4%
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	128	100.0%					128	60.4%
	nein			56	100.0%			56	26.4%
	Keine Angabe					28	100.0%	28	13.2%

### 3.52 FRAGE 38: ZUFRIEDENHEIT MIT DER MOMENTANEN THERAPIEWahl NACH KEY VARIABLEN I

1 = sehr zufrieden - 5 = überhaupt nicht zufrieden		38. Wie sehr sind Sie mit momentanen Therapiewahl zufrieden?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		111	58.4%	35	18.4%	27	14.2%	10	5.3%	7	3.7%	190	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	83	59.3%	27	19.3%	19	13.6%	7	5.0%	4	2.9%	140	73.7%
	Männlich	27	56.3%	8	16.7%	7	14.6%	3	6.3%	3	6.3%	48	25.3%
	Keine Angabe	1	50.0%			1	50.0%					2	1.1%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	17	54.8%	7	22.6%	5	16.1%	1	3.2%	1	3.2%	31	16.3%
	31 - 40 Jahre	27	58.7%	9	19.6%	6	13.0%	2	4.3%	2	4.3%	46	24.2%
	41 - 45 Jahre	21	61.8%	5	14.7%	2	5.9%	3	8.8%	3	8.8%	34	17.9%
	über 45 Jahre	45	58.4%	14	18.2%	13	16.9%	4	5.2%	1	1.3%	77	40.5%
	Keine Angabe	1	50.0%			1	50.0%					2	1.1%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	10	66.7%	4	26.7%	1	6.7%					15	7.9%
	Berufslehre/ - schule	53	61.6%	11	12.8%	15	17.4%	6	7.0%	1	1.2%	86	45.3%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	31	55.4%	12	21.4%	6	10.7%	3	5.4%	4	7.1%	56	29.5%
	Universität / Fachhochschule	16	53.3%	8	26.7%	3	10.0%	1	3.3%	2	6.7%	30	15.8%
	Keine Angabe	1	33.3%			2	66.7%					3	1.6%
Form der MS:	CIS			2	66.7%	1	33.3%					3	1.6%
	RRMS	105	60.0%	33	18.9%	21	12.0%	9	5.1%	7	4.0%	175	92.1%
	SPMS	5	50.0%			4	40.0%	1	10.0%			10	5.3%
	Keine Angabe	1	50.0%			1	50.0%					2	1.1%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	5	38.5%	4	30.8%	3	23.1%			1	7.7%	13	6.8%
	1 - 3 Jahre	16	55.2%	6	20.7%	3	10.3%	3	10.3%	1	3.4%	29	15.3%
	3 - 5 Jahre	17	68.0%	5	20.0%	2	8.0%	1	4.0%			25	13.2%
	5 - 10 Jahre	28	65.1%	7	16.3%	5	11.6%	2	4.7%	1	2.3%	43	22.6%
	10 - 15 Jahre	17	54.8%	4	12.9%	6	19.4%	2	6.5%	2	6.5%	31	16.3%
	> 15 Jahre	28	58.3%	9	18.8%	7	14.6%	2	4.2%	2	4.2%	48	25.3%
	Keine Angabe					1	100.0%					1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	70	66.0%	18	17.0%	12	11.3%	3	2.8%	3	2.8%	106	55.8%
	mittel	10	43.5%	6	26.1%	3	13.0%	2	8.7%	2	8.7%	23	12.1%
	schlecht/sehr schlecht	28	49.1%	10	17.5%	12	21.1%	5	8.8%	2	3.5%	57	30.0%
	Keine Angabe	3	75.0%	1	25.0%							4	2.1%



### 3.53 FRAGE 38: ZUFRIEDENHEIT MIT DER MOMENTANEN THERAPIEWAHL NACH KEY VARIABLEN II

1 = sehr zufrieden - 5 = überhaupt nicht zufrieden		38. Wie sehr sind Sie mit momentanen Therapiewahl zufrieden?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		111	58.4%	35	18.4%	27	14.2%	10	5.3%	7	3.7%	190	100.0%
Zweitmeinung bei	ja	19	52.8%	9	25.0%	5	13.9%	2	5.6%	1	2.8%	36	18.9%
Diagnose:	nein	90	60.8%	25	16.9%	20	13.5%	7	4.7%	6	4.1%	148	77.9%
	Keine Angabe	2	33.3%	1	16.7%	2	33.3%	1	16.7%			6	3.2%
Therapieentscheid bei	Aubagio	4	100.0%									4	2.1%
Erstdiagnose:	Injizierbare	75	54.0%	27	19.4%	24	17.3%	7	5.0%	6	4.3%	139	73.2%
	Gilenya	14	73.7%	4	21.1%			1	5.3%			19	10.0%
	Tecfidera	7	53.8%	2	15.4%	1	7.7%	2	15.4%	1	7.7%	13	6.8%
	Tysabri	6	66.7%	2	22.2%	1	11.1%					9	4.7%
	Andere	2	66.7%			1	33.3%					3	1.6%
	Keine Angabe	3	100.0%									3	1.6%
Rebif bei	nein	80	58.0%	26	18.8%	20	14.5%	7	5.1%	5	3.6%	138	72.6%
Erstdiagnose:	ja	31	59.6%	9	17.3%	7	13.5%	3	5.8%	2	3.8%	52	27.4%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	6	85.7%							1	14.3%	7	3.7%
	Injizierbare	14	37.8%	10	27.0%	9	24.3%	3	8.1%	1	2.7%	37	19.5%
	Gilenya	36	59.0%	11	18.0%	8	13.1%	4	6.6%	2	3.3%	61	32.1%
	Tecfidera	12	63.2%	3	15.8%	3	15.8%			1	5.3%	19	10.0%
	Tysabri	35	64.8%	10	18.5%	5	9.3%	2	3.7%	2	3.7%	54	28.4%
	Andere	2	100.0%									2	1.1%
	keine Therapie	4	50.0%	1	12.5%	2	25.0%	1	12.5%			8	4.2%
	Keine Angabe	2	100.0%									2	1.1%
Rebif ist aktuelle	nein	106	59.2%	32	17.9%	25	14.0%	9	5.0%	7	3.9%	179	94.2%
Behandlung:	ja	5	45.5%	3	27.3%	2	18.2%	1	9.1%			11	5.8%
Anzahl MS Langzeit-	Erste MS Therapie	34	63.0%	8	14.8%	7	13.0%	3	5.6%	2	3.7%	54	28.4%
Therapien:	Zweite MS Therapie	50	61.7%	14	17.3%	11	13.6%	3	3.7%	3	3.7%	81	42.6%
	Dritte oder mehr	23	51.1%	11	24.4%	6	13.3%	3	6.7%	2	4.4%	45	23.7%
	Keine Angabe	4	40.0%	2	20.0%	3	30.0%	1	10.0%			10	5.3%
Rückblickend gleiche	ja	75	60.5%	22	17.7%	16	12.9%	4	3.2%	7	5.6%	124	65.3%
Therapie:	nein	26	53.1%	10	20.4%	8	16.3%	5	10.2%			49	25.8%
	Keine Angabe	10	58.8%	3	17.6%	3	17.6%	1	5.9%			17	8.9%

### 3.54 FRAGE 38: ZUFRIEDENHEIT (KENNZAHLEN) MIT DER MOMENTANEN THERAPIEWAHL NACH KEY VARIABLEN I

1 = sehr zufrieden - 5: überhaupt nicht zufrieden		38. Wie sehr sind Sie mit momentanen Therapiewahl zufrieden?							
		Count	Mean	Median	Std Deviation	Minimum	Lower quartile	Upper quartile	Maximum
Total		N=190	1.8	1.0	1.11	1	1.0	2.0	5
Geschlecht:	Weiblich	N=140	1.7	1.0	1.06	1	1.0	2.0	5
	Männlich	N=48	1.9	1.0	1.24	1	1.0	3.0	5
	Keine Angabe	N=2	2.0	2.0	1.41	1	1.0		3
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	N=31	1.8	1.0	1.06	1	1.0	2.0	5
	31 – 40 Jahre	N=46	1.8	1.0	1.12	1	1.0	2.0	5
	41 – 45 Jahre	N=34	1.9	1.0	1.37	1	1.0	2.3	5
	über 45 Jahre	N=77	1.7	1.0	1.01	1	1.0	2.0	5
	Keine Angabe	N=2	2.0	2.0	1.41	1	1.0		3
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	N=15	1.4	1.0	0.63	1	1.0	2.0	3
	Berufslehre/ - schule	N=86	1.7	1.0	1.06	1	1.0	3.0	5
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	N=56	1.9	1.0	1.24	1	1.0	2.0	5
	Universität / Fachhochschule	N=30	1.8	1.0	1.18	1	1.0	2.0	5
	Keine Angabe	N=3	2.3	3.0	1.15	1	1.0		3
Form der MS:	CIS	N=3	2.3	2.0	0.58	2	2.0		3
	RRMS	N=175	1.7	1.0	1.11	1	1.0	2.0	5
	SPMS	N=10	2.1	2.0	1.20	1	1.0	3.0	4
	Keine Angabe	N=2	2.0	2.0	1.41	1	1.0		3
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	N=13	2.1	2.0	1.19	1	1.0	3.0	5
	1 – 3 Jahre	N=29	1.9	1.0	1.19	1	1.0	2.5	5
	3 – 5 Jahre	N=25	1.5	1.0	0.82	1	1.0	2.0	4
	5 – 10 Jahre	N=43	1.6	1.0	1.02	1	1.0	2.0	5
	10 – 15 Jahre	N=31	2.0	1.0	1.28	1	1.0	3.0	5
	> 15 Jahre	N=48	1.8	1.0	1.12	1	1.0	2.0	5
	Keine Angabe	N=1	3.0	3.0		3	3.0	3.0	3
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	N=106	1.6	1.0	0.99	1	1.0	2.0	5
	mittel	N=23	2.1	2.0	1.32	1	1.0	3.0	5
	schlecht/sehr schlecht	N=57	2.0	2.0	1.18	1	1.0	3.0	5
	Keine Angabe	N=4	1.3	1.0	0.50	1	1.0	1.8	2

### 3.55 FRAGE 38: ZUFRIEDENHEIT (KENNZAHLEN) MIT DER MOMENTANEN THERAPIEWahl NACH KEY VARIABLEN II

			38. Wie sehr sind Sie mit momentanen Therapiewahl zufrieden?							
			Count	Mean	Median	Std Deviation	Minimum	Lower quartile	Upper quartile	Maximum
1 = sehr zufrieden - 5: überhaupt nicht zufrieden										
Total			N=190	1.8	1.0	1.11	1	1.0	2.0	5
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja		N=36	1.8	1.0	1.06	1	1.0	2.0	5
	nein		N=148	1.7	1.0	1.11	1	1.0	2.0	5
	Keine Angabe		N=6	2.3	2.5	1.21	1	1.0	3.3	4
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio		N=4	1.0	1.0	0.00	1	1.0	1.0	1
	Injizierbare		N=139	1.9	1.0	1.14	1	1.0	3.0	5
	Gilenya		N=19	1.4	1.0	0.76	1	1.0	2.0	4
	Tecfidera		N=13	2.1	1.0	1.44	1	1.0	3.5	5
	Tysabri		N=9	1.4	1.0	0.73	1	1.0	2.0	3
	Andere		N=3	1.7	1.0	1.15	1	1.0		3
	Keine Angabe		N=3	1.0	1.0	0.00	1	1.0	1.0	1
Rebif bei Erstdiagnose:	nein		N=138	1.8	1.0	1.10	1	1.0	2.0	5
	ja		N=52	1.8	1.0	1.13	1	1.0	2.0	5
Aktuelle Behandlung:	Aubagio		N=7	1.6	1.0	1.51	1	1.0	1.0	5
	Injizierbare		N=37	2.1	2.0	1.10	1	1.0	3.0	5
	Gilenya		N=61	1.8	1.0	1.12	1	1.0	2.0	5
	Tecfidera		N=19	1.7	1.0	1.11	1	1.0	2.0	5
	Tysabri		N=54	1.6	1.0	1.05	1	1.0	2.0	5
	Andere		N=2	1.0	1.0	0.00	1	1.0	1.0	1
	keine Therapie		N=8	2.0	1.5	1.20	1	1.0	3.0	4
	Keine Angabe		N=2	1.0	1.0	0.00	1	1.0	1.0	1
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein		N=179	1.8	1.0	1.11	1	1.0	2.0	5
	ja		N=11	1.9	2.0	1.04	1	1.0	3.0	4
Anzahl MS Langzeit- Therapien:	Erste MS Therapie		N=54	1.7	1.0	1.12	1	1.0	2.0	5
	Zweite MS Therapie		N=81	1.7	1.0	1.08	1	1.0	2.0	5
	Dritte oder mehr		N=45	1.9	1.0	1.15	1	1.0	2.5	5
	Keine Angabe		N=10	2.1	2.0	1.10	1	1.0	3.0	4
Rückblickend gleiche Therapie:	ja		N=124	1.8	1.0	1.15	1	1.0	2.0	5
	nein		N=49	1.8	1.0	1.05	1	1.0	3.0	4
	Keine Angabe		N=17	1.7	1.0	0.99	1	1.0	2.5	4

### 3.56 FRAGE 39: ZUFRIEDENHEIT MIT DER BEHANDLUNG UND BETREUUNG IM GESAMTEN NACH KEY VARIABLEN I

1 = sehr zufrieden - 5 = überhaupt nicht zufrieden		39. Wie sehr sind Sie mit der Behandlung und Betreuung im Gesamten zufrieden?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		116	57.7%	48	23.9%	17	8.5%	14	7.0%	6	3.0%	201	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	87	58.8%	34	23.0%	12	8.1%	10	6.8%	5	3.4%	148	73.6%
	Männlich	28	54.9%	14	27.5%	4	7.8%	4	7.8%	1	2.0%	51	25.4%
	Keine Angabe	1	50.0%			1	50.0%					2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	16	50.0%	10	31.3%	4	12.5%	2	6.3%			32	15.9%
	31 – 40 Jahre	31	58.5%	13	24.5%	4	7.5%	4	7.5%	1	1.9%	53	26.4%
	41 – 45 Jahre	21	61.8%	7	20.6%			3	8.8%	3	8.8%	34	16.9%
	über 45 Jahre	47	58.8%	18	22.5%	8	10.0%	5	6.3%	2	2.5%	80	39.8%
	Keine Angabe	1	50.0%			1	50.0%					2	1.0%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	12	75.0%	2	12.5%	1	6.3%			1	6.3%	16	8.0%
	Berufslehre/ - schule	49	54.4%	21	23.3%	11	12.2%	8	8.9%	1	1.1%	90	44.8%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	33	55.9%	16	27.1%	3	5.1%	4	6.8%	3	5.1%	59	29.4%
	Universität / Fachhochschule	21	63.6%	8	24.2%	1	3.0%	2	6.1%	1	3.0%	33	16.4%
	Keine Angabe	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%					3	1.5%
Form der MS:	CIS	1	20.0%	1	20.0%	2	40.0%	1	20.0%			5	2.5%
	RRMS	108	59.7%	44	24.3%	12	6.6%	11	6.1%	6	3.3%	181	90.0%
	SPMS	6	46.2%	3	23.1%	2	15.4%	2	15.4%			13	6.5%
	Keine Angabe	1	50.0%			1	50.0%					2	1.0%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	8	50.0%	2	12.5%	4	25.0%	1	6.3%	1	6.3%	16	8.0%
	1 – 3 Jahre	14	48.3%	8	27.6%	3	10.3%	4	13.8%			29	14.4%
	3 – 5 Jahre	16	61.5%	9	34.6%			1	3.8%			26	12.9%
	5 – 10 Jahre	28	65.1%	10	23.3%	3	7.0%	1	2.3%	1	2.3%	43	21.4%
	10 – 15 Jahre	20	57.1%	10	28.6%			4	11.4%	1	2.9%	35	17.4%
	> 15 Jahre	30	58.8%	9	17.6%	6	11.8%	3	5.9%	3	5.9%	51	25.4%
	Keine Angabe					1	100.0%					1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	77	68.8%	24	21.4%	4	3.6%	4	3.6%	3	2.7%	112	55.7%
	mittel	10	41.7%	8	33.3%	3	12.5%	3	12.5%			24	11.9%
	schlecht/sehr schlecht	26	43.3%	15	25.0%	10	16.7%	7	11.7%	2	3.3%	60	29.9%
	Keine Angabe	3	60.0%	1	20.0%					1	20.0%	5	2.5%

### 3.57 FRAGE 39: ZUFRIEDENHEIT MIT DER BEHANDLUNG UND BETREUUNG IM GESAMTEN NACH KEY VARIABLEN II

1 = sehr zufrieden - 5 = überhaupt nicht zufrieden			39. Wie sehr sind Sie mit der Behandlung und Betreuung im Gesamten zufrieden?										Total	
			1		2		3		4		5		N	col%
			N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total			116	57.7%	48	23.9%	17	8.5%	14	7.0%	6	3.0%	201	100.0%
Zweitmeinung bei	ja		17	47.2%	11	30.6%	5	13.9%	2	5.6%	1	2.8%	36	17.9%
Diagnose:	nein		94	60.3%	36	23.1%	11	7.1%	10	6.4%	5	3.2%	156	77.6%
	Keine Angabe		5	55.6%	1	11.1%	1	11.1%	2	22.2%			9	4.5%
Therapieentscheid bei	Aubagio		3	75.0%	1	25.0%							4	2.0%
Erstdiagnose:	Injizierbare		79	54.9%	37	25.7%	14	9.7%	10	6.9%	4	2.8%	144	71.6%
	Gilenya		14	70.0%	3	15.0%	1	5.0%	2	10.0%			20	10.0%
	Tecfidera		5	35.7%	5	35.7%	1	7.1%	2	14.3%	1	7.1%	14	7.0%
	Tysabri		7	70.0%	1	10.0%	1	10.0%			1	10.0%	10	5.0%
	Andere		2	100.0%									2	1.0%
	Keine Angabe		6	85.7%	1	14.3%							7	3.5%
Rebif bei	nein		83	56.8%	34	23.3%	14	9.6%	11	7.5%	4	2.7%	146	72.6%
Erstdiagnose:	ja		33	60.0%	14	25.5%	3	5.5%	3	5.5%	2	3.6%	55	27.4%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio		6	75.0%	2	25.0%							8	4.0%
	Injizierbare		18	47.4%	10	26.3%	5	13.2%	5	13.2%			38	18.9%
	Gilenya		31	51.7%	16	26.7%	6	10.0%	5	8.3%	2	3.3%	60	29.9%
	Tecfidera		13	65.0%	5	25.0%	1	5.0%			1	5.0%	20	10.0%
	Tysabri		37	66.1%	12	21.4%	2	3.6%	2	3.6%	3	5.4%	56	27.9%
	Andere		3	100.0%									3	1.5%
	keine Therapie		6	42.9%	3	21.4%	3	21.4%	2	14.3%			14	7.0%
	Keine Angabe		2	100.0%									2	1.0%
Rebif ist aktuelle	nein		110	57.9%	44	23.2%	17	8.9%	13	6.8%	6	3.2%	190	94.5%
Behandlung:	ja		6	54.5%	4	36.4%			1	9.1%			11	5.5%
Anzahl MS Langzeit-	Erste MS Therapie		34	60.7%	10	17.9%	6	10.7%	5	8.9%	1	1.8%	56	27.9%
Therapien:	Zweite MS Therapie		47	57.3%	25	30.5%	5	6.1%	3	3.7%	2	2.4%	82	40.8%
	Dritte oder mehr		29	61.7%	8	17.0%	3	6.4%	4	8.5%	3	6.4%	47	23.4%
	Keine Angabe		6	37.5%	5	31.3%	3	18.8%	2	12.5%			16	8.0%
Rückblickend gleiche	ja		80	62.5%	27	21.1%	10	7.8%	7	5.5%	4	3.1%	128	63.7%
Therapie:	nein		26	51.0%	15	29.4%	4	7.8%	5	9.8%	1	2.0%	51	25.4%
	Keine Angabe		10	45.5%	6	27.3%	3	13.6%	2	9.1%	1	4.5%	22	10.9%

### 3.58 FRAGE 39: ZUFRIEDENHEIT (KENNZAHLEN) MIT DER BEHANDLUNG UND BETREUUNG IM GESAMTEN NACH KEY VARIABLEN I

		39. Wie sehr sind Sie mit der Behandlung und Betreuung im Gesamten zufrieden?							
		Count	Mean	Median	Std Deviation	Minimum	Lower quartile	Upper quartile	Maximum
1 = sehr zufrieden - 5: überhaupt nicht zufrieden									
Total		N=201	1.7	1.0	1.07	1	1.0	2.0	5
Geschlecht:	Weiblich	N=148	1.7	1.0	1.09	1	1.0	2.0	5
	Männlich	N=51	1.7	1.0	1.04	1	1.0	2.0	5
	Keine Angabe	N=2	2.0	2.0	1.41	1	1.0		3
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	N=32	1.8	1.5	0.92	1	1.0	2.0	4
	31 – 40 Jahre	N=53	1.7	1.0	1.03	1	1.0	2.0	5
	41 – 45 Jahre	N=34	1.8	1.0	1.34	1	1.0	2.0	5
	über 45 Jahre	N=80	1.7	1.0	1.05	1	1.0	2.0	5
	Keine Angabe	N=2	2.0	2.0	1.41	1	1.0		3
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	N=16	1.5	1.0	1.10	1	1.0	1.8	5
	Berufslehre/ - schule	N=90	1.8	1.0	1.04	1	1.0	2.0	5
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	N=59	1.8	1.0	1.15	1	1.0	2.0	5
	Universität / Fachhochschule	N=33	1.6	1.0	1.03	1	1.0	2.0	5
	Keine Angabe	N=3	2.0	2.0	1.00	1	1.0		3
Form der MS:	CIS	N=5	2.6	3.0	1.14	1	1.5	3.5	4
	RRMS	N=181	1.7	1.0	1.06	1	1.0	2.0	5
	SPMS	N=13	2.0	2.0	1.15	1	1.0	3.0	4
	Keine Angabe	N=2	2.0	2.0	1.41	1	1.0		3
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	N=16	2.1	1.5	1.29	1	1.0	3.0	5
	1 – 3 Jahre	N=29	1.9	2.0	1.08	1	1.0	2.5	4
	3 – 5 Jahre	N=26	1.5	1.0	0.71	1	1.0	2.0	4
	5 – 10 Jahre	N=43	1.5	1.0	0.91	1	1.0	2.0	5
	10 – 15 Jahre	N=35	1.7	1.0	1.12	1	1.0	2.0	5
	> 15 Jahre	N=51	1.8	1.0	1.21	1	1.0	2.0	5
	Keine Angabe	N=1	3.0	3.0		3	3.0	3.0	3
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	N=112	1.5	1.0	0.93	1	1.0	2.0	5
	mittel	N=24	2.0	2.0	1.04	1	1.0	2.8	4
	schlecht/sehr schlecht	N=60	2.1	2.0	1.18	1	1.0	3.0	5
	Keine Angabe	N=5	2.0	1.0	1.73	1	1.0	3.5	5

### 3.59 FRAGE 39: ZUFRIEDENHEIT (KENNZAHLEN) MIT DER BEHANDLUNG UND BETREUUNG IM GESAMTEN NACH KEY VARIABLEN II

			39. Wie sehr sind Sie mit der Behandlung und Betreuung im Gesamten zufrieden?							
			Count	Mean	Median	Std Deviation	Minimum	Lower quartile	Upper quartile	Maximum
1 = sehr zufrieden - 5: überhaupt nicht zufrieden										
Total			N=201	1.7	1.0	1.07	1	1.0	2.0	5
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	N=36	1.9	2.0	1.05	1	1.0	2.0	5	
	nein	N=156	1.7	1.0	1.06	1	1.0	2.0	5	
	Keine Angabe	N=9	2.0	1.0	1.32	1	1.0	3.5	4	
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	N=4	1.3	1.0	0.50	1	1.0	1.8	2	
	Injizierbare	N=144	1.8	1.0	1.06	1	1.0	2.0	5	
	Gilenya	N=20	1.6	1.0	1.00	1	1.0	2.0	4	
	Tecfidera	N=14	2.2	2.0	1.31	1	1.0	3.3	5	
	Tysabri	N=10	1.7	1.0	1.34	1	1.0	2.3	5	
	Andere	N=2	1.0	1.0	0.00	1	1.0	1.0	1	
	Keine Angabe	N=7	1.1	1.0	0.38	1	1.0	1.0	2	
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	N=146	1.8	1.0	1.08	1	1.0	2.0	5	
	ja	N=55	1.7	1.0	1.06	1	1.0	2.0	5	
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	N=8	1.3	1.0	0.46	1	1.0	1.8	2	
	Injizierbare	N=38	1.9	2.0	1.08	1	1.0	3.0	4	
	Gilenya	N=60	1.9	1.0	1.12	1	1.0	2.0	5	
	Tecfidera	N=20	1.6	1.0	1.00	1	1.0	2.0	5	
	Tysabri	N=56	1.6	1.0	1.09	1	1.0	2.0	5	
	Andere	N=3	1.0	1.0	0.00	1	1.0	1.0	1	
	keine Therapie	N=14	2.1	2.0	1.14	1	1.0	3.0	4	
	Keine Angabe	N=2	1.0	1.0	0.00	1	1.0	1.0	1	
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	N=190	1.7	1.0	1.08	1	1.0	2.0	5	
	ja	N=11	1.6	1.0	0.92	1	1.0	2.0	4	
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	N=56	1.7	1.0	1.09	1	1.0	2.0	5	
	Zweite MS Therapie	N=82	1.6	1.0	0.94	1	1.0	2.0	5	
	Dritte oder mehr	N=47	1.8	1.0	1.26	1	1.0	2.0	5	
	Keine Angabe	N=16	2.1	2.0	1.06	1	1.0	3.0	4	
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	N=128	1.7	1.0	1.05	1	1.0	2.0	5	
	nein	N=51	1.8	1.0	1.07	1	1.0	2.0	5	
	Keine Angabe	N=22	2.0	2.0	1.20	1	1.0	3.0	5	

### 3.60 FRAGE 40: SCHÄTZUNG DER AKTUELLEN LEBENSQUALITÄT NACH KEY VARIABLEN I

1 = sehr gut - 5 = sehr schlecht		40. Wie schätzen Sie Ihre aktuelle Lebensqualität ein?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		70	34.0%	62	30.1%	48	23.3%	20	9.7%	6	2.9%	206	100.0%
Geschlecht:	Weiblich	55	35.9%	49	32.0%	33	21.6%	11	7.2%	5	3.3%	153	74.3%
	Männlich	14	27.5%	12	23.5%	15	29.4%	9	17.6%	1	2.0%	51	24.8%
	Keine Angabe	1	50.0%	1	50.0%							2	1.0%
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	13	39.4%	10	30.3%	7	21.2%	2	6.1%	1	3.0%	33	16.0%
	31 – 40 Jahre	26	48.1%	15	27.8%	9	16.7%	3	5.6%	1	1.9%	54	26.2%
	41 – 45 Jahre	8	23.5%	12	35.3%	9	26.5%	3	8.8%	2	5.9%	34	16.5%
	über 45 Jahre	22	26.5%	24	28.9%	23	27.7%	12	14.5%	2	2.4%	83	40.3%
	Keine Angabe	1	50.0%	1	50.0%							2	1.0%
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	3	18.8%	5	31.3%	6	37.5%	2	12.5%			16	7.8%
	Berufslehre/ - schule	32	34.4%	26	28.0%	25	26.9%	7	7.5%	3	3.2%	93	45.1%
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	19	31.7%	19	31.7%	9	15.0%	10	16.7%	3	5.0%	60	29.1%
	Universität / Fachhochschule	15	44.1%	11	32.4%	7	20.6%	1	2.9%			34	16.5%
	Keine Angabe	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%					3	1.5%
Form der MS:	CIS			4	80.0%					1	20.0%	5	2.4%
	RRMS	67	36.2%	55	29.7%	42	22.7%	17	9.2%	4	2.2%	185	89.8%
	SPMS	3	21.4%	1	7.1%	6	42.9%	3	21.4%	1	7.1%	14	6.8%
	Keine Angabe			2	100.0%							2	1.0%
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	7	38.9%	4	22.2%	5	27.8%			2	11.1%	18	8.7%
	1 – 3 Jahre	16	55.2%	6	20.7%	4	13.8%	3	10.3%			29	14.1%
	3 – 5 Jahre	12	46.2%	7	26.9%	5	19.2%	2	7.7%			26	12.6%
	5 – 10 Jahre	14	31.8%	16	36.4%	11	25.0%	2	4.5%	1	2.3%	44	21.4%
	10 – 15 Jahre	7	20.0%	15	42.9%	6	17.1%	7	20.0%			35	17.0%
	> 15 Jahre	14	26.4%	13	24.5%	17	32.1%	6	11.3%	3	5.7%	53	25.7%
	Keine Angabe			1	100.0%							1	0.5%
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	50	44.2%	30	26.5%	23	20.4%	6	5.3%	4	3.5%	113	54.9%
	mittel	6	24.0%	8	32.0%	4	16.0%	6	24.0%	1	4.0%	25	12.1%
	schlecht/sehr schlecht	14	22.2%	21	33.3%	20	31.7%	7	11.1%	1	1.6%	63	30.6%
	Keine Angabe			3	60.0%	1	20.0%	1	20.0%			5	2.4%



### 3.61 FRAGE 40: SCHÄTZUNG DER AKTUELLEN LEBENSQUALITÄT NACH KEY VARIABLEN II

1 = sehr gut - 5 = sehr schlecht		40. Wie schätzen Sie Ihre aktuelle Lebensqualität ein?										Total	
		1		2		3		4		5		N	col%
		N	row%	N	row%	N	row%	N	row%	N	row%		
Total		70	34.0%	62	30.1%	48	23.3%	20	9.7%	6	2.9%	206	100.0%
Zweitmeinung bei	ja	10	25.6%	11	28.2%	8	20.5%	7	17.9%	3	7.7%	39	18.9%
Diagnose:	nein	56	35.9%	49	31.4%	38	24.4%	11	7.1%	2	1.3%	156	75.7%
	Keine Angabe	4	36.4%	2	18.2%	2	18.2%	2	18.2%	1	9.1%	11	5.3%
Therapieentscheid bei	Aubagio	3	75.0%	1	25.0%							4	1.9%
Erstdiagnose:	Injizierbare	36	24.3%	54	36.5%	37	25.0%	16	10.8%	5	3.4%	148	71.8%
	Gilenya	10	50.0%	5	25.0%	3	15.0%	2	10.0%			20	9.7%
	Tecfidera	9	64.3%	1	7.1%	3	21.4%			1	7.1%	14	6.8%
	Tysabri	4	44.4%	1	11.1%	3	33.3%	1	11.1%			9	4.4%
	Andere	2	50.0%			2	50.0%					4	1.9%
	Keine Angabe	6	85.7%					1	14.3%			7	3.4%
Rebif bei	nein	52	35.1%	41	27.7%	37	25.0%	15	10.1%	3	2.0%	148	71.8%
Erstdiagnose:	ja	18	31.0%	21	36.2%	11	19.0%	5	8.6%	3	5.2%	58	28.2%
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	6	75.0%	2	25.0%							8	3.9%
	Injizierbare	7	17.9%	16	41.0%	9	23.1%	6	15.4%	1	2.6%	39	18.9%
	Gilenya	20	32.8%	17	27.9%	15	24.6%	9	14.8%			61	29.6%
	Tecfidera	10	50.0%	4	20.0%	4	20.0%	1	5.0%	1	5.0%	20	9.7%
	Tysabri	20	36.4%	16	29.1%	16	29.1%	2	3.6%	1	1.8%	55	26.7%
	Andere	1	33.3%	2	66.7%							3	1.5%
	keine Therapie	5	27.8%	4	22.2%	4	22.2%	2	11.1%	3	16.7%	18	8.7%
	Keine Angabe	1	50.0%	1	50.0%							2	1.0%
Rebif ist aktuelle	nein	68	35.1%	57	29.4%	45	23.2%	19	9.8%	5	2.6%	194	94.2%
Behandlung:	ja	2	16.7%	5	41.7%	3	25.0%	1	8.3%	1	8.3%	12	5.8%
Anzahl MS Langzeit-	Erste MS Therapie	25	43.1%	16	27.6%	10	17.2%	5	8.6%	2	3.4%	58	28.2%
Therapien:	Zweite MS Therapie	28	34.1%	26	31.7%	22	26.8%	6	7.3%			82	39.8%
	Dritte oder mehr	12	25.5%	15	31.9%	12	25.5%	7	14.9%	1	2.1%	47	22.8%
	Keine Angabe	5	26.3%	5	26.3%	4	21.1%	2	10.5%	3	15.8%	19	9.2%
Rückblickend gleiche	ja	47	36.7%	35	27.3%	32	25.0%	11	8.6%	3	2.3%	128	62.1%
Therapie:	nein	15	27.8%	17	31.5%	13	24.1%	7	13.0%	2	3.7%	54	26.2%
	Keine Angabe	8	33.3%	10	41.7%	3	12.5%	2	8.3%	1	4.2%	24	11.7%

### 3.62 FRAGE 40: SCHÄTZUNG DER AKTUELLEN LEBENSQUALITÄT (KENNZAHLEN)NACH KEY VARIABLEN I

		40. Wie schätzen Sie Ihre aktuelle Lebensqualität ein?							
		Count	Mean	Median	Std Deviation	Minimum	Lower quartile	Upper quartile	Maximum
1 = sehr gut - 5 = sehr schlecht									
Total		N=206	2.2	2.0	1.09	1	1.0	3.0	5
Geschlecht:	Weiblich	N=153	2.1	2.0	1.07	1	1.0	3.0	5
	Männlich	N=51	2.4	2.0	1.14	1	1.0	3.0	5
	Keine Angabe	N=2	1.5	1.5	0.71	1	1.0		2
Altersgruppe:	bis 30 Jahre	N=33	2.0	2.0	1.07	1	1.0	3.0	5
	31 – 40 Jahre	N=54	1.9	2.0	1.02	1	1.0	2.3	5
	41 – 45 Jahre	N=34	2.4	2.0	1.13	1	1.8	3.0	5
	über 45 Jahre	N=83	2.4	2.0	1.10	1	1.0	3.0	5
	Keine Angabe	N=2	1.5	1.5	0.71	1	1.0		2
höchste Berufsausbildung:	Obligatorische Schule/Anlehre	N=16	2.4	2.5	0.96	1	2.0	3.0	4
	Berufslehre/ - schule	N=93	2.2	2.0	1.09	1	1.0	3.0	5
	Höhere Fach- und Berufsausbildung	N=60	2.3	2.0	1.23	1	1.0	3.0	5
	Universität / Fachhochschule	N=34	1.8	2.0	0.87	1	1.0	2.3	4
	Keine Angabe	N=3	2.0	2.0	1.00	1	1.0		3
Form der MS:	CIS	N=5	2.6	2.0	1.34	2	2.0	3.5	5
	RRMS	N=185	2.1	2.0	1.07	1	1.0	3.0	5
	SPMS	N=14	2.9	3.0	1.23	1	1.8	4.0	5
	Keine Angabe	N=2	2.0	2.0	0.00	2	2.0	2.0	2
Dauer seit der Diagnose:	< 12 Monate	N=18	2.2	2.0	1.31	1	1.0	3.0	5
	1 – 3 Jahre	N=29	1.8	1.0	1.05	1	1.0	2.5	4
	3 – 5 Jahre	N=26	1.9	2.0	0.99	1	1.0	3.0	4
	5 – 10 Jahre	N=44	2.1	2.0	0.98	1	1.0	3.0	5
	10 – 15 Jahre	N=35	2.4	2.0	1.03	1	2.0	3.0	4
	> 15 Jahre	N=53	2.5	2.0	1.17	1	1.0	3.0	5
	Keine Angabe	N=1	2.0	2.0		2	2.0	2.0	2
Gespräch mit Neurologe bei Diagnose:	sehr gut/gut	N=113	2.0	2.0	1.09	1	1.0	3.0	5
	mittel	N=25	2.5	2.0	1.23	1	1.5	4.0	5
	schlecht/sehr schlecht	N=63	2.4	2.0	1.00	1	2.0	3.0	5
	Keine Angabe	N=5	2.6	2.0	0.89	2	2.0	3.5	4

### 3.63 FRAGE 40: SCHÄTZUNG DER AKTUELLEN LEBENSQUALITÄT (KENNZAHLEN)NACH KEY VARIABLEN II

		40. Wie schätzen Sie Ihre aktuelle Lebensqualität ein?							
		Count	Mean	Median	Std Deviation	Minimum	Lower quartile	Upper quartile	Maximum
1 = sehr gut - 5 = sehr schlecht									
Total		N=206	2.2	2.0	1.09	1	1.0	3.0	5
Zweitmeinung bei Diagnose:	ja	N=39	2.5	2.0	1.27	1	1.0	4.0	5
	nein	N=156	2.1	2.0	1.00	1	1.0	3.0	5
	Keine Angabe	N=11	2.5	2.0	1.44	1	1.0	4.0	5
Therapieentscheid bei Erstdiagnose:	Aubagio	N=4	1.3	1.0	0.50	1	1.0	1.8	2
	Injizierbare	N=148	2.3	2.0	1.06	1	2.0	3.0	5
	Gilenya	N=20	1.9	1.5	1.04	1	1.0	2.8	4
	Tecfidera	N=14	1.8	1.0	1.25	1	1.0	3.0	5
	Tysabri	N=9	2.1	2.0	1.17	1	1.0	3.0	4
	Andere	N=4	2.0	2.0	1.15	1	1.0	3.0	3
	Keine Angabe	N=7	1.4	1.0	1.13	1	1.0	1.0	4
Rebif bei Erstdiagnose:	nein	N=148	2.2	2.0	1.08	1	1.0	3.0	5
	ja	N=58	2.2	2.0	1.14	1	1.0	3.0	5
Aktuelle Behandlung:	Aubagio	N=8	1.3	1.0	0.46	1	1.0	1.8	2
	Injizierbare	N=39	2.4	2.0	1.05	1	2.0	3.0	5
	Gilenya	N=61	2.2	2.0	1.07	1	1.0	3.0	4
	Tecfidera	N=20	2.0	1.5	1.19	1	1.0	3.0	5
	Tysabri	N=55	2.1	2.0	0.99	1	1.0	3.0	5
	Andere	N=3	1.7	2.0	0.58	1	1.0		2
	keine Therapie	N=18	2.7	2.5	1.46	1	1.0	4.0	5
	Keine Angabe	N=2	1.5	1.5	0.71	1	1.0		2
Rebif ist aktuelle Behandlung:	nein	N=194	2.2	2.0	1.09	1	1.0	3.0	5
	ja	N=12	2.5	2.0	1.17	1	2.0	3.0	5
Anzahl MS Langzeit-Therapien:	Erste MS Therapie	N=58	2.0	2.0	1.13	1	1.0	3.0	5
	Zweite MS Therapie	N=82	2.1	2.0	0.95	1	1.0	3.0	4
	Dritte oder mehr	N=47	2.4	2.0	1.09	1	1.0	3.0	5
	Keine Angabe	N=19	2.6	2.0	1.42	1	1.0	4.0	5
Rückblickend gleiche Therapie:	ja	N=128	2.1	2.0	1.08	1	1.0	3.0	5
	nein	N=54	2.3	2.0	1.13	1	1.0	3.0	5
	Keine Angabe	N=24	2.1	2.0	1.10	1	1.0	2.8	5

### 3.64 LISTING KOMMENTARE AUF (PAPER-FRAGEBOGEN)

	Case ID	Kommentar zu Papier-Fragebogen (data capture):
1	03-031	Q23 - Second medication - Copaxone Q36 - '1 Jahr Pause ohne Wissen der Artztes'
2	05-004	Q7 - auch in einer privaten Praxis Q10 - Other - mabthera
3	05-028	Q15 - 'Gespräch war sehr positive, hat mir Mut gemacht.'
4	05-050	Q9 - 'neue wo bis 5 Jahre schubfrei ist' Q16 - 'kam nur mit 1 Idee (Gylenia)' Q23 - 'Ich konnte nicht endscheiden'
5	05-085	Q10 - 'neu - Tecfidera' Q38 - "Spritzenmüdigkeit' deshalb wechsel auf Tecfidera'
6	09-091	Q15,16 - '2011 - 5, 2016 - 2' Q17 - '2011-2016' Q23 - '2011-keine, 2016 - Tecfidera - sehr schlimme NW + Schub, nach 12 Tage' am Ende - 'Kann bloss nicht arbeiten, geniesse jeden Tag mit meinen 3 Kindern.'
7	10-011	Q17 - 'es wurden mir 4 Blätter verschiedene Medikamente um lessen gegeben und ich musste SELBST entscheiden!!' Q29 - 'nach wechsel von Spital zu Neurologin' Q32 - '9 Jahre'
8	10-013	Q15 - 'beim damaligen Neuro bleib ich nicht' Q17 - 'der damalige' Q19 - 'beim neuen Neuro' Q37 - 'heute gibt es wirksamereTherapien'
9	10-020	Q38 - 'Starte gerade jetzt'
10	10-021	Q9 - 'Rebif seit 1999, Tecfidera nur kurz Zeit' Q13 - 'nicht meine jetzige Neurologin' Q14 - 'seiner Zeit in der Privaten Praxis schlecht' Q15 - 'meine jetzige Neurologin sehr gut' Q37 - 'aber es gab noch nicht so viele Möglichkeiten' Q40 - 'ha [...]
11	12-011	Q6 - "46 Jahre"
12	12-016	Q17 - 'Habe nach einer 2. Diagnose gefragt in der MS Station in Bern (Inselspital/Neurochirurgie). Wurde sehr gut beraten und betreut. Q18 - 'versch. Möglichkeiten aufgezeigt' Q23 - Rebif - 'kamm etwas später'
13	12-033	Q24 - Andere: "Haltbarkeit ausserhalb Kühlschranks (Reisetauglichkeit)"
14	14-002	Q26 - 'Betaferon' Q27 - 'Tysabri' Q28 - 'mir wurde NICHT gesagt dass Tysabri nicht als langzeit Therapie gedacht ist :( !' Q38 - 'Grundsätzlich sehr. Es geht mir sehr gut mit Tysabri. Aber die Ärzte sind unsicher, das hilft mir nicht gerade :( !' [...]
15	14-007	Q6 - '17 Jahre, 2000' Q9 - 'Betaferon: (mist)' Q10 - 'Tysabri: gut' Q11 - '8 Jahre' Q21 - 0-4 Wohen: 'nur Betaferon', 'Tysabri 8 Jahre'
16	14-008	Q9 - Avonex - 'Anfangs', Tysabri - 'Jetzt' Q21 - 'Mehrere Jahre. Es wurde ein fehl-Diagnose gestalt. Hirnschlag statt MS.'
17	14-010	Q24 - 'Meinung des Hausarztes'
18	14-012	Q25 - 'nur zum Spitzen Begleitung, 2-3x' Q34 - '(beim Schub)' Q39 - '1 - Jetzt, 4 - früher (anderer Arzt)'
19	14-076	Q15 - 'puis j'ai change de neurologue, pas de fusion avec le 1er. Mais tres bon prof. tout de meme.' Q16 - '2eme neurologue'
20	14-086	Q13 - 'Autre Neuro' Q14 - 'Autre Neuro apres Dr. Donati' Q23 - Betaferon: 'pas fonctionner', Tysabri: 'super' Q26 - Fatigue: 5 'pendant traitment, apres ok' PS: '1er Diagnostique avec Dr. Noro, Lemann a Bienne. Je l'ai trouver incompetent sans sa [...]
21	14-088	Q26 - '(pas eu le choix)
22	15-003	Q10 - 'von Anfang an mit Gilenya behandelt'
23	15-005	Q7 - In einem privaten Praxis - 'seit 2017', In einem Spital - 'bis 2017'
24	15-017	Q16 - 'gab keine Optionen' Q17 - 'gab keine Auswahl ausser Betainlerferon' Q25 - 'Beginn Inselspital Neurologie-abteilung' Q26 - 'Hatte damals noch keine Auswahl.'
25	15-026	Q33 - 'weitere schübe'
26	16-004	Q30 - '7 Jahre später'
27	23-011	Q23 - 'Ras d'autre choix selon le Neuro' Q33 - 'dereglement de la tyroide + problem au foi lie au rebif' Q34 - 'J'ai change de Neutro quand j'ai decide d'arreter le traitement'

### 3.64 LISTING KOMMENTARE AUF (PAPER-FRAGEBOGEN)

	Case ID	Kommentar zu Papier-Fragebogen (data capture):
28	23-024	Q10 - 'je vois faire un traitement fin septembre' Q15 - 'ancien neurologue' Q18 - 'Il n'y avait que le Rebif' Q26 - 'effets idesirables m'ont fait renonces au traitement Rebif' Q29 - 'ancien' Q32 - '(arret de traitement pendant 12 ans apres)' [...]
29	24-010	Q3 - 'actuellement' Q13 - 'Diagnosticpar erreur une infection a la paupier au lieu d'une nevrite optique...' Q18 - 'car desire de grossesse' Q26 - 'je suis coeliaque' Q29 - Neuro: 'Dr. Di Virgilio', Acc: 'Mediservice' Q35 - 'j'ai moi meme cree [...]
30	24-011	Q10 - 'Zinbryla (changement prevu en septembre pour Copaxone) Q23 - 'Zinbryla' Q39 - 'pas la meme chose'
31	24-022	Q6 - '1998'
32	25-001	Q9 - 'Vitamine D'
Total	N 32	32

Qx = Frage x, 'Text' = verbatim, [...] = unleserlich