Table S4. Genetic divergence (*p*-distances, as %) of different phylogenetic lineages and coregonids species. The values of *p*-distance are shown below the diagonal; the standard errors of this indicator are shown above the diagonal.

	IC	IIC	IIIC	IVC	CF	IW	IW1	IIW	COx	CPr	CBt	CAn	CFl	CCl	CMg	CCd	CUs	CN	PC
IC		*0.2*	*0.3*	*0.5*	*0.2*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.5*	*0.6*	*0.7*	*0.7*	*0.6*	*1.4*
IIC	0.7		*0.3*	*0.5*	*0.1*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.7*	*0.7*	*0.7*	*0.6*	*1.4*
IIIC	1.0	1.1		*0.5*	*0.3*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.7*	*0.6*	*0.5*	*0.6*	*0.7*	*0.7*	*0.6*	*1.4*
IVC	2.8	2.9	2.6		*0.6*	*0.6*	*0.7*	*0.7*	*0.7*	*0.7*	*0.7*	*0.8*	*0.7*	*0.6*	*0.7*	*0.8*	*0.8*	*0.7*	*1.4*
CF	0.7	0.4	1.1	3.0		*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.7*	*0.6*	*0.6*	*0.7*	*0.7*	*0.7*	*0.6*	*1.4*
IW	3.4	3.5	3.4	4.1	3.5		*0.1*	*0.2*	*0.1*	*0.2*	*0.1*	*0.5*	*0.4*	*0.4*	*0.4*	*0.5*	*0.5*	*0.4*	*1.3*
IW1	3.4	3.6	3.4	4.3	3.5	0.6		*0.2*	*0.1*	*0.2*	*0.2*	*0.5*	*0.4*	*0.4*	*0.4*	*0.5*	*0.5*	*0.4*	*1.4*
IIW	3.5	3.7	3.6	4.5	3.7	0.8	0.8		*0.2*	*0.1*	*0.2*	*0.5*	*0.4*	*0.4*	*0.4*	*0.5*	*0.5*	*0.4*	*1.4*
COx	3.3	3.5	3.4	4.2	3.5	0.5	0.3	0.6		*0.2*	*0.1*	*0.5*	*0.4*	*0.4*	*0.4*	*0.5*	*0.5*	*0.4*	*1.4*
CPr	3.3	3.6	3.5	4.3	3.6	0.7	0.7	0.4	0.5		*0.2*	*0.5*	*0.4*	*0.4*	*0.4*	*0.5*	*0.5*	*0.4*	*1.4*
CBt	3.3	3.5	3.3	4.1	3.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.7		*0.5*	*0.4*	*0.4*	*0.4*	*0.5*	*0.5*	*0.4*	*1.4*
CAn	3.9	4.1	4.0	5.0	4.1	3.0	3.2	3.0	3.0	3.1	3.0		*0.5*	*0.5*	*0.5*	*0.6*	*0.5*	*0.5*	*1.3*
CFl	3.4	3.6	3.3	4.4	3.6	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	2.5		*0.5*	*0.4*	*0.5*	*0.6*	*0.5*	*1.3*
CCl	2.9	3.2	2.9	4.0	3.2	1.8	1.9	2.0	1.8	1.9	1.8	2.8	1.9		*0.5*	*0.5*	*0.5*	*0.5*	*1.4*
CMg	3.5	3.8	3.5	4.6	3.7	2.1	2.1	2.2	2.0	2.1	2.0	3.2	1.5	2.0		*0.5*	*0.4*	*0.5*	*1.4*
CCd	4.5	4.7	4.3	5.7	4.6	2.8	2.9	3.0	2.8	2.9	2.7	3.5	2.5	2.8	2.6		*0.2*	*0.6*	*1.4*
CUs	4.3	4.6	4.3	5.7	4.5	2.8	3.0	3.0	2.8	2.9	2.8	3.4	2.4	2.7	2.5	0.5		*0.6*	*1.3*
CN	4.6	4.0	3.7	4.6	3.9	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	3.6	2.7	2.6	3.1	3.9	3.8		*1.3*
PC	17.1	17.3	17.5	17.6	17.2	17.4	17.4	17.4	17.3	17.4	17.5	16.4	16.7	17.6	17.7	17.3	17.4	17.0	

IC, IIC, IIIC, and IVC–phylogenetic lineages of considered cisco species; IW, IW1, and IIW–considered haplogroups of whitefish; CF–*Coregonus fontanae*; COx–*C. oxyrhynchus*; CPr–*C. l. pravdinellus*; CBt–*C. l. baunti*; CAn–*C. anaulorum*; CFl–*C. fluviatilis*; CCl–*C. clupeaformis*; CMg–*C. migratorius*; CCd–*C. chadary*; CUs–*C. ussuriensis*; CN–*C. nasus*; PC–*Prosopium cylindraceum*. Species are named according NCBI sequences' annotations.