Table S2. The sequences of primers used for qRT-PCR

Gene Name	Forward Primer (5'-3')	Reverse Primer (5'-3')
PbACTIN	TTGGTATGGGTCAGAGG	CTGTGAGCAGAACTGGGTG
PbGID1c-1-1	ATGTGTTGGGTTTTCTTCAAG	CGGCGGCACAGAATA
PbGID1c-1-2	GTAAATGAATCCAGGACAGT	CGGCGGCACAGAATA
PbGID1c-2	CCTTCAACCGCCACT	ATGTTCCCGCCAGAG
PbGID1b-1	CGCCATCTACGACACCT	TGCCATTCCCGCTCT
PbGID1b-2	ATCGGTATCCTTGTGCTTAT	CTGCAAACATTGGGTGG
PbGAI1a	TCCCTCCGAACTCCTCTT	GTAGCCGATCTGGGTCATC
PbGAI1b	GCGAACAGCCAGGATAAGG	CCAGCCCAACATCAGACAC
PbGAI2a	CCAGCGGACTCGGGTTT	GGTAAGGGCAGGTCTCGTAA
PbGAI2b	CCCAACTGGCCGAAACTA	TGCCTGCCCAAATACACC
PbRGLa	GCCGCAGCAGAACCACA	GCCACGCTGGACGGATT
PbRGLb	CGAAACATGGACCGACAAC	GCAAGGGCCTGAATAAGC
PbSLY1-1	CGGATGTAAAGATGAAGAGGG	CGCCGATGAGAAAGAAGG
PbSLY2-1	CACCGTCGCCAGAAATG	CCTGTAGAGCCTCTTGTAGCC
PbSLY1-2	GATGGCAGCGGCGAGTT	CGACGAAGAAGAAGGAGCAGA
PbSLY2-2	CGGCGGCTACAAGAAG	AACGACGACGGGTTTCA