Supplementary Table S2. Risk for CVE[a] after index date stratified on CVD[b] risk factors prior to RA onset.

Hypertension[c]	Elevated ApoB:A1 ratio[d]	Current smoking	P-value	OR (95% CI)
Cases				
-	-	-		Ref
-	+	+	0.010	4.74 (1.45-15.56)
+	+	-	$1.85x10^{-4}$	7.89 (2.67-23.29)
+	-	+	0.011	5.23 (1.46-18.77)
+	+	+	$2.90x10^{-5}$	12.07 (3.76-38.78)
Controls				
-	-	-		Ref
-	+	+	0.033	3.31 (1.10-9.90)
+	+	-	0.001	4.96 (1.97-12.47)
+	-	+	0.035	4.94 (1.12-21.75)
+	+	+	$2.0x10^{-6}$	10.87 (4.03-29.30)

Logistic regression analyses presented with odds ratios (ORs), 95% confidence intervals (CIs), adjusted for age and sex, [a]CVE=cardiovascular event, [b]CVD= cardiovascular disease [c]hypertension = systolic blood pressure≥140 and/or diastolic blood pressure ≥90 and/or medical treatment for hypertension, [d]elevated apolipoprotein (Apo)B/ApoA1-ratio = male sex ≥0.8, female sex ≥ 0.7