Clinical form (n)	Histopathological Characteristics			
	Inflammatory infiltrate			
	Mild n(%)	**Moderate n(%)**	**Intense n(%)**	
ADCL [La] (n=5)	1 (20%)	0 (0%)	4 (80%)	
LCL [La] (n=4)	0 (0%)	1 (25%)	3 (75%)	
LCL [Lb] (n=6)	0 (0%)	2 (33.3%)	4 (66.7%)	
MCL [Lb] (n=5)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)	
	Infiltrate Distribution			
	Focal n(%)	**Diffuse n(%)**		
ADCL [La] (n=5)	1 (20%)	4 (80%)		
LCL [La] (n=4)	1 (25%)	3 (75%)		
LCL [Lb] (n=6)	3 (50%)	3 (50%)		
MCL [Lb] (n=5)	0 (0%)	5 (100%)		
	Granuloma			
	Absent n(%)	**Outline n(%)**	**Well-formed n(%)**	
ADCL [La] (n=5)	4 (80%)	1 (20%)	0 (0%)	
LCL [La] (n=4)	2 (50%)	0 (0%)	2 (50%)	
LCL [Lb] (n=6)	3 (50%)	2 (33.3%)	1 (16.67%)	
MCL [Lb] (n=5)	2 (40%)	1 (20%)	2 (40%)	
	Parasitism			
	Negative n(%)	**Mild n(%)**	**Moderate n(%)**	**Intense n(%)**
ADCL [La] (n=5)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)
LCL [La] (n=4)	0 (0%)	2 (50%)	2 (50%)	0 (0%)
LCL [Lb] (n=6)	3 (50%)	3 (50%)	0 (0%)	0 (0%)
MCL [Lb] (n=5)	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	0 (0%)