Supplementary Material

Table S1 Primers used for real-time PCR

Primer		Sequence
IL7	Forward	5′-CTGATGATCAGCATCGATGAATTGG-3′
	Reverse	5′-GCAGCACGATTTAGAAAAGCAGCTT
IL-3	Forward	5′-TTTCGGAGAGTAAACCTGTCCA-3′
	Reverse	5′-AGGCAGGCAACAGTTAAGTTTC-3′
GM-CSF	Forward	5′-AAAAACAGCCAGTGTCCTGTG-3′
	Reverse	5′-GATGCTGACGTTCTTGGGAAG-3′
M-CSF	Forward	5′-TCCAACCTTACTTCAAAGGGGA-3′
	Reverse	5′-AGGCTCGAAAGGAGTTATACCA-3′
TPO	Forward	5′-CTTGGAGCTATGGCAATAATGCT-3′
	Reverse	5′-GAGCTGGCTCGTTTCCACA-3′




Figure S1 (**A**) spleen weight (**B**) spleen index of different group




Figure S2 (**A**) Phylum level composition of representative bacterial in each group (**B**) The *Firmicutes* to *Bacteroidota* ratio




Figure S3 The effect of jujube polysaccharides and cyclic adenosine on CTX treatment (**A**) The ratio $CD4^+$ T cells (**B**) $CD8^+$ T cells of $CD45^+$ cells in peripheral blood.