**Table S1.** Survival by ST type at the 4-, 12-, 24-, and 48-week follow-up time points.

| | 4-Week | | | 12-Week | | | 24-Week | | | 48-Week | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Survival** | **Non-survival** | ***P*** | **Survival** | **Non-survival** | ***P*** | **Survival** | **Non-survival** | ***P*** | **Survival** | **Non survival** | ***P*** |
| **STs** | 84(84.0%) | 16(16.0%) | 0.263 | 67(67.0%) | 33(33.0%) | **0.038** | 63(63.0%) | 37(37.0%) | 0.089 | 61(61.0%) | 39(39.0%) | 0.123 |
| **ST5** | 72(85.7%) | 11(68.8%) | | 60(89.6%) | 23(69.7%) | | 56(88.9%) | 27(73.0%) | | 54(88.5%) | 29(74.4%) | |
| **ST4** | 3(3.6%) | 2(12.5%) | | 2(3.0%) | 3(9.1%) | | 2(3.2%) | 3(8.1%) | | 2(3.3%) | 3(7.7%) | |
| **ST93** | 2(2.4%) | 2(12.5%) | | 0(0) | 4(12.1%) | | 0(0) | 4(10.8%) | | 0(0) | 4(10.3%) | |
| **ST685** | 3(3.6%) | 0(0) | | 2(3.0%) | 1(3.0%) | | 2(3.2%) | 1(2.7%) | | 2(3.3%) | 1(2.6%) | |
| **ST31** | 2(2.4%) | 1(6.3%) | | 2(3.0%) | 1(3.0%) | | 2(3.2%) | 1(2.7%) | | 2(3.3%) | 1(2.6%) | |
| **ST43** | 1(1.2%) | 0(0) | | 1(1.5%) | 0(0) | | 1(1.6%) | 0(0) | | 1(1.6%) | 0(0) | |
| **ST395** | 1(1.2%) | 0(0) | | 0(0) | 1(3.0%) | | 0(0) | 1(2.7%) | | 0(0) | 1(2.6%) | |

Survival by ST type, with *P* values indicating the probability that the distribution of ST types is significantly different between the survival and non-survival groups at each survival time. STs = sequence types.